AVES DO MUNDO

LISTA DE NOMES PORTUGUESES



5ª
EDIÇÃO
IOC 15.2

AVES DO MUNDO PT

© 2026 Aves do Mundo. Todos os direitos reservados.

Título: Aves do Mundo – Lista de Nomes Portugueses

Autor: Aves do Mundo
(Paulo Alves, Gonçalo Elias, José Frade, Pedro Nicolau, João Pereira)

Design da capa: Maria Elias
Produção: Maria Elias / ePub4All
Distribuição: Smashwords

5ª edição, Outubro 2026

Website: https://avesdomundo.info/

HISTÓRIA DESTA LISTA

Esta lista foi criada por cinco observadores de aves que, por interesse e algum acaso, se juntaram em 2019 para fazer algo que até à data nunca tinha sido feito - nomear todas as espécies de aves do mundo em português.

A elaboração da lista seguiu vários critérios, os quais são descritos mais abaixo. Numa primeira fase, as espécies foram divididas por continentes de acordo com a classificação geográfica do IOC (actual International Ornithologists' Union), e cada membro ficou responsável por preparar os nomes para uma região: Oriente (Paulo Alves), África (Gonçalo Elias), América do Norte (Pedro Nicolau), América Central (José Frade) e América do Sul (João Pereira). As restantes regiões, nomeadamente a Europa, a Oceânia, a Antárctida e as ilhas oceânicas, foram trabalhadas conjuntamente, sendo que a Oceânia e a Antárctida contaram com a valiosa colaboração do Rui Caratão, que elaborou a parte dos "não passeriformes".
A elaboração de novos nomes baseou-se em grande parte em nomes já utilizados noutros países e regiões (disponibilizados no site do IOC ou Avibase) e/ou na ecologia das espécies (tendo para isso sido consultadas fontes como o Birds of the World e a Wikipedia).

Após o preenchimento inicial de todos os nomes, a lista foi integralmente revista por todos os membros, e os casos de resolução mais complicada ou onde havia discordância quanto ao nome a adoptar foram discutidos em reuniões periódicas. O processo demorou cerca de dois anos e meio.

Esta lista foi inicialmente divulgada na plataforma eBird (Clements, 2021), uma vez que, durante o processo, houve interesse reiterado por parte do eBird em disponibilizar todos os nomes das aves do mundo em português de Portugal, aquando da actualização taxonómica de Agosto de 2021. Esse processo implicou que a dada altura (particularmente em Junho e Julho de 2021) a atenção do nosso grupo se tenha dedicado à tradução e à adaptação de toda a lista para Clements, num prazo muito apertado. Coincidentemente com a nossa submissão, uma nova lista de nomes, autoria de Paulo Paixão (2021), foi publicada, sem que nenhum de nós estivesse ciente de qualquer um dos projectos. As duas listas seguem filosofias muito distintas, e após conversação com o autor, chegou-se à conclusão de que uma lista consensual seria muito difícil de obter,

uma vez que as diferenças entre as duas são muito consideráveis. A lista do Paulo Paixão pretende ser uma lista pensada para toda a lusofonia, enquanto a nossa pretende ser uma lista em português europeu.

CRITÉRIOS

Nesta secção apresentamos as principais linhas que guiaram a elaboração desta lista. Estas linhas foram definidas logo no início do projecto.

Perspectiva portuguesa versus lusofonia

Esta lista foi feita na perspectiva de observadores portugueses, baseados em Portugal. Temos consciência de que a lusofonia é riquíssima, e de que existe uma grande variedade regional, tanto a nível nacional como a nível dos países da CPLP. Este assunto é relevante e acreditamos que qualquer visitante num desses países ou regiões beneficiará muito da aprendizagem dos nomes de aves utilizados localmente. No entanto, consideramos que isso não é incompatível com a existência de um conjunto de nomes que sejam de uso mais intuitivo para a comunidade de portugueses interessados em aves, quando comunicando entre si. O nosso trabalho procura precisamente preencher essa lacuna. Como tal, de início foi tomada a decisão de darmos sempre prioridade à nomenclatura portuguesa europeia, privilegiando nomes genéricos que são conhecidos e utilizados em Portugal e na Europa (por exemplo, tordo em vez de sabiá, andorinha-do-mar em vez de trinta-réis, tarambola em vez de batuiruçu).

Nomes das espécies europeias

Os nomes europeus mereceram critérios especiais, dada uma polémica que surgiu no fim dos anos 90, onde uma lista transformativa e alternativa (Costa *et al*., 2000) à existente até então (Sacarrão & Soares, 1979) foi publicada, tendo acabado por ser oficiosamente adoptada pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) ao longo dos anos. A comunidade ornitológica portuguesa tem estado profundamente dividida na questão, dada a presença de várias nomenclaturas na literatura escrita e no mundo digital. Deste modo, várias espécies têm mais do que um nome

comum de uso generalizado, com diversas referências bibliográficas de relevo na ornitologia nacional a incluírem mais do que um nome (Catry *et al*., 2010; Svensson *et al*., 2020). Por essa razão, decidimos utilizar, como recurso, consultas de opinião conduzidas no grupo "Aves de Portugal Continental" no Facebook, realizadas entre 2019-2020, onde a preferência da comunidade aí presente foi sondada. Semanalmente, 100-200 membros foram convidados a escolher entre dois nomes alternativos (por exemplo, garça-boieira versus carraceiro) e votaram caso a caso, dando por vezes preferência a nomes de uma lista, e por outras vezes a nomes de outra. Ainda que os resultados destas consultas não tenham sido vinculativos, estes serviram de base às nossas escolhas, desde que a coerência global fosse assegurada. Numa análise realizada a 226 situações de nomes europeus em que o nome proposto por Costa *et al*. é diferente do indicado por Sacarrão & Soares, verificámos que em 46% dos casos o nome por nós escolhido corresponde ao de Costa *et al*., em 37% dos casos corresponde ao de Sacarrão & Soares e nos 17% restantes não corresponde a nenhum dos dois. A nossa lista incorpora portanto escolhas de ambas as listas dominantes de forma bastante equilibrada.

Critérios específicos

Esta lista pode ser considerada de carácter científico, sendo o critério principal a coerência entre os nomes comuns e a sistemática. Como a taxonomia das aves se encontra em fluxo, com frequentes alterações todos os anos devido a novos estudos filogenéticos, também a nossa lista deve reflectir essas mudanças. Optámos por seguir como autoridade taxonómica a IOC World Bird List, na sua versão 11.2 (de Julho de 2021). Para esta quarta edição, seguiu-se a mesma autoridade, tomando como referência a versão 14.2 (de Agosto de 2024). Estabelecemos aqui alguns critérios-base mais específicos para a escolha de nomes na nossa lista:

Coerência sistemática
Idealmente, deve haver algum paralelismo entre a sistemática e a estrutura dos nomes comuns em grupos taxonomicamente próximos (tipicamente espécies do mesmo género, mas não necessariamente). Tal não é inteiramente possível para espécies portuguesas que já têm nomes instituídos (exemplo: frisada ou piadeira são ambos patos, açor/gavião são ambos *Accipiter*, ógea e alfaneque são falcões). No

entanto, quando se trata de elaborar uma lista nova de base para muitas espécies sem nome comum, é importante que cada nome genérico seja identificativo do grupo taxonómico o máximo possível (por exemplo: Apodidae são andorinhões, Parulidae são mariquitas, Phalacrocoracidae são corvos-marinhos, *Sternula* são chilretas*,* os *Corvus* de maior porte são corvos e os menores são gralhas). Este critério guia toda a lista, ainda que nem sempre seja fácil de aplicar, e nem sempre é óbvio como definir grupo taxonómico próximo, tal como o exemplo corvo/gralha pretende clarificar. Para exemplificar algumas das nossas escolhas, os nossos critérios não admitem a existência do nome águia-caçadeira para *Circus pygargus*, uma vez que já existe um outro nome bem estabelecido para a espécie, tartaranhão-caçador, e os *Circus* não correspondem a águias. Como excepções, temos por exemplo o melro-das-rochas e o melro-azul, que apesar de não se encontrarem na família Turdidae e de os restantes *Monticola* terem o nome de roqueiros, têm os seus nomes amplamente instituídos (ver critério de "popularidade" abaixo). Esta regra levou ainda a que tenhamos criado novos nomes para várias espécies com representação no Brasil, que não têm nome dominante para um determinado grupo taxonómico próximo (por exemplo, os *Synallaxis* que no Brasil podem ser joão, estrelinha, pichororé, tatac, uí-pi, pi-puí, petrim ou puruchém - os quais foram aqui denominados de rabos-espinhosos)

Singularidade

Cada nome apenas diz respeito a uma única espécie. A presença de sinónimos nos descritivos é contudo admitida (por exemplo, riscado e estriado podem descrever espécies distintas), embora tenhamos tentado evitá-la quando possível. Esta regra implica que muitos nomes tenham de ter um descritivo, no caso de haver mais do que uma espécie com o mesmo nome genérico. Por exemplo, o nome genérico "escrevedeira" representa todas as espécies do género *Emberiza*, e como tal não pode haver uma espécie chamada apenas "escrevedeira". No entanto, há apenas um único "secretário" ou um único "fuselo", pelo que essas espécies não requerem descritivo. Adicionalmente, procurou evitar-se a repetição do mesmo nome genérico para famílias distintas. Tal nem sempre foi possível, havendo várias excepções à regra, particularmente no caso de famílias que foram recentemente divididas (em especial os antigos Timaliidae e Sylviidae) ou da presença de nomes bem instituídos que são iguais para aves de famílias distintas, sem haver alternativas

claras, como é o caso dos tentilhões (“de Darwin”) e dos canários que ocorrem nas famílias Fringillidae e Thraupidae.

Popularidade
Nomes fortemente instituídos em Portugal têm geralmente prioridade, no caso de já existirem e de não haver nenhum outro nome instituído para a mesma espécie. Esta lista não pretende gerar conflitos onde eles já não existem (por exemplo, resgatar o nome guincho para águia-pesqueira, o que geraria uma tremenda confusão). Procurou-se também ter sempre em consideração, para espécies do resto do mundo, nomes que estão bem disseminados em diversos meios (na criação de aves exóticas ou em materiais educacionais, por exemplo), desde que estes não colidam fortemente com outros critérios. Neste âmbito, foram consultados alguns membros das comunidades de criadores de aves, de modo a estabelecer preferências e/ou perceber que nomes estão já em uso, tendo por isso sido adoptados nomes como dendrocisne, ganso-pega, loriquito ou catatua (em vez de cacatua).

Sonoridade
Ainda que tenhamos tentado dar preferência a nomes lusófonos para aves que ocorrem em países da lusofonia, procurámos evitar usar nomes que soassem excessivamente bizarros ao ouvido europeu. São exemplos disso nomes de pessoas ("joão" ou “maria”), comida ("peixe-frito") ou peças de vestuário (“calcinha”, “casaca” ou “boininha”), entre outros (“bichoita”, “andarilho”, “cochicho”, “trovoada”).

Uso de gentílicos
Privilegiamos o uso de gentílicos (ex: chileno, americano, filipino), nomeadamente quando o nome se refere a países ou regiões. No entanto, o uso dos gentílicos não foi generalizado, já que algumas regiões não têm gentílicos intuitivos (em particular certas ilhas ou províncias), e algumas espécies já têm nome instituído sem gentílico (ex: condor-da-califórnia, rouxinol-do-japão ou abutre-do-egipto). Este critério está então ligado ao da sonoridade.

Descritivos geográficos restritivos
Para muitas espécies, a distribuição geográfica é um critério muito relevante para as separar de outras. Sempre que os descritivos geográficos foram usados, procurou ser-se o mais restritivo possível. Procurou também usar-se alternativas a descritivos geográficos

erróneos (exemplo: mariquita-tigrina em vez de mariquita-do-cabo-may). Esta regra apresenta bastantes excepções na nossa lista, em particular quando não foram encontradas melhores alternativas ou quando os nomes se encontram já bastante popularizados (exemplo: pardal-espanhol e pardal-francês).
Para novos descritivos de nomes já existentes em português, de forma a assegurar a regra da singularidade, seguiu-se a seguinte lógica: do descritivo geográfico mais restritivo para o menos restritivo, seguindo a ordem europeu-eurasiático-comum (sendo "comum" usado quando a distribuição de uma espécie inclui partes significativas de pelo menos três continentes, isto é, espécies comuns a múltiplas regiões).

Descritivos morfológicos precisos
Nesta lista, procurámos evitar usar descritivos factualmente incorrectos. Um exemplo é o pilrito-de-peito-preto, que na verdade tem o peito branco e a barriga preta, tendo nós optado por pilrito-comum. Excepções abrem-se para nomes muito instituídos ou em coerência com o epíteto específico do nome científico, na ausência de melhor alternativa.

Uso de patronímicos
Independentemente da discussão actual em torno da presença de nomes de personalidades controversas como parte do nome de várias espécies (os chamados patronímicos), cremos que descritivos morfológicos ou geográficos são mais informativos em termos de identificação e podem até ter um impacto positivo na conservação das espécies. Por isso tendemos a favorecer essas opções face aos patronímicos, embora esse nem sempre tenha sido o caso e existam muitas situações de patronímicos bem instituídos ou para os quais não existem alternativas sólidas, fáceis ou tecnicamente correctas. Como exemplo de uma excepção, temos o caso do tordo-de-swainson (em coerência com o epíteto específico), nome que considerámos ser mais ajustado do que o nome proposto por Costa *et al*. (2000), tordo-dos-pântanos, que em nada reflecte a ecologia da espécie.

Comprimento dos nomes
Evitamos nomes excessivamente longos, de forma a facilitar o seu uso e memorização. Houve um esforço no sentido de condensar nomes usando apóstrofos, removendo duplas adjectivações ou utilizando adjectivos mais simples quando os nomes genéricos são

por si só compostos por mais de uma palavra (por exemplo, "pita-formigueira-ruiva").

PERSPECTIVAS FUTURAS

Esta lista pretende ser um projecto contínuo. Estamos abertos a críticas e certamente haverá vários aspectos a melhorar para o futuro. Todos os nomes são passíveis de serem discutidos e actualizados, em particular à luz de revisões taxonómicas futuras.

REFERÊNCIAS

Catry, P.; Costa, H.; Elias, G.; Matias, R. 2010. Aves de Portugal. Ornitologia do território continental. Assírio & Alvim. Lisboa.

Costa, H.; A. Araújo; J. C. Farinha; M. C. Poças e A. M. Machado. 2000. *Nomes Portugueses das Aves do Paleárctico Ocidental*. Assírio & Alvim. Lisboa.

Gill, F; Donsker, D.; Rasmussen, P. (Eds.). 2021. *IOC World Bird List* (v11.2). https://www.worldbirdnames.org/new/

Lepage, D. 1992-2021. Avibase — The World Bird Database. https://avibase.bsc-eoc.org/

Paixão, P. 2021. Os Nomes Portugueses das Aves de Todo o Mundo: Projeto de Nomenclatura, 2.ª ed., a separata, n.º 1, suplemento d'«a folha» n.º 66.

Sacarrão, G. F.; Soares, A. A. 1979. *Nomes portugueses para as aves da Europa, com anotações*. Arquivos do Museu Bocage (2ª Série) VI (23): 395-480.

Schulenberg (Editors) (2020). Birds of the World. Cornell Laboratory of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://birdsoftheworld.org/

Svensson, L., Mullarney, K., Zetterström, D. 2020. *Collins Bird Guide (App edition)*. v1.54.45 (287). Produzida por Nature Guides Ltd.

LISTA DE NOMES

1ª PARTE – NÃO PASSERIFORMES

Struthionidae — Avestruzes

Aves de grandes dimensões, sendo na verdade as aves vivas mais pesadas de todo o planeta. Põem os maiores ovos de qualquer espécie terrestre (não extinta). Não voam, mas conseguem correr a 70 km/h, o que faz delas as aves mais rápidas em terra. São frequentemente criadas para consumo humano, tanto pela carne, como pelas penas.

Espécies: 2

Distribuição: África subsariana

Struthio camelus	avestruz-comum
Struthio molybdophanes	avestruz-somali

Rheidae **Nandus**

Os nandus são as maiores aves da América do Sul, sendo incapazes de voar, mas excelentes corredores. Ocupam habitats abertos e secos desde o Nordeste brasileiro até à Patagónia. São os machos de nandu que preparam o ninho, incubam os ovos e acompanham as crias no seu crescimento, ao contrário do que acontece na grande maioria das aves.

Espécies: 2

Distribuição: Metade sul da América do Sul

Rhea americana	nandu-comum
Rhea pennata	nandu-pequeno

Apterygidae Kiwis

Considerados as aves nacionais da Nova Zelândia, os kiwis fazem lembrar mamíferos, com a sua plumagem densa e acastanhada, incapacidade de voar e um olfacto extremamente apurado. Alimentam-se de invertebrados que procuram no solo com o seu bico longo e sensível. Os kiwis são também as aves que pôem os maiores ovos do mundo em proporção à sua dimensão. Todas as espécies se encontram ameaçadas pela destruição de habitat e introdução de mamíferos alóctones.

Espécies: 5

Distribuição: Nova Zelândia

Apteryx australis	kiwi-do-sul
Apteryx mantelli	kiwi-do-norte
Apteryx rowi	kiwi-de-okarito
Apteryx owenii	kiwi-malhado-pequeno
Apteryx maxima	kiwi-malhado-grande

Casuariidae — Casuares e Emu

Estas são aves de grandes dimensões e sem capacidade de voo. As sua cabeça e parte do pescoço são desprovidos de penas e apresentam a pele colorida. O emu é omnívoro e ocupa zonas abertas da Austrália, enquanto os casuares são frugívoros e ocorrem em florestas tropicais da Papua e do norte da Austrália. Os casuares são as únicas aves que usam infra-sons para comunicação.

Espécies: 4

Distribuição: Austrália e Papua

Casuarius casuarius	casuar-do-sul
Casuarius bennetti	casuar-anão
Casuarius unappendiculatus	casuar-do-norte
Dromaius novaehollandiae	emu

Embora capazes de voar, os tinamus são aves crípticas e de hábitos terrestres, mais frequentemente detectadas pelos seus fortes chamamentos. Tal como nos nandus, são os machos que estão principalmente envolvidos no cuidado do ninho e das crias. As fêmeas põem ovos reluzentes e com uma grande variedade de cores.

Espécies: 46

Distribuição: América do Sul e Central

Tinamus tao	tinamu-cinzento
Tinamus solitarius	tinamu-solitário
Tinamus osgoodi	tinamu-preto
Tinamus major	tinamu-grande
Tinamus guttatus	tinamu-pintalgado
Nothocercus bonapartei	tinamu-serrano
Nothocercus julius	tinamu-de-peito-ruivo
Nothocercus nigrocapillus	tinamu-de-capuz
Crypturellus berlepschi	tinamu-escuro
Crypturellus cinereus	tinamu-sombrio
Crypturellus soui	tinamu-pequeno
Crypturellus ptaritepui	tinamu-dos-tepuis
Crypturellus obsoletus	tinamu-castanho
Crypturellus undulatus	tinamu-ondulado
Crypturellus transfasciatus	tinamu-de-sobrancelha
Crypturellus strigulosus	tinamu-relógio
Crypturellus duidae	tinamu-de-patas-cinzentas
Crypturellus erythropus	tinamu-de-patas-vermelhas
Crypturellus noctivagus	tinamu-de-patas-amarelas
Crypturellus atrocapillus	tinamu-de-barrete
Crypturellus cinnamomeus	tinamu-do-bosque
Crypturellus boucardi	tinamu-ardósia
Crypturellus kerriae	tinamu-do-chocó
Crypturellus variegatus	tinamu-variegado
Crypturellus brevirostris	tinamu-ferruginoso-oriental
Crypturellus bartletti	tinamu-ferruginoso-ocidental
Crypturellus parvirostris	tinamu-de-bico-curto
Crypturellus casiquiare	tinamu-do-cassiquiare
Crypturellus tataupa	tinamu-tataupá
Rhynchotus rufescens	tinamu-d'asa-ruiva
Rhynchotus maculicollis	tinamu-boliviano
Nothoprocta taczanowskii	tinamu-de-taczanowski

Nothoprocta ornata	tinamu-adornado
Nothoprocta perdicaria	tinamu-chileno
Nothoprocta cinerascens	tinamu-do-mato
Nothoprocta pentlandii	tinamu-andino
Nothoprocta curvirostris	tinamu-do-páramo
Nothura boraquira	tinamu-de-barriga-branca
Nothura minor	tinamu-mineiro
Nothura darwinii	tinamu-de-darwin
Nothura maculosa	tinamu-malhado
Taoniscus nanus	tinamu-anão
Eudromia elegans	tinamu-elegante
Eudromia formosa	tinamu-do-chaco
Tinamotis pentlandii	tinamu-da-puna
Tinamotis ingoufi	tinamu-patagónico

Anhimidae Anhumas

As anhumas são aves herbívoras de grande dimensão, que podem ser avistadas nas margens de rios, lagos e zonas pantanosas. Têm um aspecto bizarro e algo pré-histórico, devido ao contraste da sua pequena cabeça com as patas possantes e ao esporão que apresentam na articulação da asa, usado em lutas territoriais.

Espécies: 3

Distribuição: América do Sul

Anhima cornuta	anhuma-cornuda
Chauna chavaria	anhuma-do-norte
Chauna torquata	anhuma-do-sul

Anseranatidae **Ganso-pega**

Este ganso tem um aspecto distintivo, com as suas pernas compridas, que denunciam a sua pertença a uma família diferente de todos os outros gansos, os quais estão na família Anatidae. Esta espécie é herbívora, ocorrendo em zonas húmidas de água doce. Nidifica em colónias de grandes dimensões.

Espécies: 1

Distribuição: Austrália e Papua

Anseranas semipalmata	ganso-pega

Anatidae Patos, Gansos e Cisnes

Esta família de aves aquáticas inclui os patos, os gansos e os cisnes. Estas aves conseguem nadar, flutuar na superfície da água e, nalguns casos, mergulhar. A maioria das espécies é herbívora e muitas são migradoras. Algumas espécies foram domesticadas pelo Homem e muitas outras são caçadas para alimentação ou por desporto. Pelo menos cinco espécies extinguiram-se desde 1600.

Espécies: 174

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Dendrocygna viduata	dendrocisne-de-faces-brancas
Dendrocygna autumnalis	dendrocisne-de-barriga-preta
Dendrocygna guttata	dendrocisne-malhado
Dendrocygna arborea	dendrocisne-arbóreo
Dendrocygna bicolor	dendrocisne-bicolor
Dendrocygna eytoni	dendrocisne-australiano
Dendrocygna arcuata	dendrocisne-nómada
Dendrocygna javanica	dendrocisne-javanês
Thalassornis leuconotus	pato-de-dorso-branco
Cereopsis novaehollandiae	ganso-cinzento-australiano
Branta bernicla	ganso-de-faces-pretas
Branta ruficollis	ganso-de-peito-ruivo
Branta sandvicensis	ganso-havaiano
Branta canadensis	ganso-do-canadá
Branta leucopsis	ganso-de-faces-brancas
Branta hutchinsii	ganso-palrador
Anser indicus	ganso-de-cabeça-listada
Anser canagicus	ganso-imperador
Anser rossii	ganso-de-ross
Anser caerulescens	ganso-das-neves
Anser anser	ganso-bravo
Anser cygnoides	ganso-chinês
Anser fabalis	ganso-campestre
Anser brachyrhynchus	ganso-de-bico-curto
Anser serrirostris	ganso-da-tundra
Anser albifrons	ganso-grande-de-testa-branca
Anser erythropus	ganso-pequeno-de-testa-branca
Coscoroba coscoroba	cisne-de-coscoroba
Cygnus atratus	cisne-preto
Cygnus melancoryphus	cisne-de-pescoço-preto
Cygnus olor	cisne-mudo

Cygnus buccinator	cisne-trombeteiro
Cygnus columbianus	cisne-pequeno
Cygnus cygnus	cisne-bravo
Stictonetta naevosa	pato-pedrês
Hymenolaimus malacorhynchos	pato-azul-maori
Tachyeres patachonicus	pato-vapor-voador
Tachyeres pteneres	pato-vapor-de-magalhães
Tachyeres brachypterus	pato-vapor-das-malvinas
Tachyeres leucocephalus	pato-vapor-de-cabeça-branca
Merganetta armata	pato-das-torrentes
Plectropterus gambensis	pato-ferrão
Sarkidiornis sylvicola	pato-de-carúncula-americano
Sarkidiornis melanotos	pato-de-carúncula-afroasiático
Cyanochen cyanoptera	ganso-d'asa-azul
Alopochen aegyptiaca	ganso-do-egipto
Alopochen mauritiana	ganso-das-maurícias
Alopochen kervazoi	ganso-da-reunião
Neochen jubata	ganso-do-orinoco
Chloephaga melanoptera	ganso-andino
Chloephaga picta	ganso-patagónico
Chloephaga hybrida	ganso-papa-algas
Chloephaga poliocephala	ganso-de-cabeça-cinzenta
Chloephaga rubidiceps	ganso-de-cabeça-ruiva
Radjah radjah	tadorna-da-oceânia
Tadorna tadorna	tadorna-branca
Tadorna ferruginea	tadorna-ferrugínea
Tadorna cana	tadorna-sul-africana
Tadorna tadornoides	tadorna-australiana
Tadorna variegata	tadorna-maori
Tadorna cristata	tadorna-de-crista
Malacorhynchus membranaceus	pato-d'orelhas-rosadas
Salvadorina waigiuensis	pato-da-papua
Cairina moschata	pato-mudo
Asarcornis scutulata	pato-d'asa-branca
Pteronetta hartlaubii	pato-de-hartlaub
Aix sponsa	pato-carolino
Aix galericulata	pato-mandarim
Chenonetta jubata	pato-de-crina
Nettapus auritus	ganso-pigmeu-africano
Nettapus coromandelianus	ganso-pigmeu-asiático
Nettapus pulchellus	ganso-pigmeu-australiano
Amazonetta brasiliensis	marrequinha-brasileira
Callonetta leucophrys	marrequinha-de-coleira
Lophonetta specularioides	pato-de-poupa-andino
Speculanas specularis	pato-de-lunetas
Sibirionetta formosa	marrequinha-formosa
Spatula querquedula	marreco
Spatula hottentota	marrequinha-de-bico-azul

Spatula puna	marrequinha-da-puna
Spatula versicolor	marrequinha-multicolor
Spatula platalea	pato-trombeteiro-ruivo
Spatula cyanoptera	marrequinha-canela
Spatula discors	pato-d'asa-azul
Spatula smithii	pato-trombeteiro-do-cabo
Spatula rhynchotis	pato-trombeteiro-da-oceânia
Spatula clypeata	pato-trombeteiro-comum
Mareca strepera	frisada
Mareca falcata	pato-falcado
Mareca penelope	piadeira-europeia
Mareca sibilatrix	piadeira-patagónica
Mareca americana	piadeira-americana
Mareca marecula	piadeira-de-amesterdão
Anas sparsa	pato-preto-africano
Anas undulata	pato-de-bico-amarelo
Anas melleri	pato-malgaxe
Anas superciliosa	pato-de-sobrancelhas
Anas laysanensis	pato-de-laysan
Anas wyvilliana	pato-havaiano
Anas luzonica	pato-filipino
Anas poecilorhyncha	pato-de-bico-pintado-indiano
Anas zonorhyncha	pato-de-bico-pintado-chinês
Anas platyrhynchos	pato-real
Anas fulvigula	pato-da-flórida
Anas rubripes	pato-sombrio
Anas diazi	pato-mexicano
Anas capensis	marrequinha-do-cabo
Anas bahamensis	arrabio-de-faces-brancas
Anas erythrorhyncha	marrequinha-de-bico-vermelho
Anas georgica	arrabio-de-bico-amarelo
Anas eatoni	arrabio-de-eaton
Anas acuta	arrabio-comum
Anas crecca	marrequinha-eurasiática
Anas carolinensis	marrequinha-americana
Anas flavirostris	marrequinha-de-bico-amarelo
Anas andium	marrequinha-andina
Anas gibberifrons	marrequinha-das-sundas
Anas albogularis	marrequinha-das-andamão
Anas theodori	marrequinha-das-maurícias
Anas gracilis	marrequinha-cinzenta
Anas castanea	marrequinha-castanha

Anas bernieri	marrequinha-malgaxe
Anas chlorotis	marrequinha-maori
Anas aucklandica	marrequinha-das-auckland
Anas nesiotis	marrequinha-das-campbell
Marmaronetta angustirostris	pardilheira
Rhodonessa caryophyllacea	pato-de-cabeça-rosa
Netta rufina	pato-de-bico-vermelho
Netta peposaca	zarro-patagónico
Netta erythrophthalma	zarro-meridional
Aythya valisineria	zarro-grande
Aythya americana	zarro-americano
Aythya ferina	zarro-comum
Aythya australis	zarro-australiano
Aythya innotata	zarro-malgaxe
Aythya baeri	zarro-de-baer
Aythya nyroca	zarro-castanho
Aythya novaeseelandiae	zarro-maori
Aythya collaris	zarro-de-colar
Aythya fuligula	zarro-negrinha
Aythya marila	zarro-bastardo
Aythya affinis	zarro-pequeno
Polysticta stelleri	êider-de-steller
Somateria fischeri	êider-de-lunetas
Somateria spectabilis	êider-real
Somateria mollissima	êider-comum
Histrionicus histrionicus	pato-arlequim
Camptorhynchus labradorius	pato-do-labrador
Melanitta perspicillata	negrola-de-lunetas
Melanitta fusca	negrola-d'asa-branca
Melanitta deglandi	negrola-ocidental
Melanitta stejnegeri	negrola-siberiana
Melanitta nigra	negrola-preta
Melanitta americana	negrola-americana
Clangula hyemalis	pato-rabilongo
Bucephala albeola	pato-de-touca-branca
Bucephala clangula	pato-d'olho-dourado
Bucephala islandica	pato-islandês
Mergellus albellus	merganso-pequeno
Lophodytes cucullatus	merganso-capuchinho
Mergus australis	merganso-das-auckland
Mergus octosetaceus	merganso-brasileiro
Mergus merganser	merganso-grande

Mergus serrator	merganso-de-poupa
Mergus squamatus	merganso-chinês
Heteronetta atricapilla	marrequinha-de-cabeça-preta
Nomonyx dominicus	pato-mascarado
Oxyura jamaicensis	pato-de-rabo-alçado-americano
Oxyura ferruginea	pato-de-rabo-alçado-andino
Oxyura vittata	pato-de-rabo-alçado-patagónico
Oxyura australis	pato-de-rabo-alçado-australiano
Oxyura maccoa	pato-de-rabo-alçado-africano
Oxyura leucocephala	pato-de-rabo-alçado-europeu
Biziura lobata	pato-de-rabo-alçado-almiscarado

Megapodiidae Perus-do-mato e Frangos-do-mato

Estas aves omnívoras de média dimensão habitam principalmente em florestas tropicais. Preparam cuidadosamente montículos de matéria orgânica onde enterram os ovos, sendo a incubação feita pelo calor da matéria circundante e não pelos progenitores. *Megapodius* significa "pés gigantes", aludindo aos seus fortes pés e patas, que as crias usam para quebrar a casca do ovo ao eclodir.

Espécies: 21

Distribuição: Filipinas, Austrália e parte do arquipélago indo-malaio

Alectura lathami	peru-do-mato-australiano
Aepypodius arfakianus	peru-do-mato-de-cabeça-azul
Aepypodius bruijnii	peru-do-mato-de-waigeo
Talegalla cuvieri	peru-do-mato-de-bico-vermelho
Talegalla fuscirostris	peru-do-mato-de-bico-preto
Talegalla jobiensis	peru-do-mato-de-patas-vermelhas
Leipoa ocellata	peru-do-mato-ocelado
Macrocephalon maleo	peru-do-mato-de-capacete
Eulipoa wallacei	frango-do-mato-das-molucas
Megapodius pritchardii	frango-do-mato-de-tonga
Megapodius laperouse	frango-do-mato-micronésio
Megapodius nicobariensis	frango-do-mato-de-nicobar
Megapodius cumingii	frango-do-mato-filipino
Megapodius bernsteinii	frango-do-mato-das-sula
Megapodius tenimberensis	frango-do-mato-das-tanimbar
Megapodius freycinet	frango-do-mato-escuro
Megapodius geelvinkianus	frango-do-mato-de-biak
Megapodius eremita	frango-do-mato-eremita
Megapodius layardi	frango-do-mato-de-vanuatu
Megapodius decollatus	frango-do-mato-da-papua
Megapodius reinwardt	frango-do-mato-de-reinwardt

Cracidae Chachalacas, Guanos e Mutuns

As aves desta família, embora geralmente não muito vistosas, são análogas aos faisões do Velho Mundo, percorrendo as florestas da América tropical em busca de frutos, sementes e folhas. Também como no caso dos faisões, são historicamente caçadas para consumo humano, tendo isso contribuído para a sua timidez e para o grave estatuto de conservação em que muitas espécies se encontram.

Espécies: 57

Distribuição: América do Sul e Central

Ortalis vetula	chachalaca-do-norte
Ortalis cinereiceps	chachalaca-de-cabeça-cinzenta
Ortalis garrula	chachalaca-d'asa-castanha
Ortalis ruficauda	chachalaca-de-crisso-ruivo
Ortalis erythroptera	chachalaca-de-cabeça-ruiva
Ortalis wagleri	chachalaca-de-barriga-ruiva
Ortalis poliocephala	chachalaca-mexicana
Ortalis canicollis	chachalaca-do-chaco
Ortalis leucogastra	chachalaca-de-barriga-branca
Ortalis guttata	chachalaca-pintada
Ortalis araucuan	chachalaca-nordestina
Ortalis squamata	chachalaca-escamosa
Ortalis columbiana	chachalaca-colombiana
Ortalis motmot	chachalaca-pequena
Ortalis ruficeps	chachalaca-paraense
Ortalis superciliaris	chachalaca-de-sobrancelhas
Penelope argyrotis	guano-de-cauda-barrada
Penelope barbata	guano-barbudo
Penelope ortoni	guano-do-chocó
Penelope montagnii	guano-andino
Penelope marail	guano-guianense
Penelope superciliaris	guano-d'orlas-ruivas
Penelope dabbenei	guano-de-faces-vermelhas
Penelope purpurascens	guano-de-crista
Penelope perspicax	guano-do-cauca
Penelope albipennis	guano-d'asa-branca
Penelope jacquacu	guano-amazónico
Penelope obscura	guano-de-patas-escuras
Penelope bridgesi	guano-dos-yungas
Penelope pileata	guano-de-coroa-branca

Penelope ochrogaster	guano-de-barriga-castanha
Penelope jacucaca	guano-de-sobrancelhas
Pipile pipile	guano-de-trinidade
Pipile cumanensis	guano-de-garganta-azul
Pipile grayi	guano-de-garganta-branca
Pipile cujubi	guano-de-garganta-vermelha
Pipile jacutinga	guano-de-testa-preta
Aburria aburri	guano-carunculado
Chamaepetes unicolor	guano-preto
Chamaepetes goudotii	guano-asa-de-foice
Penelopina nigra	guano-das-montanhas
Oreophasis derbianus	guano-cornudo
Nothocrax urumutum	mutum-nocturno
Mitu tomentosum	mutum-do-norte
Mitu salvini	mutum-de-barriga-branca
Mitu tuberosum	mutum-cavalo
Mitu mitu	mutum-nordestino
Pauxi pauxi	mutum-de-elmo
Pauxi unicornis	mutum-boliviano
Pauxi koepckeae	mutum-de-sira
Crax rubra	mutum-grande
Crax alberti	mutum-de-bico-azul
Crax daubentoni	mutum-colombiano
Crax alector	mutum-venezuelano
Crax globulosa	mutum-carunculado
Crax fasciolata	mutum-do-cerrado
Crax blumenbachii	mutum-de-bico-vermelho

As pintadas, também chamadas fracas, são aves galináceas, que apresentam a cabeça total ou parcialmente despida de penas. Nidificam no solo e alimentam-se de sementes e insectos. Vivem geralmente em pequenos bandos. Embora esta família seja endémica do continente africano, uma das espécies (a pintada-da-guiné) foi introduzida como ave doméstica noutros continentes, para fins alimentares ou para controlo de insectos.

Espécies: 8

Distribuição: África subsariana

Agelastes meleagrides	pintada-de-peito-branco
Agelastes niger	pintada-preta
Numida meleagris	pintada-da-guiné
Guttera plumifera	pintada-de-penacho
Guttera verreauxi	pintada-de-verreaux
Guttera pucherani	pintada-de-crista
Guttera edouardi	pintada-meridional
Acryllium vulturinum	pintada-vulturina

Odontophoridae Perdizes e Codornizes do Novo Mundo

Estas pequenas aves galináceas, algumas delas com cristas e adornos vistosos, alimentam-se de frutos, sementes e insectos. Surgem numa grande variedade de habitats, movimentando-se em grupo ao nível do solo. Aqui se incluem as perdizes e codornizes do Novo Mundo, assim como duas espécies de perdizes africanas, todas elas formando uma linhagem evolutiva que agora se sabe ser distinta dos fasianídeos.

Espécies: 34

Distribuição: Américas (principalmente) e África tropical (duas espécies)

Ptilopachus petrosus	perdiz-das-rochas
Ptilopachus nahani	perdiz-de-nahan
Dendrortyx barbatus	perdiz-barbuda
Dendrortyx macroura	perdiz-rabilonga
Dendrortyx leucophrys	perdiz-coroada
Oreortyx pictus	codorniz-serrana
Callipepla squamata	codorniz-escamosa
Callipepla douglasii	codorniz-elegante
Callipepla californica	codorniz-da-califórnia
Callipepla gambelii	codorniz-de-elmo
Philortyx fasciatus	codorniz-barrada
Colinus virginianus	codorniz-virginiana
Colinus nigrogularis	codorniz-de-garganta-preta
Colinus leucopogon	codorniz-de-barriga-pintada
Colinus cristatus	codorniz-de-crista
Odontophorus gujanensis	codorniz-amazónica
Odontophorus capueira	codorniz-d'asa-ponteada
Odontophorus melanotis	codorniz-d'orelhas-pretas
Odontophorus erythrops	codorniz-de-testa-ruiva
Odontophorus atrifrons	codorniz-de-testa-preta
Odontophorus hyperythrus	codorniz-castanha
Odontophorus melanonotus	codorniz-de-dorso-escuro
Odontophorus speciosus	codorniz-de-peito-ruivo
Odontophorus dialeucos	codorniz-do-tacarcuna
Odontophorus strophium	codorniz-de-garganta-branca
Odontophorus columbianus	codorniz-venezuelana
Odontophorus leucolaemus	codorniz-de-peito-preto
Odontophorus balliviani	codorniz-mascarada
Odontophorus stellatus	codorniz-estrelada

Odontophorus guttatus	codorniz-pintada
Dactylortyx thoracicus	codorniz-cantora
Cyrtonyx montezumae	codorniz-asteca
Cyrtonyx ocellatus	codorniz-ocelada
Rhynchortyx cinctus	codorniz-de-faces-ruivas

Phasianidae — Perdizes, Tetrazes e afins

Esta diversa família, bem conhecida da maioria das pessoas, inclui muitas espécies domesticadas pela sua carne e ovos, como o galo-vermelho, outras amplamente caçadas, como a codorniz-comum, e outras valorizadas como aves ornamentais, como é o caso do pavão-azul. Alimentam-se de sementes, folhas e invertebrados ao nível do solo. Na maioria delas, o dimorfismo sexual é pronunciado e os machos apresentam plumagem ricamente colorida e ornamentada.

Espécies: 189

Distribuição: América do Norte e Central, Europa, África, Ásia e Australásia

Xenoperdix udzungwensis	perdiz-das-udzungwa
Caloperdix oculeus	perdiz-ferrugínea
Rollulus rouloul	perdiz-de-crista
Melanoperdix niger	perdiz-preta
Arborophila torqueola	perdiz-mascarada
Arborophila rufipectus	perdiz-do-sujuão
Arborophila mandellii	perdiz-de-peito-castanho
Arborophila gingica	perdiz-de-fuquiém
Arborophila rufogularis	perdiz-de-garganta-ruiva
Arborophila rubrirostris	perdiz-de-bico-vermelho
Arborophila diversa	perdiz-siamesa
Arborophila cambodiana	perdiz-cambojana
Arborophila ardens	perdiz-de-ainão
Arborophila crudigularis	perdiz-da-formosa
Arborophila atrogularis	perdiz-de-faces-brancas
Arborophila brunneopectus	perdiz-de-dorso-barrado
Arborophila davidi	perdiz-de-pescoço-laranja
Arborophila hyperythra	perdiz-do-bornéu
Arborophila campbelli	perdiz-malaia
Arborophila rolli	perdiz-batak
Arborophila sumatrana	perdiz-de-samatra
Arborophila javanica	perdiz-javanesa
Arborophila orientalis	perdiz-oriental
Lerwa lerwa	perdiz-das-neves
Ithaginis cruentus	faisão-cruento
Tragopan melanocephalus	tragopã-de-dorso-cinzento
Tragopan satyra	tragopã-sátiro
Tragopan blythii	tragopã-de-barriga-branca
Tragopan temminckii	tragopã-de-faces-azuis
Tragopan caboti	tragopã-de-peito-branco
Tetraophasis obscurus	perdiz-faisão-de-verreaux
Tetraophasis szechenyii	perdiz-faisão-de-szechenyi

Lophophorus impejanus	monal-de-cauda-ruiva
Lophophorus sclateri	monal-de-cauda-branca
Lophophorus lhuysii	monal-de-cauda-azul
Pucrasia macrolopha	faisão-koklass
Meleagris gallopavo	peru-bravo
Meleagris ocellata	peru-ocelado
Bonasa umbellus	tetraz-de-colar
Tetrastes bonasia	galinha-montesa
Tetrastes sewerzowi	galinha-chinesa
Centrocercus urophasianus	galo-grande-das-artemísias
Centrocercus minimus	galo-pequeno-das-artemísias
Dendragapus obscurus	tetraz-sombrio
Dendragapus fuliginosus	tetraz-fuliginoso
Tympanuchus phasianellus	galo-rabilongo-das-pradarias
Tympanuchus cupido	galo-grande-das-pradarias
Tympanuchus pallidicinctus	galo-pequeno-das-pradarias
Lagopus leucura	lagópode-de-cauda-branca
Lagopus scotica	lagópode-escocês
Lagopus lagopus	lagópode-ruivo
Lagopus muta	lagópode-cinzento
Falcipennis falcipennis	tetraz-siberiano
Canachites canadensis	tetraz-canadiano
Tetrao urogallus	tetraz-real
Tetrao urogalloides	tetraz-de-bico-preto
Lyrurus tetrix	tetraz-lira
Lyrurus mlokosiewiczi	tetraz-do-cáucaso
Rhizothera longirostris	perdiz-bicuda
Rhizothera dulitensis	perdiz-do-dulit
Perdix hodgsoniae	perdiz-do-tibete
Perdix perdix	perdiz-cinzenta
Perdix dauurica	perdiz-dáurica
Syrmaticus soemmerringii	faisão-ferrugíneo
Syrmaticus reevesii	faisão-venerado
Syrmaticus mikado	faisão-mikado
Syrmaticus ellioti	faisão-de-elliot
Syrmaticus humiae	faisão-de-hume
Chrysolophus pictus	faisão-dourado
Chrysolophus amherstiae	faisão-de-lady-amherst
Phasianus colchicus	faisão-de-colar
Phasianus versicolor	faisão-verde
Catreus wallichii	faisão-de-penacho
Crossoptilon harmani	faisão-orelhudo-cinzento
Crossoptilon crossoptilon	faisão-orelhudo-branco
Crossoptilon mantchuricum	faisão-orelhudo-castanho
Crossoptilon auritum	faisão-orelhudo-azul
Lophura edwardsi	faisão-de-edwards
Lophura swinhoii	faisão-de-swinhoe
Lophura bulweri	faisão-de-bulwer

Lophura leucomelanos	faisão-kalij
Lophura nycthemera	faisão-prateado
Lophura erythrophthalma	faisão-de-cauda-ruiva-malaio
Lophura pyronota	faisão-de-cauda-ruiva-do-bornéu
Lophura diardi	faisão-siamês
Lophura inornata	faisão-desornado
Lophura rufa	faisão-nobre-malaio
Lophura ignita	faisão-nobre-do-bornéu
Rheinardia ocellata	argos-vietnamita
Rheinardia nigrescens	argos-malaio
Argusianus argus	argos-real
Afropavo congensis	pavão-congolês
Pavo cristatus	pavão-azul
Pavo muticus	pavão-verde
Tropicoperdix chloropus	perdiz-de-pernas-verdes
Tropicoperdix charltonii	perdiz-de-colar-castanho
Tropicoperdix graydoni	perdiz-de-sabá
Haematortyx sanguiniceps	perdiz-de-cabeça-vermelha
Galloperdix spadicea	perdiz-esporada-vermelha
Galloperdix lunulata	perdiz-esporada-pintada
Galloperdix bicalcarata	perdiz-esporada-cingalesa
Polyplectron napoleonis	faisão-ocelado-de-palawan
Polyplectron schleiermacheri	faisão-ocelado-do-bornéu
Polyplectron malacense	faisão-ocelado-malaio
Polyplectron germaini	faisão-ocelado-castanho
Polyplectron katsumatae	faisão-ocelado-de-ainão
Polyplectron bicalcaratum	faisão-ocelado-cinzento
Polyplectron inopinatum	faisão-ocelado-montês
Polyplectron chalcurum	faisão-ocelado-bronzeado
Bambusicola fytchii	perdiz-do-bambu-montesa
Bambusicola thoracicus	perdiz-do-bambu-chinesa
Bambusicola sonorivox	perdiz-do-bambu-da-formosa
Gallus varius	galo-verde
Gallus gallus	galo-vermelho
Gallus sonneratii	galo-cinzento
Gallus lafayettii	galo-cingalês
Peliperdix lathami	francolim-de-latham
Ortygornis sephaena	francolim-de-crista
Ortygornis pondicerianus	francolim-cinzento
Ortygornis gularis	francolim-palustre
Francolinus pintadeanus	francolim-perlado
Francolinus francolinus	francolim-preto
Francolinus pictus	francolim-pintado
Campocolinus coqui	francolim-das-pedras
Campocolinus albogularis	francolim-de-garganta-branca
Campocolinus schlegelii	francolim-de-schlegel
Scleroptila streptophora	francolim-de-colar
Scleroptila levaillantii	francolim-d'asa-vermelha

Scleroptila finschi	francolim-de-finsch
Scleroptila psilolaema	francolim-etíope
Scleroptila elgonensis	francolim-do-elgon
Scleroptila afra	francolim-d'asa-cinzenta
Scleroptila gutturalis	francolim-do-orange
Scleroptila shelleyi	francolim-de-shelley
Scleroptila whytei	francolim-de-whyte
Tetraogallus tibetanus	galo-das-neves-do-tibete
Tetraogallus altaicus	galo-das-neves-altaico
Tetraogallus caucasicus	galo-das-neves-do-cáucaso
Tetraogallus caspius	galo-das-neves-do-cáspio
Tetraogallus himalayensis	galo-das-neves-dos-himalaias
Ammoperdix griseogularis	perdiz-assobiadeira
Ammoperdix heyi	perdiz-do-deserto
Synoicus ypsilophorus	codorniz-australiana
Synoicus monorthonyx	codorniz-da-papua
Synoicus chinensis	codorniz-chinesa
Synoicus adansonii	codorniz-azul
Margaroperdix madagarensis	perdiz-malgaxe
Coturnix coturnix	codorniz-comum
Coturnix japonica	codorniz-japonesa
Coturnix delegorguei	codorniz-arlequim
Coturnix coromandelica	codorniz-pluvial
Coturnix pectoralis	codorniz-dos-restolhos
Coturnix novaezelandiae	codorniz-maori
Alectoris barbara	perdiz-moura
Alectoris melanocephala	perdiz-árabe
Alectoris rufa	perdiz-vermelha
Alectoris chukar	perdiz-chucar
Alectoris graeca	perdiz-grega
Alectoris philbyi	perdiz-de-garganta-preta
Alectoris magna	perdiz-magna
Perdicula asiatica	codorniz-de-garganta-ferrugínea
Perdicula argoondah	codorniz-das-rochas
Perdicula erythrorhyncha	codorniz-de-bico-vermelho
Perdicula manipurensis	codorniz-de-manipur
Ophrysia superciliosa	perdiz-dos-himalaias
Pternistis hartlaubi	francolim-de-hartlaub
Pternistis camerunensis	francolim-camaronês
Pternistis nobilis	francolim-nobre
Pternistis castaneicollis	francolim-de-nuca-castanha
Pternistis erckelii	francolim-de-erckel
Pternistis ochropectus	francolim-jibutiano
Pternistis swierstrai	francolim-da-montanha
Pternistis ahantensis	francolim-de-ahanta
Pternistis griseostriatus	francolim-de-riscas-cinzentas
Pternistis jacksoni	francolim-de-jackson
Pternistis adspersus	francolim-de-bico-vermelho

Pternistis capensis	francolim-do-cabo
Pternistis natalensis	francolim-de-natal
Pternistis hildebrandti	francolim-de-hildebrandt
Pternistis bicalcaratus	francolim-biesporado
Pternistis squamatus	francolim-escamoso
Pternistis icterorhynchus	francolim-de-bico-amarelo
Pternistis clappertoni	francolim-de-clapperton
Pternistis harwoodi	francolim-de-harwood
Pternistis swainsonii	francolim-de-swainson
Pternistis leucoscepus	francolim-de-pescoço-amarelo
Pternistis rufopictus	francolim-de-peito-cinzento
Pternistis afer	francolim-de-pescoço-vermelho

Caprimulgidae Noitibós

De hábitos essencialmente crepusculares ou nocturnos, os noitibós são aves de média dimensão que se alimentam de insectos. Nidificam no solo e passam o dia em repouso. À noite gostam de pousar nas estradas, o que faz com que sejam vítimas frequentes de atropelamento. O nome genérico *Caprimulgus* significa 'chupa-cabras', estando relacionado com uma crença antiga: a de que estas aves se alimentavam do leite das cabras.

Espécies: 98

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Eurostopodus argus	noitibó-malhado
Eurostopodus mystacalis	noitibó-de-garganta-branca
Eurostopodus nigripennis	noitibó-das-salomão
Eurostopodus exul	noitibó-da-nova-caledónia
Eurostopodus diabolicus	noitibó-satânico
Eurostopodus papuensis	noitibó-da-papua
Eurostopodus archboldi	noitibó-de-archbold
Lyncornis temminckii	noitibó-orelhudo-malaio
Lyncornis macrotis	noitibó-orelhudo-grande
Gactornis enarratus	noitibó-de-colar-ruivo
Chordeiles nacunda	noitibó-caminhante
Chordeiles pusillus	noitibó-anão
Chordeiles rupestris	noitibó-das-praias
Chordeiles acutipennis	noitibó-d'asa-fina
Chordeiles minor	noitibó-norte-americano
Chordeiles gundlachii	noitibó-das-antilhas
Lurocalis semitorquatus	noitibó-de-cauda-curta
Lurocalis rufiventris	noitibó-de-barriga-ruiva
Nyctiprogne leucopyga	noitibó-de-cauda-barrada
Nyctiprogne vielliardi	noitibó-baiano
Nyctipolus nigrescens	noitibó-das-rochas
Nyctipolus hirundinaceus	noitibó-da-caatinga
Nyctidromus albicollis	noitibó-pauraque
Nyctidromus anthonyi	noitibó-de-guaiaquil
Setopagis heterura	noitibó-de-todd
Setopagis parvula	noitibó-pequeno
Setopagis maculosa	noitibó-guianense
Tepuiornis whitelyi	noitibó-dos-tepuis
Eleothreptus anomalus	noitibó-do-paraná
Eleothreptus candicans	noitibó-d'asa-branca
Systellura longirostris	noitibó-de-manchas-brancas
Quechuavis decussata	noitibó-peruano
Uropsalis segmentata	noitibó-cauda-de-andorinha
Uropsalis lyra	noitibó-lira

Hydropsalis cayennensis	noitibó-de-cauda-branca
Hydropsalis climacocerca	noitibó-de-escada
Hydropsalis torquata	noitibó-tesoura
Hydropsalis forcipata	noitibó-tesourão
Antiurus maculicaudus	noitibó-de-cauda-pintada
Siphonorhis brewsteri	noitibó-dominicano-pequeno
Siphonorhis americana	noitibó-jamaicano
Nyctiphrynus rosenbergi	noitibó-do-chocó
Nyctiphrynus mcleodii	noitibó-asteca
Nyctiphrynus yucatanicus	noitibó-do-iucatão
Nyctiphrynus ocellatus	noitibó-ocelado
Phalaenoptilus nuttallii	noitibó-de-nuttall
Antrostomus carolinensis	noitibó-carolino
Antrostomus rufus	noitibó-ruivo
Antrostomus cubanensis	noitibó-cubano
Antrostomus ekmani	noitibó-dominicano-grande
Antrostomus salvini	noitibó-de-colar-pardo
Antrostomus badius	noitibó-guatemalteco
Antrostomus sericocaudatus	noitibó-cauda-de-seda
Antrostomus ridgwayi	noitibó-de-colar-pálido
Antrostomus vociferus	noitibó-cantor-norte-americano
Antrostomus arizonae	noitibó-cantor-mexicano
Antrostomus noctitherus	noitibó-porto-riquenho
Antrostomus saturatus	noitibó-sombrio
Veles binotatus	noitibó-bimaculado
Caprimulgus ruficollis	noitibó-de-nuca-vermelha
Caprimulgus indicus	noitibó-da-selva
Caprimulgus jotaka	noitibó-cinzento
Caprimulgus phalaena	noitibó-de-palau
Caprimulgus europaeus	noitibó-europeu
Caprimulgus fraenatus	noitibó-escuro
Caprimulgus rufigena	noitibó-de-faces-ruivas
Caprimulgus aegyptius	noitibó-do-deserto
Caprimulgus mahrattensis	noitibó-de-sykes
Caprimulgus nubicus	noitibó-núbio
Caprimulgus eximius	noitibó-dourado
Caprimulgus atripennis	noitibó-marajá
Caprimulgus macrurus	noitibó-de-cauda-larga
Caprimulgus meesi	noitibó-de-mees
Caprimulgus ritae	noitibó-timorense
Caprimulgus andamanicus	noitibó-das-andamão
Caprimulgus manillensis	noitibó-filipino
Caprimulgus celebensis	noitibó-de-celebes
Caprimulgus donaldsoni	noitibó-dos-espinheiros
Caprimulgus pectoralis	noitibó-de-pescoço-dourado
Caprimulgus poliocephalus	noitibó-da-montanha
Caprimulgus asiaticus	noitibó-indiano
Caprimulgus madagascariensis	noitibó-malgaxe

Caprimulgus natalensis	noitibó-de-natal
Caprimulgus solala	noitibó-de-nechisar
Caprimulgus inornatus	noitibó-saheliano
Caprimulgus stellatus	noitibó-estrelado
Caprimulgus affinis	noitibó-da-savana
Caprimulgus griseatus	noitibó-grisalho
Caprimulgus tristigma	noitibó-sardento
Caprimulgus concretus	noitibó-de-bonaparte
Caprimulgus pulchellus	noitibó-de-salvadori
Caprimulgus prigoginei	noitibó-das-itombwe
Caprimulgus batesi	noitibó-de-bates
Caprimulgus climacurus	noitibó-rabilongo
Caprimulgus clarus	noitibó-de-cauda-fina
Caprimulgus fossii	noitibó-moçambicano
Caprimulgus longipennis	noitibó-porta-estandarte
Caprimulgus vexillarius	noitibó-de-balanceiros

Steatornithidae Guácharo

Esta curiosa ave partilha a morfologia e os hábitos nocturnos com os noitibós, mas nidifica colonialmente em grutas e, em vez de insectos, alimenta-se de frutas. Para esse propósito, percorre longas distâncias e utiliza sentidos muito apurados - visão, olfacto e uma capacidade única nas aves, a ecolocação (tal como nos morcegos). A sua dieta rica em frutas oleosas é a razão pela qual as crias eram em tempos capturadas e delas se extraía óleo para lâmpadas. Esta é a origem do nome "oilbird" em inglês.

Espécies: 1

Distribuição: Noroeste da América do Sul

Steatornis caripensis	guácharo

Nyctibiidae Nictíbios

Os nictíbios são aves nocturnas e insectívoras, parentes próximos dos noitibós, que habitam florestas tropicais das Américas. Ao contrário dos noitibós, escolhem poisos expostos em ramos ou árvores mortas, posicionando-se verticalmente e utilizando a sua plumagem críptica para se fazerem passar por parte desse ramo ou tronco. Estas aves emitem também fortes e características vocalizações.

Espécies: 7

Distribuição: América do Sul e Central

Phyllaemulor bracteatus	nictíbio-ruivo
Nyctibius grandis	nictíbio-grande
Nyctibius aethereus	nictíbio-rabilongo
Nyctibius jamaicensis	nictíbio-jamaicano
Nyctibius griseus	nictíbio-comum
Nyctibius maculosus	nictíbio-andino
Nyctibius leucopterus	nictíbio-d'asa-branca

Podargidae — Bocas-de-sapo

Os bocas-de-sapo são aves nocturnas de média dimensão e coloração críptica que habitam principalmente em florestas. Com o seu bico largo e poderoso, alimentam-se de insectos mas também ocasionalmente vertebrados. Ao contrário dos noitibós, caçam a partir de um poleiro, de onde detectam presas no solo ou nas árvores, voando depois para as capturar.

Espécies: 16

Distribuição: Ásia (sul e sudeste), arquipélago indo-malaio e Austrália

Podargus ocellatus	boca-de-sapo-ocelado
Podargus papuensis	boca-de-sapo-da-papua
Podargus strigoides	boca-de-sapo-australiano
Rigidipenna inexpectata	boca-de-sapo-das-salomão
Batrachostomus auritus	boca-de-sapo-orelhudo
Batrachostomus harterti	boca-de-sapo-do-dulit
Batrachostomus septimus	boca-de-sapo-filipino
Batrachostomus stellatus	boca-de-sapo-estrelado
Batrachostomus moniliger	boca-de-sapo-cingalês
Batrachostomus hodgsoni	boca-de-sapo-rabilongo
Batrachostomus poliolophus	boca-de-sapo-de-samatra
Batrachostomus mixtus	boca-de-sapo-do-bornéu
Batrachostomus javensis	boca-de-sapo-javanês
Batrachostomus affinis	boca-de-sapo-de-blyth
Batrachostomus chaseni	boca-de-sapo-de-palawan
Batrachostomus cornutus	boca-de-sapo-cornudo

Aegothelidae Noitibós-coruja

Estas aves nocturnas efectivamente parecem uma mistura entre um noitibó e uma pequena coruja. Ocorrem em florestas, à excepção de uma das espécies australianas, que ocupa também matos secos. São aves insectívoras, que capturam as suas presas a partir de um poleiro na vegetação. O noitibó-coruja-da-nova-caledónia, endémico dessa ilha e criticamente ameaçado, foi redescoberto em 1995, não tendo sido avistado desde o século XIX.

Espécies: 10

Distribuição: Austrália, Papua e ilhas circundantes

Aegotheles insignis	noitibó-coruja-grande
Aegotheles tatei	noitibó-coruja-estrelado
Aegotheles crinifrons	noitibó-coruja-das-molucas
Aegotheles wallacii	noitibó-coruja-de-wallace
Aegotheles albertisi	noitibó-coruja-montês
Aegotheles savesi	noitibó-coruja-da-nova-caledónia
Aegotheles bennettii	noitibó-coruja-listado
Aegotheles affinis	noitibó-coruja-das-arfak
Aegotheles terborghi	noitibó-coruja-de-karimui
Aegotheles cristatus	noitibó-coruja-australiano

Hemiprocnidae — Andorinhões-arborícolas

Como o nome indica, estes andorinhões distinguem-se dos seus primos na família *Apodidae* pela capacidade de pousar em árvores, não passando tanto tempo da sua vida no ar. Vivem em zonas arborizadas, onde se alimentam de insectos em voo. No ninho, incubam os ovos com o corpo em posição vertical, tornando a localização do ninho menos evidente para predadores.

Espécies: 4

Distribuição: sul e sudeste da Ásia, estendendo-se até à Papua

Hemiprocne coronata	andorinhão-arborícola-coroado
Hemiprocne longipennis	andorinhão-arborícola-d'asa-longa
Hemiprocne comata	andorinhão-arborícola-pequeno
Hemiprocne mystacea	andorinhão-arborícola-de-bigodes

Apodidae Andorinhões

Os andorinhões são aves de hábitos aéreos, que passam grande parte da sua vida no ar. Conseguem alimentar-se em voo, abrindo o bico para capturar as suas presas. O voo é muito rápido e em certas espécies pode superar os 160 km/h. Com as suas longas asas em forma de foice podem fazer as lembrar as andorinhas, no entanto em termos taxonómicos são mais próximos dos colibris.

Espécies: 109

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Cypseloides cherriei	andorinhão-de-loros-brancos
Cypseloides cryptus	andorinhão-de-queixo-branco
Cypseloides storeri	andorinhão-de-testa-branca
Cypseloides fumigatus	andorinhão-sombrio
Cypseloides rothschildi	andorinhão-de-rothschild
Cypseloides niger	andorinhão-escuro
Cypseloides lemosi	andorinhão-de-peito-branco
Cypseloides senex	andorinhão-do-iguaçu
Streptoprocne phelpsi	andorinhão-dos-tepuis
Streptoprocne rutila	andorinhão-de-coleira-ruiva
Streptoprocne zonaris	andorinhão-de-coleira-branca
Streptoprocne biscutata	andorinhão-de-coleira-interrompida
Streptoprocne semicollaris	andorinhão-de-nuca-branca
Hydrochous gigas	andorinhão-gigante
Collocalia affinis	andorinhão-de-pés-emplumados
Collocalia marginata	andorinhão-de-lução
Collocalia isonota	andorinhão-dos-cumes
Collocalia sumbawae	andorinhão-das-pequenas-sundas
Collocalia neglecta	andorinhão-timorense
Collocalia esculenta	andorinhão-lustroso
Collocalia uropygialis	andorinhão-satinado
Collocalia dodgei	andorinhão-do-bornéu
Collocalia linchi	andorinhão-das-cavernas
Collocalia natalis	andorinhão-da-ilha-de-natal
Collocalia troglodytes	andorinhão-pigmeu
Aerodramus elaphrus	andorinhão-das-seicheles
Aerodramus francicus	andorinhão-das-mascarenhas
Aerodramus unicolor	andorinhão-malabar
Aerodramus mearnsi	andorinhão-filipino
Aerodramus infuscatus	andorinhão-das-molucas
Aerodramus hirundinaceus	andorinhão-montês
Aerodramus spodiopygius	andorinhão-cintado
Aerodramus terraereginae	andorinhão-australiano
Aerodramus brevirostris	andorinhão-dos-himalaias
Aerodramus vulcanorum	andorinhão-vulcânico

Aerodramus whiteheadi	andorinhão-de-whitehead
Aerodramus nuditarsus	andorinhão-de-tarso-nu
Aerodramus orientalis	andorinhão-de-mayr
Aerodramus salangana	andorinhão-das-sundas
Aerodramus vanikorensis	andorinhão-uniforme
Aerodramus amelis	andorinhão-de-mindanau
Aerodramus pelewensis	andorinhão-de-palau
Aerodramus bartschi	andorinhão-das-marianas
Aerodramus inquietus	andorinhão-das-carolinas
Aerodramus leucophaeus	andorinhão-polinésio
Aerodramus sawtelli	andorinhão-de-atiu
Aerodramus ocistus	andorinhão-das-marquesas
Aerodramus maximus	andorinhão-de-ninho-preto
Aerodramus fuciphagus	andorinhão-de-ninho-branco
Aerodramus papuensis	andorinhão-tridáctilo
Schoutedenapus myoptilus	andorinhão-de-xoa
Mearnsia picina	andorinhão-espinhoso-filipino
Mearnsia novaeguineae	andorinhão-espinhoso-da-papua
Zoonavena grandidieri	andorinhão-malgaxe
Zoonavena thomensis	andorinhão-de-são-tomé
Zoonavena sylvatica	andorinhão-indiano
Telacanthura ussheri	andorinhão-de-ussher
Telacanthura melanopygia	andorinhão-de-ituri
Rhaphidura leucopygialis	andorinhão-de-rabo-prateado
Rhaphidura sabini	andorinhão-de-sabine
Neafrapus cassini	andorinhão-de-cassin
Neafrapus boehmi	andorinhão-de-böhm
Hirundapus caudacutus	andorinhão-mongol
Hirundapus cochinchinensis	andorinhão-de-dorso-prateado
Hirundapus giganteus	andorinhão-de-dorso-castanho
Hirundapus celebensis	andorinhão-púrpura
Chaetura cinereiventris	andorinhão-d'uropígio-cinzento
Chaetura spinicaudus	andorinhão-d'uropígio-branco
Chaetura martinica	andorinhão-de-martinica
Chaetura fumosa	andorinhão-costa-riquenho
Chaetura egregia	andorinhão-d'uropígio-pálido
Chaetura pelagica	andorinhão-de-rabo-espinhoso
Chaetura vauxi	andorinhão-de-vaux
Chaetura chapmani	andorinhão-de-chapman
Chaetura andrei	andorinhão-de-cauda-fuliginosa
Chaetura meridionalis	andorinhão-de-sick
Chaetura brachyura	andorinhão-de-cauda-curta
Aeronautes saxatalis	andorinhão-de-garganta-branca
Aeronautes montivagus	andorinhão-de-pontas-brancas
Aeronautes andecolus	andorinhão-andino
Tachornis phoenicobia	andorinhão-das-palmeiras-das-antilhas
Tachornis furcata	andorinhão-das-palmeiras-venezuelano
Tachornis squamata	andorinhão-das-palmeiras-amazónico

Panyptila sanctihieronymi	andorinhão-tesoura-grande
Panyptila cayennensis	andorinhão-tesoura-pequeno
Cypsiurus parvus	andorinhão-das-palmeiras-africano
Cypsiurus gracilis	andorinhão-das-palmeiras-malgaxe
Cypsiurus balasiensis	andorinhão-das-palmeiras-asiático
Tachymarptis melba	andorinhão-real
Tachymarptis aequatorialis	andorinhão-malhado
Apus alexandri	andorinhão-de-cabo-verde
Apus apus	andorinhão-preto
Apus unicolor	andorinhão-da-serra
Apus niansae	andorinhão-de-nyanza
Apus pallidus	andorinhão-pálido
Apus barbatus	andorinhão-africano
Apus balstoni	andorinhão-de-balston
Apus sladeniae	andorinhão-de-fernando-pó
Apus berliozi	andorinhão-de-berlioz
Apus bradfieldi	andorinhão-de-bradfield
Apus pacificus	andorinhão-asiático
Apus leuconyx	andorinhão-de-cauda-forcada
Apus cooki	andorinhão-de-cook
Apus acuticauda	andorinhão-de-dorso-escuro
Apus affinis	andorinhão-pequeno
Apus nipalensis	andorinhão-doméstico
Apus horus	andorinhão-das-barreiras
Apus caffer	andorinhão-cafre
Apus batesi	andorinhão-camaronês

Trochilidae Colibris

Os colibris formam a terceira família de aves mais numerosa, incluindo também a ave mais pequena do mundo, o colibri-abelha (com cerca de 2 g). Estas carismáticas aves, de plumagem iridescente, cores garridas e ornamentos extraordinários, habitam uma grande diversidade de habitats das Américas. São extremamente activos e ágeis, para garantir acesso às flores de onde obtêm a sua fonte de alimento principal, o néctar.

Espécies: 367

Distribuição: Américas

Topaza pella	colibri-topázio
Topaza pyra	colibri-de-fogo
Florisuga mellivora	colibri-de-nuca-branca
Florisuga fusca	colibri-preto
Eutoxeres aquila	bico-de-foice-de-pontas-brancas
Eutoxeres condamini	bico-de-foice-de-pontas-amareladas
Ramphodon naevius	eremita-bico-de-serra
Glaucis dohrnii	eremita-de-espírito-santo
Glaucis aeneus	eremita-bronze
Glaucis hirsutus	eremita-de-peito-ruivo
Threnetes ruckeri	eremita-barbudo-ocidental
Threnetes leucurus	eremita-barbudo-oriental
Threnetes niger	eremita-barbudo-guianense
Anopetia gounellei	eremita-de-cauda-larga
Phaethornis squalidus	eremita-de-garganta-fusca
Phaethornis rupurumii	eremita-do-rupununi
Phaethornis longuemareus	eremita-pequeno
Phaethornis aethopygus	eremita-do-tapajós
Phaethornis idaliae	eremita-anão
Phaethornis nattereri	eremita-canela
Phaethornis atrimentalis	eremita-de-garganta-preta
Phaethornis striigularis	eremita-de-garganta-riscada
Phaethornis griseogularis	eremita-de-garganta-cinzenta
Phaethornis ruber	eremita-avermelhado
Phaethornis stuarti	eremita-de-sobrancelha
Phaethornis subochraceus	eremita-ocre
Phaethornis augusti	eremita-de-cabeça-cinzenta
Phaethornis pretrei	eremita-do-planalto
Phaethornis eurynome	eremita-escamoso
Phaethornis anthophilus	eremita-pálido
Phaethornis hispidus	eremita-de-barba-branca
Phaethornis yaruqui	eremita-do-chocó
Phaethornis guy	eremita-verde
Phaethornis syrmatophorus	eremita-de-barriga-fulva

Phaethornis koepckeae	eremita-de-koepcke
Phaethornis philippii	eremita-bico-de-agulha
Phaethornis bourcieri	eremita-de-bico-direito
Phaethornis mexicanus	eremita-mexicano
Phaethornis longirostris	eremita-de-bico-comprido
Phaethornis superciliosus	eremita-rabilongo
Phaethornis malaris	eremita-de-bico-grosso
Doryfera ludovicae	bico-de-lança-grande
Doryfera johannae	bico-de-lança-pequeno
Schistes albogularis	colibri-adaga-ocidental
Schistes geoffroyi	colibri-adaga-oriental
Augastes scutatus	colibri-de-gravata-mineiro
Augastes lumachella	colibri-de-gravata-baiano
Colibri delphinae	colibri-castanho
Colibri thalassinus	colibri-mexicano
Colibri cyanotus	colibri-d'orelhas-pequeno
Colibri coruscans	colibri-d'orelhas-grande
Colibri serrirostris	colibri-d'orelhas-oriental
Androdon aequatorialis	colibri-de-bico-denteado
Heliactin bilophus	colibri-chifre-de-ouro
Heliothryx barroti	colibri-de-coroa-púrpura
Heliothryx auritus	colibri-de-bochechas-azuis
Polytmus guainumbi	colibri-de-bico-curvo
Polytmus milleri	colibri-dos-tepuis
Polytmus theresiae	colibri-verde
Avocettula recurvirostris	colibri-alfaiate-amazónico
Chrysolampis mosquitus	colibri-rubi
Anthracothorax mango	colibri-jamaicano
Anthracothorax viridigula	colibri-de-gravata-dos-mangais
Anthracothorax prevostii	colibri-de-gravata-verde
Anthracothorax veraguensis	colibri-de-veragua
Anthracothorax nigricollis	colibri-de-gravata-preta
Anthracothorax dominicus	colibri-das-antilhas
Anthracothorax aurulentus	colibri-porto-riquenho-dourado
Anthracothorax viridis	colibri-porto-riquenho-verde
Eulampis holosericeus	colibri-caribenho-verde
Eulampis jugularis	colibri-caribenho-roxo
Heliangelus mavors	colibri-de-garganta-laranja
Heliangelus amethysticollis	colibri-anjo-ametista
Heliangelus clarisse	colibri-de-longuemare
Heliangelus spencei	colibri-de-mérida
Heliangelus strophianus	colibri-peitoral
Heliangelus exortis	colibri-turmalina
Heliangelus micraster	colibri-chama
Heliangelus viola	colibri-anjo-violeta
Heliangelus regalis	colibri-real
Sephanoides sephaniodes	colibri-austral
Sephanoides fernandensis	colibri-de-joão-fernandes

Discosura conversii	colibri-espinhoso-verde
Discosura popelairii	colibri-de-filamentos
Discosura langsdorffi	colibri-espinhoso-de-peito-preto
Discosura letitiae	colibri-espinhoso-acobreado
Discosura longicaudus	colibri-de-bandeirinhas
Lophornis ornatus	colibri-de-leque-canela
Lophornis gouldii	colibri-de-leque-pintalgado
Lophornis magnificus	colibri-de-leque-barrado
Lophornis brachylophus	colibri-de-guerrero
Lophornis delattrei	colibri-de-crista-ruiva
Lophornis stictolophus	colibri-de-crista-pintada
Lophornis chalybeus	colibri-de-leque-verde-oriental
Lophornis verreauxii	colibri-de-leque-verde-ocidental
Lophornis pavoninus	colibri-pavão
Lophornis helenae	colibri-de-crista-preta
Lophornis adorabilis	colibri-de-crista-branca
Phlogophilus hemileucurus	colibri-de-pontas-brancas-equatoriano
Phlogophilus harterti	colibri-de-pontas-brancas-peruano
Adelomyia melanogenys	colibri-pintalgado
Aglaiocercus kingii	silfo-de-cauda-azul
Aglaiocercus coelestis	silfo-de-cauda-violeta
Aglaiocercus berlepschi	silfo-venezuelano
Sappho sparganurus	colibri-cometa-dourado
Polyonymus caroli	colibri-cometa-bronze
Taphrolesbia griseiventris	colibri-cometa-cinzento
Oreotrochilus estella	colibri-da-puna
Oreotrochilus leucopleurus	colibri-de-flancos-brancos
Oreotrochilus chimborazo	colibri-equatoriano
Oreotrochilus cyanolaemus	colibri-do-cerro-de-arcos
Oreotrochilus stolzmanni	colibri-de-stolzmann
Oreotrochilus melanogaster	colibri-de-peito-preto
Oreotrochilus adela	colibri-de-cochabamba
Opisthoprora euryptera	colibri-alfaiate-andino
Lesbia victoriae	colibri-rabilongo-grande
Lesbia nuna	colibri-rabilongo-pequeno
Ramphomicron dorsale	colibri-agulha-de-santa-marta
Ramphomicron microrhynchum	colibri-agulha-comum
Chalcostigma heteropogon	colibri-bico-de-espinho
Chalcostigma herrani	colibri-arco-íris
Chalcostigma ruficeps	colibri-de-barrete
Chalcostigma olivaceum	colibri-oliváceo
Chalcostigma stanleyi	colibri-de-manto-azul
Oxypogon stuebelii	colibri-de-poupa-do-nevado
Oxypogon cyanolaemus	colibri-de-poupa-de-santa-marta
Oxypogon lindenii	colibri-de-poupa-de-mérida
Oxypogon guerinii	colibri-de-poupa-de-bogotá
Oreonympha nobilis	colibri-barbudo
Metallura tyrianthina	metalura-púrpura

Metallura iracunda	metalura-de-perijá
Metallura williami	metalura-verde
Metallura baroni	metalura-de-azuay
Metallura odomae	metalura-da-neblina
Metallura theresiae	metalura-acobreado
Metallura eupogon	metalura-barba-de-fogo
Metallura aeneocauda	metalura-escamoso
Metallura phoebe	metalura-preto
Haplophaedia aureliae	calçadinho-esverdeado-do-norte
Haplophaedia assimilis	calçadinho-esverdeado-do-sul
Haplophaedia lugens	calçadinho-grisalho
Eriocnemis nigrivestis	calçadinho-de-peito-preto
Eriocnemis isabellae	calçadinho-do-pinche
Eriocnemis vestita	calçadinho-reluzente
Eriocnemis derbyi	calçadinho-escuro
Eriocnemis godini	calçadinho-turquesa
Eriocnemis cupreoventris	calçadinho-acobreado
Eriocnemis luciani	calçadinho-safira
Eriocnemis mosquera	calçadinho-dourado
Eriocnemis glaucopoides	calçadinho-de-testa-azul
Eriocnemis mirabilis	calçadinho-multicolor
Eriocnemis aline	calçadinho-de-peito-branco
Loddigesia mirabilis	colibri-de-espátulas
Aglaeactis cupripennis	colibri-ferruginoso
Aglaeactis castelnaudii	colibri-condecorado
Aglaeactis aliciae	colibri-de-alicia
Aglaeactis pamela	colibri-de-capuz-preto
Coeligena coeligena	inca-bronze
Coeligena wilsoni	inca-pardo
Coeligena prunellei	inca-preto
Coeligena conradii	inca-verde-de-colar
Coeligena torquata	inca-escuro-de-colar
Coeligena inca	inca-de-colar-laranja
Coeligena violifer	inca-de-garganta-violeta
Coeligena iris	inca-arco-íris
Coeligena phalerata	inca-de-cauda-branca
Coeligena orina	inca-fusco
Coeligena lutetiae	inca-d'asa-caramelo
Coeligena consita	inca-de-perijá
Coeligena bonapartei	inca-de-barriga-dourada
Coeligena eos	inca-de-cauda-dourada
Coeligena helianthea	inca-de-garganta-azul
Lafresnaya lafresnayi	colibri-aveludado
Ensifera ensifera	colibri-bico-de-espada
Pterophanes cyanopterus	colibri-d'asa-azul
Boissonneaua flavescens	colibri-de-cauda-amarelada
Boissonneaua matthewsii	colibri-de-peito-ruivo
Boissonneaua jardini	colibri-de-sete-cores

Ocreatus underwoodii	colibri-de-raquetes-nortenho
Ocreatus peruanus	colibri-de-raquetes-peruano
Ocreatus addae	colibri-de-raquetes-meridional
Urochroa bougueri	colibri-de-loros-ruivos
Urochroa leucura	colibri-de-dorso-verde
Urosticte benjamini	colibri-de-pontas-brancas-ocidental
Urosticte ruficrissa	colibri-de-pontas-brancas-oriental
Heliodoxa xanthogonys	brilhante-dos-tepuis
Heliodoxa gularis	brilhante-de-garganta-rosa
Heliodoxa branickii	brilhante-d'asa-canela
Heliodoxa schreibersii	brilhante-de-garganta-preta
Heliodoxa aurescens	brilhante-de-peito-laranja
Heliodoxa rubinoides	brilhante-de-peito-fulvo
Heliodoxa jacula	brilhante-de-testa-verde
Heliodoxa imperatrix	brilhante-imperador
Heliodoxa leadbeateri	brilhante-de-testa-violeta
Heliodoxa rubricauda	colibri-de-cauda-rubi
Patagona peruviana	colibri-gigante-do-norte
Patagona gigas	colibri-gigante-do-sul
Sternoclyta cyanopectus	colibri-de-barra-violeta
Hylonympha macrocerca	colibri-tesoura-azul
Eugenes fulgens	colibri-de-rivoli
Eugenes spectabilis	colibri-magnifico
Panterpe insignis	colibri-garganta-de-fogo
Heliomaster longirostris	colibri-de-bico-comprido
Heliomaster constantii	colibri-de-constant
Heliomaster squamosus	colibri-de-peito-riscado
Heliomaster furcifer	colibri-de-barba-azul
Lampornis hemileucus	colibri-de-garganta-violeta
Lampornis clemenciae	colibri-de-garganta-azul
Lampornis amethystinus	colibri-de-garganta-ametista
Lampornis viridipallens	colibri-de-garganta-verde
Lampornis sybillae	colibri-de-peito-verde
Lampornis calolaemus	colibri-de-garganta-púrpura
Lampornis castaneoventris	colibri-de-talamanca
Lamprolaima rhami	colibri-de-garganta-grená
Calliphlox amethystina	colibri-ametista
Myrtis fanny	colibri-de-coleira-roxa
Rhodopis vesper	colibri-dos-oásis
Myrmia micrura	colibri-de-cauda-curta
Thaumastura cora	colibri-tesoura-cinzento
Philodice bryantae	colibri-de-garganta-magenta
Philodice mitchellii	colibri-de-mitchell
Eulidia yarrellii	colibri-de-arica
Microstilbon burmeisteri	colibri-de-cauda-estreita
Chaetocercus mulsant	colibri-de-mulsant
Chaetocercus bombus	colibri-abelhão
Chaetocercus heliodor	colibri-de-heliodoro

Chaetocercus astreans	colibri-pequeno-de-santa-marta
Chaetocercus berlepschi	colibri-de-esmeraldas
Chaetocercus jourdanii	colibri-de-jourdan
Tilmatura dupontii	colibri-de-cauda-brilhante
Doricha enicura	colibri-de-cauda-fina
Doricha eliza	colibri-tesourinha
Calothorax lucifer	colibri-luminoso
Calothorax pulcher	colibri-belo
Archilochus alexandri	colibri-de-garganta-preta
Archilochus colubris	colibri-de-garganta-rubi
Mellisuga minima	colibri-verbena
Mellisuga helenae	colibri-abelha
Nesophlox evelynae	colibri-das-bahamas
Nesophlox lyrura	colibri-de-inagua
Calypte anna	colibri-de-anna
Calypte costae	colibri-de-costa
Selasphorus calliope	colibri-calíope
Selasphorus rufus	colibri-ruivo
Selasphorus sasin	colibri-de-allen
Selasphorus platycercus	colibri-de-cauda-larga
Selasphorus heloisa	colibri-de-heloísa
Selasphorus ellioti	colibri-de-elliot
Selasphorus flammula	colibri-dos-vulcões
Selasphorus scintilla	colibri-cintilante
Selasphorus ardens	colibri-de-garganta-ardente
Phaeoptila sordida	colibri-escuro
Riccordia ricordii	esmeralda-cubana
Riccordia bracei	esmeralda-de-brace
Riccordia swainsonii	esmeralda-dominicana
Riccordia maugaeus	esmeralda-porto-riquenha
Riccordia bicolor	colibri-bicolor
Cynanthus latirostris	colibri-de-bico-largo
Cynanthus lawrencei	colibri-de-três-marias
Cynanthus doubledayi	colibri-de-doubleday
Cynanthus auriceps	esmeralda-mexicana
Cynanthus forficatus	esmeralda-de-cozumel
Cynanthus canivetii	esmeralda-de-canivet
Chlorostilbon assimilis	esmeralda-dos-jardins
Chlorostilbon melanorhynchus	esmeralda-ocidental
Chlorostilbon gibsoni	esmeralda-de-bico-vermelho
Chlorostilbon mellisugus	esmeralda-de-cauda-azul
Chlorostilbon olivaresi	esmeralda-de-chiribiquete
Chlorostilbon lucidus	esmeralda-de-bico-laranja
Chlorostilbon russatus	esmeralda-acobreada
Chlorostilbon stenurus	esmeralda-de-cauda-estreita
Chlorostilbon alice	esmeralda-de-cauda-verde
Chlorostilbon poortmani	esmeralda-de-cauda-curta
Basilinna leucotis	colibri-d'orelhas-brancas

Basilinna xantusii	colibri-de-xantus
Pampa curvipennis	asa-de-sabre-mexicano
Pampa pampa	asa-de-sabre-de-cauda-larga
Pampa excellens	asa-de-sabre-de-cauda-comprida
Pampa rufa	asa-de-sabre-ruivo
Abeillia abeillei	colibri-de-garganta-esmeralda
Klais guimeti	colibri-de-cabeça-violeta
Orthorhyncus cristatus	colibri-de-crista-das-antilhas
Anthocephala floriceps	colibri-florido-de-santa-marta
Anthocephala berlepschi	colibri-florido-de-tolima
Stephanoxis lalandi	colibri-de-crista-verde
Stephanoxis loddigesii	colibri-de-crista-violeta
Campylopterus largipennis	asa-de-sabre-cinzento
Campylopterus calcirupicola	asa-de-sabre-do-cerrado
Campylopterus diamantinensis	asa-de-sabre-de-diamantina
Campylopterus hyperythrus	asa-de-sabre-do-roraima
Campylopterus ensipennis	asa-de-sabre-de-cauda-branca
Campylopterus falcatus	asa-de-sabre-lazúli
Campylopterus phainopeplus	asa-de-sabre-de-santa-marta
Campylopterus hemileucurus	asa-de-sabre-violeta
Campylopterus duidae	asa-de-sabre-do-duida
Campylopterus villaviscensio	asa-de-sabre-do-napo
Chalybura urochrysia	colibri-de-cauda-bronze
Chalybura buffonii	colibri-de-buffon
Thalurania colombica	colibri-coroado
Thalurania furcata	colibri-tesoura-verde
Thalurania watertonii	colibri-de-dorso-violeta
Thalurania glaucopis	colibri-de-testa-violeta
Microchera albocoronata	colibri-de-coroa-branca
Microchera cupreiceps	esmeralda-de-coroa-cobreada
Microchera chionura	esmeralda-de-cauda-branca
Goldmania violiceps	colibri-de-goldman
Goldmania bella	colibri-do-pirre
Eupherusa ridgwayi	colibri-ninfa
Eupherusa poliocerca	colibri-de-cauda-branca
Eupherusa cyanophrys	colibri-de-oaxaca
Eupherusa eximia	colibri-de-cauda-raiada
Eupherusa nigriventris	colibri-de-barriga-preta
Phaeochroa cuvierii	colibri-de-peito-escamoso
Leucippus fallax	colibri-ocre
Thaumasius baeri	colibri-de-tumbes
Thaumasius taczanowskii	colibri-de-garganta-pintalgada
Taphrospilus hypostictus	colibri-de-pintas-verdes
Eupetomena macroura	colibri-cauda-de-andorinha
Eupetomena cirrochloris	colibri-cinzento
Talaphorus chlorocercus	colibri-das-margens
Trochilus polytmus	colibri-rabilongo-de-bico-vermelho
Trochilus scitulus	colibri-rabilongo-de-bico-preto

Ramosomyia violiceps	colibri-de-coroa-violeta
Ramosomyia viridifrons	colibri-de-testa-verde
Ramosomyia wagneri	colibri-de-flancos-canela
Saucerottia cyanocephala	colibri-de-coroa-azul
Saucerottia hoffmanni	colibri-de-hoffmann
Saucerottia beryllina	colibri-berílio
Saucerottia cyanura	colibri-de-cauda-azul
Saucerottia edward	colibri-de-edward
Saucerottia saucerottei	colibri-de-barriga-metálica
Saucerottia cyanifrons	colibri-de-testa-índigo
Saucerottia castaneiventris	colibri-de-barriga-castanha
Saucerottia viridigaster	colibri-de-barriga-verde
Saucerottia cupreicauda	colibri-de-cauda-cobreada
Saucerottia tobaci	colibri-de-tobago
Amazilia rutila	colibri-canela
Amazilia yucatanensis	colibri-do-iucatão
Amazilia tzacatl	colibri-de-cauda-ruiva
Amazilia luciae	colibri-hondurenho
Amazilis amazilia	colibri-amazília
Uranomitra franciae	colibri-de-peito-branco-andino
Chrysuronia goudoti	colibri-de-goudot
Chrysuronia oenone	colibri-de-cauda-dourada
Chrysuronia versicolor	colibri-de-banda-branca
Chrysuronia boucardi	colibri-dos-mangais
Chrysuronia coeruleogularis	colibri-de-colete-azul
Chrysuronia lilliae	colibri-de-barriga-azul
Chrysuronia humboldtii	colibri-de-humboldt
Chrysuronia grayi	colibri-de-cabeça-azul
Chrysuronia brevirostris	colibri-de-peito-branco-guianense
Chrysuronia leucogaster	colibri-de-peito-branco-atlântico
Leucochloris albicollis	colibri-de-garganta-branca
Chionomesa fimbriata	colibri-de-lista-branca
Chionomesa lactea	colibri-de-garganta-safira
Hylocharis sapphirina	colibri-safira
Hylocharis chrysura	colibri-dourado
Elliotomyia chionogaster	colibri-de-peito-claro
Elliotomyia viridicauda	colibri-verde-e-branco
Polyerata amabilis	colibri-de-peito-azul
Polyerata decora	colibri-de-coroa-brilhante
Polyerata rosenbergi	colibri-de-rosenberg
Chlorestes candida	colibri-de-barriga-branca
Chlorestes eliciae	colibri-de-elicia
Chlorestes cyanus	colibri-de-queixo-branco
Chlorestes julie	colibri-de-barriga-violeta
Chlorestes notata	esmeralda-de-garganta-azul

Musophagidae Turacos

Esta família, que compreende os turacos, é uma das poucas que se encontra totalmente restrita ao continente africano. O nome da família deriva de *Musophaga*, que significa 'comedor de bananas' e, na verdade, os turacos são essencialmente frugívoros, embora também consumam folhas e flores. São aves de médio porte, de hábitos arborícolas, com uma longa cauda, e a maioria das espécies tem uma plumagem com cores vivas.

Espécies: 23

Distribuição: África subsariana

Corythaeola cristata	turaco-gigante
Crinifer personatus	turaco-mascarado
Crinifer concolor	turaco-unicolor
Crinifer leucogaster	turaco-de-barriga-branca
Crinifer piscator	turaco-cinzento
Crinifer zonurus	turaco-de-cauda-barrada
Gallirex porphyreolophus	turaco-de-crista-violeta
Gallirex johnstoni	turaco-das-ruwenzori
Menelikornis ruspolii	turaco-de-ruspoli
Menelikornis leucotis	turaco-de-faces-brancas
Tauraco violaceus	turaco-violeta
Tauraco rossae	turaco-de-ross
Tauraco macrorhynchus	turaco-de-bico-amarelo
Tauraco bannermani	turaco-de-bannerman
Tauraco leucolophus	turaco-de-crista-branca
Tauraco erythrolophus	turaco-angolano
Tauraco persa	turaco-da-guiné
Tauraco livingstonii	turaco-de-livingstone
Tauraco schalowi	turaco-de-schalow
Tauraco corythaix	turaco-de-knysna
Tauraco schuettii	turaco-de-bico-preto
Tauraco fischeri	turaco-de-fischer
Tauraco hartlaubi	turaco-de-hartlaub

Otididae — Abetardas e Sisões

Estas são aves terrestres de porte médio a grande, que vivem em zonas muito abertas, como sejam estepes ou planícies cerealíferas. Na maioria das espécies desta família, os machos são bastante maiores que as fêmeas e, no caso da abetarda-comum e da abetarda-gigante, os machos podem atingir os 20 kg de peso, o que faz destas as aves voadoras mais pesadas do mundo. Diversas espécies encontram-se ameaçadas, devido à caça e às alterações de habitat.

Espécies: 26

Distribuição: Europa, África, Ásia e Austrália

Otis tarda	abetarda-eurasiática
Ardeotis arabs	abetarda-árabe
Ardeotis kori	abetarda-gigante
Ardeotis nigriceps	abetarda-indiana
Ardeotis australis	abetarda-australiana
Chlamydotis undulata	abetarda-hubara
Chlamydotis macqueenii	abetarda-de-macqueen
Neotis ludwigii	abetarda-de-ludwig
Neotis denhami	abetarda-de-denham
Neotis heuglinii	abetarda-somali
Neotis nuba	abetarda-núbia
Eupodotis senegalensis	sisão-senegalês
Eupodotis caerulescens	sisão-azulado
Heterotetrax vigorsii	sisão-do-karoo
Heterotetrax rueppelii	sisão-de-rüppell
Heterotetrax humilis	sisão-somali
Lophotis savilei	sisão-saheliano
Lophotis gindiana	sisão-etíope
Lophotis ruficrista	sisão-de-poupa-vermelha
Afrotis afra	sisão-d'asa-preta
Afrotis afraoides	sisão-d'asa-branca
Lissotis melanogaster	sisão-de-barriga-preta
Lissotis hartlaubii	sisão-de-hartlaub
Houbaropsis bengalensis	sisão-bengalense
Sypheotides indicus	sisão-pequeno-de-poupa
Tetrax tetrax	sisão-europeu

Cuculidae Cucos, Cucais e afins

O conhecido canto 'cu-cu' deu o nome não apenas ao bem conhecido cuco-canoro, mas também, por extensão, a muitos outros membros da vasta família *Cuculidae*. Esta inclui não apenas os cucos, mas também cucais, cuas, malcoas, koels, anis e papa-léguas. Cerca de um terço das espécies desta família tem uma estratégia de reprodução baseada no parasitismo, sendo os ovos depositados nos ninhos de outras espécies.

Espécies: 157

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Guira guira	ani-branco
Crotophaga major	ani-grande
Crotophaga ani	ani-de-bico-liso
Crotophaga sulcirostris	ani-de-bico-rugoso
Tapera naevia	cuco-riscado
Dromococcyx phasianellus	cuco-faisão
Dromococcyx pavoninus	cuco-pavão
Morococcyx erythropygus	cuco-terrestre-pequeno
Geococcyx californianus	papa-léguas-grande
Geococcyx velox	papa-léguas-pequeno
Neomorphus geoffroyi	cuco-terrestre-de-barriga-ruiva
Neomorphus squamiger	cuco-terrestre-escamoso
Neomorphus radiolosus	cuco-terrestre-barrado
Neomorphus rufipennis	cuco-terrestre-d'asa-ruiva
Neomorphus pucheranii	cuco-terrestre-de-bico-vermelho
Centropus milo	cucal-das-salomão
Centropus ateralbus	cucal-de-pescoço-branco
Centropus menbeki	cucal-bico-de-marfim
Centropus chalybeus	cucal-de-biak
Centropus unirufus	cucal-ruivo
Centropus chlororhynchos	cucal-cingalês
Centropus melanops	cucal-de-faces-pretas
Centropus steerii	cucal-de-mindoro
Centropus rectunguis	cucal-de-dedos-curtos
Centropus celebensis	cucal-de-celebes
Centropus anselli	cucal-gabonês
Centropus leucogaster	cucal-de-garganta-preta
Centropus senegalensis	cucal-senegalês
Centropus monachus	cucal-de-cabeça-azulada
Centropus cupreicaudus	cucal-cauda-de-cobre

Centropus superciliosus	cucal-de-sobrancelhas
Centropus burchellii	cucal-de-burchell
Centropus nigrorufus	cucal-javanês
Centropus sinensis	cucal-real
Centropus toulou	cucal-malgaxe
Centropus goliath	cucal-golias
Centropus grillii	cucal-preto
Centropus viridis	cucal-filipino
Centropus bengalensis	cucal-pequeno
Centropus violaceus	cucal-violáceo
Centropus bernsteini	cucal-de-bico-preto
Centropus spilopterus	cucal-das-kai
Centropus phasianinus	cucal-faisão
Centropus andamanensis	cucal-das-andamão
Carpococcyx radiceus	cuco-terrestre-do-bornéu
Carpococcyx viridis	cuco-terrestre-de-samatra
Carpococcyx renauldi	cuco-terrestre-indochinês
Coua delalandei	cua-de-delalande
Coua cristata	cua-de-poupa
Coua verreauxi	cua-de-verreaux
Coua caerulea	cua-azul
Coua ruficeps	cua-de-barrete-vermelho
Coua olivaceiceps	cua-de-barrete-oliváceo
Coua reynaudii	cua-de-testa-vermelha
Coua coquereli	cua-de-coquerel
Coua cursor	cua-corredor
Coua gigas	cua-gigante
Coua serriana	cua-de-peito-vermelho
Rhinortha chlorophaea	malcoa-de-raffles
Ceuthmochares aereus	malcoa-azul
Ceuthmochares australis	malcoa-verde
Taccocua leschenaultii	malcoa-insípida
Zanclostomus javanicus	malcoa-de-bico-vermelho
Rhamphococcyx calyorhynchus	malcoa-de-bico-amarelo
Phaenicophaeus curvirostris	malcoa-de-peito-castanho
Phaenicophaeus oeneicaudus	malcoa-das-mentawai
Phaenicophaeus pyrrhocephalus	malcoa-de-faces-vermelhas
Phaenicophaeus sumatranus	malcoa-vinosa
Phaenicophaeus viridirostris	malcoa-de-faces-azuis
Phaenicophaeus diardi	malcoa-lúgubre
Phaenicophaeus tristis	malcoa-de-bico-verde
Dasylophus superciliosus	malcoa-de-crista-vermelha

Dasylophus cumingi	malcoa-escamada
Clamator coromandus	cuco-d'asa-castanha
Clamator glandarius	cuco-rabilongo
Clamator levaillantii	cuco-de-levaillant
Clamator jacobinus	cuco-jacobino
Coccycua minuta	cuco-ruivo
Coccycua pumila	cuco-anão
Coccycua cinerea	cuco-cinzento
Piaya mexicana	cuco-mexicano
Piaya cayana	cuco-miador
Piaya melanogaster	cuco-de-barriga-preta
Coccyzus melacoryphus	cuco-canela
Coccyzus americanus	cuco-d'asa-vermelha
Coccyzus euleri	cuco-de-barriga-branca
Coccyzus minor	cuco-dos-mangais
Coccyzus ferrugineus	cuco-do-coco
Coccyzus erythropthalmus	cuco-de-bico-preto
Coccyzus lansbergi	cuco-de-barrete-cinzento
Coccyzus pluvialis	cuco-de-barriga-ruiva
Coccyzus rufigularis	cuco-de-garganta-ruiva
Coccyzus vetula	cuco-jamaicano
Coccyzus merlini	cuco-cubano
Coccyzus vieilloti	cuco-porto-riquenho
Coccyzus longirostris	cuco-dominicano
Pachycoccyx audeberti	cuco-de-bico-grosso
Microdynamis parva	koel-anão
Eudynamys scolopaceus	koel-ocidental
Eudynamys melanorhynchus	koel-de-bico-preto
Eudynamys orientalis	koel-oriental
Urodynamis taitensis	koel-rabilongo
Scythrops novaehollandiae	cuco-tucano
Chrysococcyx maculatus	cuco-esmeraldino-asiático
Chrysococcyx xanthorhynchus	cuco-violeta
Chrysococcyx caprius	cuco-bronzeado-africano
Chrysococcyx klaas	cuco-de-klaas
Chrysococcyx flavigularis	cuco-de-garganta-amarela
Chrysococcyx cupreus	cuco-esmeraldino-africano
Chalcites megarhynchus	cuco-de-bico-longo
Chalcites basalis	cuco-bronzeado-de-horsfield
Chalcites osculans	cuco-d'orelhas-pretas
Chalcites ruficollis	cuco-bronzeado-de-garganta-ruiva
Chalcites lucidus	cuco-verde-brilhante

Chalcites meyerii	cuco-verde-d'orelhas-brancas
Chalcites minutillus	cuco-bronzeado-pequeno
Chalcites crassirostris	cuco-bronzeado-das-molucas
Heteroscenes pallidus	cuco-pálido
Caliechthrus leucolophus	cuco-de-coroa-branca
Cacomantis castaneiventris	cuco-de-peito-castanho
Cacomantis flabelliformis	cuco-cauda-de-leque
Cacomantis sonneratii	cuco-zebra
Cacomantis merulinus	cuco-lamurioso
Cacomantis passerinus	cuco-de-barriga-cinzenta
Cacomantis sepulcralis	cuco-indonésio
Cacomantis virescens	cuco-de-celebes
Cacomantis variolosus	cuco-sarapintado
Cacomantis blandus	cuco-do-almirantado
Cacomantis addendus	cuco-das-salomão
Cacomantis aeruginosus	cuco-das-molucas
Cercococcyx mechowi	cuco-escuro
Cercococcyx olivinus	cuco-oliváceo
Cercococcyx montanus	cuco-montês
Surniculus velutinus	cuco-drongo-filipino
Surniculus lugubris	cuco-drongo-de-cauda-quadrada
Surniculus dicruroides	cuco-drongo-de-cauda-forcada
Surniculus musschenbroeki	cuco-drongo-das-molucas
Hierococcyx vagans	cuco-gavião-de-bigodes
Hierococcyx sparverioides	cuco-gavião-grande
Hierococcyx bocki	cuco-gavião-escuro
Hierococcyx varius	cuco-gavião-indiano
Hierococcyx hyperythrus	cuco-gavião-ruivo
Hierococcyx pectoralis	cuco-gavião-filipino
Hierococcyx fugax	cuco-gavião-fugidio
Hierococcyx nisicolor	cuco-gavião-assobiador
Cuculus clamosus	cuco-preto
Cuculus solitarius	cuco-de-peito-vermelho
Cuculus poliocephalus	cuco-pequeno
Cuculus crassirostris	cuco-de-celebes
Cuculus micropterus	cuco-d'asa-curta
Cuculus rochii	cuco-malgaxe
Cuculus gularis	cuco-africano
Cuculus saturatus	cuco-dos-himalaias
Cuculus optatus	cuco-oriental
Cuculus lepidus	cuco-das-sundas
Cuculus canorus	cuco-canoro

Nannococcyx psix	cuco-de-santa-helena

Mesitornithidae Mesitos

Pequena família composta por três espécies de aves terrestres, todas endémicas de Madagáscar. Estas aves não voam ou só raramente o fazem; procuram alimento no solo, sendo a sua dieta composta por sementes e insectos. Geneticamente os mesitos são próximos dos pombos e dos cortiçóis. Esta é a única família de aves com mais de duas espécies em que todos os seus membros têm actualmente um estatuto de ameaça.

Espécies: 3

Distribuição: Madagáscar

Mesitornis variegatus	mesito-de-peito-branco
Mesitornis unicolor	mesito-castanho
Monias benschi	mesito-de-bico-curvo

Pteroclidae — Cortiçóis

Os cortiçóis são aves terrestres, gregárias, que vivem no solo, em zonas pouco arborizadas, como sejam planícies, savanas e semidesertos. Têm uma plumagem críptica, que lhes permite serem confundidas com o meio envolvente. A sua dieta, composta sobretudo por sementes, é pobre em água; para se hidratarem, os cortiçóis deslocam-se diariamente a pontos de água, muitas vezes situados a grande distância, juntando-se aí em grandes bandos para beber.

Espécies: 16

Distribuição: Ásia, África incluindo Madagáscar e sul da Europa

Syrrhaptes tibetanus	cortiçol-do-tibete
Syrrhaptes paradoxus	cortiçol-das-estepes
Pterocles alchata	cortiçol-de-barriga-branca
Pterocles namaqua	cortiçol-namaqua
Pterocles exustus	cortiçol-de-barriga-castanha
Pterocles senegallus	cortiçol-malhado
Pterocles orientalis	cortiçol-de-barriga-preta
Pterocles gutturalis	cortiçol-de-garganta-amarela
Pterocles coronatus	cortiçol-coroado
Pterocles decoratus	cortiçol-de-faces-pretas
Pterocles personatus	cortiçol-malgaxe
Pterocles lichtensteinii	cortiçol-de-lichtenstein
Pterocles indicus	cortiçol-indiano
Pterocles quadricinctus	cortiçol-de-quatro-golas
Pterocles bicinctus	cortiçol-de-duas-golas
Pterocles burchelli	cortiçol-de-burchell

Columbidae — Pombos, Rolas e afins

Com mais de 350 membros, esta família é a quarta mais numerosa. Abrange os vulgares pombos, as rolas e alguns grupos afins, como os pombos-verdes e os pombos-da-fruta. Muitas espécies ocorrem apenas em ilhas, o que as torna especialmente vulneráveis – na realidade, cerca de 60 espécies desta família têm actualmente estatuto de ameaça. Desde 1600 extinguiram-se pelo menos dez espécies, incluindo o pombo-viajante e o dodó.

Espécies: 352

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Columba livia	pombo-das-rochas
Columba rupestris	pombo-das-colinas
Columba leuconota	pombo-das-neves
Columba guinea	pombo-malhado
Columba albitorques	pombo-de-colar-branco
Columba oenas	pombo-bravo
Columba eversmanni	pombo-do-turquestão
Columba oliviae	pombo-somali
Columba palumbus	pombo-torcaz
Columba trocaz	pombo-da-madeira
Columba bollii	pombo-turquesa
Columba junoniae	pombo-rabil
Columba unicincta	pombo-pálido
Columba arquatrix	pombo-d'olho-amarelo
Columba sjostedti	pombo-camaronês
Columba thomensis	pombo-de-são-tomé
Columba pollenii	pombo-das-comores
Columba hodgsonii	pombo-mosqueado
Columba albinucha	pombo-de-nuca-branca
Columba pulchricollis	pombo-cinzento
Columba elphinstonii	pombo-dos-nilgiris
Columba torringtoniae	pombo-cingalês
Columba punicea	pombo-púrpura
Columba argentina	pombo-prateado
Columba palumboides	pombo-das-andamão
Columba janthina	pombo-japonês
Columba versicolor	pombo-das-bonin
Columba jouyi	pombo-das-ryukyu
Columba vitiensis	pombo-metálico
Columba leucomela	pombo-de-cabeça-branca
Columba pallidiceps	pombo-de-patas-amarelas
Columba delegorguei	pombo-de-delegorgue

Columba iriditorques	pombo-de-nuca-bronzeada
Columba malherbii	pombo-de-malherbe
Aplopelia larvata	pombo-canela
Patagioenas leucocephala	pombo-de-coroa-branca
Patagioenas squamosa	pombo-de-nuca-escamosa
Patagioenas speciosa	pombo-escamoso
Patagioenas picazuro	pombo-d'asa-branca
Patagioenas corensis	pombo-d'óculos
Patagioenas maculosa	pombo-do-orvalho
Patagioenas fasciata	pombo-de-coleira-interrompida
Patagioenas araucana	pombo-chileno
Patagioenas caribaea	pombo-jamaicano
Patagioenas cayennensis	pombo-de-barriga-clara
Patagioenas flavirostris	pombo-de-bico-vermelho
Patagioenas oenops	pombo-peruano
Patagioenas inornata	pombo-unicolor
Patagioenas plumbea	pombo-plúmbeo
Patagioenas subvinacea	pombo-vinoso
Patagioenas nigrirostris	pombo-de-bico-curto
Patagioenas goodsoni	pombo-do-chocó
Nesoenas picturatus	pombo-malgaxe
Nesoenas rodericanus	pombo-de-rodrigues
Nesoenas mayeri	pombo-rosado
Streptopelia turtur	rola-brava
Streptopelia lugens	rola-escura
Streptopelia hypopyrrha	rola-camaronesa
Streptopelia orientalis	rola-oriental
Streptopelia bitorquata	rola-das-sundas
Streptopelia dusumieri	rola-de-colar-filipina
Streptopelia decaocto	rola-turca
Streptopelia xanthocycla	rola-de-colar-birmanesa
Streptopelia roseogrisea	rola-rosada
Streptopelia reichenowi	rola-de-reichenow
Streptopelia decipiens	rola-gemedora
Streptopelia semitorquata	rola-d'olho-vermelho
Streptopelia capicola	rola-do-cabo
Streptopelia vinacea	rola-vinosa
Streptopelia tranquebarica	rola-birmanesa
Spilopelia chinensis	rola-maculada
Spilopelia senegalensis	rola-do-senegal
Macropygia unchall	rola-cuco-barrada
Macropygia amboinensis	rola-cuco-de-amboíno
Macropygia doreya	rola-cuco-sultana
Macropygia emiliana	rola-cuco-das-sundas
Macropygia cinnamomea	rola-cuco-de-engano
Macropygia modiglianii	rola-cuco-das-barusan
Macropygia magna	rola-cuco-timorense
Macropygia timorlaoensis	rola-cuco-das-tanimbar

Macropygia macassariensis	rola-cuco-das-flores
Macropygia tenuirostris	rola-cuco-filipina
Macropygia phasianella	rola-cuco-castanha
Macropygia rufipennis	rola-cuco-das-andamão
Macropygia nigrirostris	rola-cuco-de-bico-preto
Macropygia mackinlayi	rola-cuco-de-mackinlay
Macropygia ruficeps	rola-cuco-pequena
Reinwardtoena reinwardti	rola-rabuda-grande
Reinwardtoena browni	rola-rabuda-bicolor
Reinwardtoena crassirostris	rola-rabuda-de-crista
Turacoena manadensis	rola-cuco-de-celebes
Turacoena sulaensis	rola-cuco-das-sula
Turacoena modesta	rola-cuco-preta
Turtur chalcospilos	rola-esmeraldina
Turtur abyssinicus	rola-saheliana
Turtur afer	rola-de-manchas-azuis
Turtur tympanistria	rola-de-garganta-branca
Turtur brehmeri	rola-de-cabeça-azul
Oena capensis	rola-rabilonga
Chalcophaps indica	rola-esmeralda-de-cabeça-cinzenta
Chalcophaps longirostris	rola-esmeralda-de-cabeça-castanha
Chalcophaps stephani	rola-esmeralda-de-dorso-castanho
Henicophaps albifrons	pombo-bronze-de-testa-branca
Henicophaps foersteri	pombo-bronze-da-nova-bretanha
Phaps chalcoptera	pombo-bronze-comum
Phaps elegans	pombo-bronze-elegante
Phaps histrionica	pombo-bronze-arlequim
Ocyphaps lophotes	pombo-de-crista
Geophaps plumifera	pombo-espinhoso
Geophaps scripta	pombo-aborígene
Geophaps smithii	pombo-de-smith
Trugon terrestris	pombo-de-bico-grosso
Leucosarcia melanoleuca	pombo-wonga
Petrophassa rufipennis	pombo-rupestre-d'asa-ruiva
Petrophassa albipennis	pombo-rupestre-d'asa-branca
Geopelia cuneata	rola-diamante
Geopelia striata	rola-zebra-comum
Geopelia placida	rola-serena
Geopelia maugeus	rola-zebra-timorense
Geopelia humeralis	rola-de-nuca-rosácea
Columbina inca	rolinha-inca
Columbina squammata	rolinha-escamosa
Columbina passerina	rolinha-cinzenta
Columbina minuta	rolinha-pequena
Columbina buckleyi	rolinha-equatoriana
Columbina talpacoti	rolinha-corada
Columbina picui	rolinha-picuí
Columbina cruziana	rolinha-coaxante

Columbina cyanopis	rolinha-d'olho-azul
Claravis pretiosa	rolinha-azulada
Paraclaravis geoffroyi	rolinha-d'asa-púrpura
Paraclaravis mondetoura	rolinha-de-peito-castanho
Metriopelia ceciliae	rolinha-d'óculos
Metriopelia morenoi	rolinha-de-moreno
Metriopelia melanoptera	rolinha-d'asa-preta
Metriopelia aymara	rolinha-de-pintas-douradas
Uropelia campestris	rolinha-vaqueira
Starnoenas cyanocephala	rola-perdiz-cubana
Geotrygon purpurata	rola-perdiz-do-chocó
Geotrygon saphirina	rola-perdiz-safira
Geotrygon versicolor	rola-perdiz-jamaicana
Geotrygon montana	rola-perdiz-castanha
Geotrygon violacea	rola-perdiz-violeta
Geotrygon caniceps	rola-perdiz-de-testa-cinza
Geotrygon leucometopia	rola-perdiz-de-testa-branca
Geotrygon chrysia	rola-perdiz-das-caraíbas
Geotrygon mystacea	rola-perdiz-de-bigodes
Leptotrygon veraguensis	rola-de-bigodes
Leptotila verreauxi	rola-de-pontas-brancas
Leptotila megalura	rola-dos-yungas
Leptotila rufaxilla	rola-de-testa-branca
Leptotila plumbeiceps	rola-de-cabeça-cinzenta
Leptotila pallida	rola-pálida
Leptotila battyi	rola-de-dorso-castanho
Leptotila wellsi	rola-granadina
Leptotila jamaicensis	rola-jamaicana
Leptotila cassinii	rola-de-peito-cinzento
Leptotila ochraceiventris	rola-de-barriga-ocre
Leptotila conoveri	rola-de-tolima
Zentrygon carrikeri	rola-de-tuxtla
Zentrygon costaricensis	rola-costa-riquenha
Zentrygon lawrencii	rola-sombria
Zentrygon albifacies	rola-de-faces-brancas
Zentrygon frenata	rola-de-freios-do-sul
Zentrygon linearis	rola-de-freios-do-norte
Zentrygon chiriquensis	rola-de-chiriqui
Zentrygon goldmani	rola-de-coroa-ruiva
Ectopistes migratorius	pombo-viajante
Zenaida macroura	rola-carpideira
Zenaida graysoni	rola-de-socorro
Zenaida auriculata	rola-de-ouvidos
Zenaida aurita	rola-caribenha
Zenaida galapagoensis	rola-das-galápagos
Zenaida asiatica	rola-d'asa-branca
Zenaida meloda	rola-do-pacífico
Caloenas nicobarica	pombo-de-nicobar

Caloenas maculata	pombo-verde-malhado
Gallicolumba tristigmata	pombo-terrestre-de-celebes
Gallicolumba rufigula	pombo-terrestre-de-peito-dourado
Gallicolumba luzonica	pombo-apunhalado-de-lução
Gallicolumba crinigera	pombo-apunhalado-de-mindanau
Gallicolumba platenae	pombo-apunhalado-de-mindoro
Gallicolumba keayi	pombo-apunhalado-de-negros
Gallicolumba menagei	pombo-apunhalado-das-sulu
Pampusana hoedtii	pombo-terrestre-de-wetar
Pampusana jobiensis	pombo-terrestre-de-peito-branco
Pampusana kubaryi	pombo-terrestre-das-carolinas
Pampusana erythroptera	pombo-terrestre-das-tuamotu
Pampusana xanthonura	pombo-terrestre-das-marianas
Pampusana norfolkensis	pombo-terrestre-de-norfolk
Pampusana stairi	pombo-terrestre-tímido
Pampusana sanctaecrucis	pombo-terrestre-de-santa-cruz
Pampusana ferruginea	pombo-terrestre-de-tana
Pampusana salamonis	pombo-terrestre-das-salomão
Pampusana rubescens	pombo-terrestre-das-marquesas
Pampusana beccarii	pombo-terrestre-de-peito-cinzento
Pampusana canifrons	pombo-terrestre-de-palau
Microgoura meeki	pombo-coroado-de-choiseul
Otidiphaps nobilis	pombo-faisão
Goura cristata	pombo-coroado-ocidental
Goura scheepmakeri	pombo-coroado-de-scheepmaker
Goura sclaterii	pombo-coroado-de-sclater
Goura victoria	pombo-coroado-de-vitória
Raphus cucullatus	dodô
Pezophaps solitaria	solitário-de-rodrigues
Didunculus strigirostris	pombo-dentado
Phapitreron leucotis	pombo-castanho-d'orelhas-brancas
Phapitreron amethystinus	pombo-castanho-ametista
Phapitreron cinereiceps	pombo-castanho-de-tawitawi
Phapitreron brunneiceps	pombo-castanho-de-mindanau
Treron fulvicollis	pombo-verde-de-cabeça-ruiva
Treron olax	pombo-verde-pequeno
Treron vernans	pombo-verde-de-pescoço-rosa
Treron bicinctus	pombo-verde-de-pescoço-laranja
Treron pompadora	pombo-verde-cingalês
Treron affinis	pombo-verde-de-testa-cinzenta
Treron phayrei	pombo-verde-indochinês
Treron chloropterus	pombo-verde-das-andamão
Treron axillaris	pombo-verde-filipino
Treron aromaticus	pombo-verde-de-buru
Treron curvirostra	pombo-verde-de-bico-grosso
Treron griseicauda	pombo-verde-de-faces-cinzentas
Treron teysmannii	pombo-verde-de-sumba
Treron floris	pombo-verde-das-flores

Treron psittaceus	pombo-verde-timorense
Treron capellei	pombo-verde-grande
Treron phoenicopterus	pombo-verde-de-patas-amarelas
Treron waalia	pombo-verde-amarelo
Treron australis	pombo-verde-malgaxe
Treron griveaudi	pombo-verde-das-comores
Treron calvus	pombo-verde-africano
Treron pembaensis	pombo-verde-de-pemba
Treron sanctithomae	pombo-verde-de-são-tomé
Treron apicauda	pombo-verde-de-cauda-fina
Treron oxyurus	pombo-verde-de-samatra
Treron seimundi	pombo-verde-d'olho-azul
Treron sphenurus	pombo-verde-de-cunha
Treron sieboldii	pombo-verde-japonês
Treron permagnus	pombo-verde-das-ryukyu
Treron formosae	pombo-verde-da-formosa
Megaloprepia formosa	pombo-da-fruta-de-peito-escarlate
Megaloprepia magnifica	pombo-da-fruta-magnífico
Ramphiculus marchei	pombo-da-fruta-flamejante
Ramphiculus merrilli	pombo-da-fruta-filipino
Ramphiculus occipitalis	pombo-da-fruta-citrino
Ramphiculus fischeri	pombo-da-fruta-de-fischer
Ramphiculus jambu	pombo-da-fruta-jambu
Ramphiculus subgularis	pombo-da-fruta-de-banggai
Ramphiculus gularis	pombo-da-fruta-de-barba-castanha
Ramphiculus mangoliensis	pombo-da-fruta-das-sula
Ramphiculus leclancheri	pombo-da-fruta-de-barba-preta
Ptilinopus cinctus	pombo-da-fruta-de-dorso-preto
Ptilinopus alligator	pombo-da-fruta-de-coleira
Ptilinopus dohertyi	pombo-da-fruta-de-sumba
Ptilinopus porphyreus	pombo-da-fruta-rosáceo
Ptilinopus perlatus	pombo-da-fruta-perlado
Ptilinopus ornatus	pombo-da-fruta-ornamentado
Ptilinopus tannensis	pombo-da-fruta-de-vanuatu
Ptilinopus aurantiifrons	pombo-da-fruta-de-testa-laranja
Ptilinopus wallacii	pombo-da-fruta-de-wallace
Ptilinopus superbus	pombo-da-fruta-soberbo
Ptilinopus perousii	pombo-da-fruta-multicolor
Ptilinopus porphyraceus	pombo-da-fruta-de-tonga
Ptilinopus ponapensis	pombo-da-fruta-das-carolinas
Ptilinopus hernsheimi	pombo-da-fruta-de-kosrae
Ptilinopus pelewensis	pombo-da-fruta-de-palau
Ptilinopus rarotongensis	pombo-da-fruta-das-cook
Ptilinopus roseicapilla	pombo-da-fruta-das-marianas
Ptilinopus regina	pombo-da-fruta-real
Ptilinopus richardsii	pombo-da-fruta-de-richards
Ptilinopus chrysogaster	pombo-da-fruta-de-raiatea
Ptilinopus purpuratus	pombo-da-fruta-do-taiti

Ptilinopus chalcurus	pombo-da-fruta-de-makatea
Ptilinopus coralensis	pombo-da-fruta-das-tuamotu
Ptilinopus greyi	pombo-da-fruta-de-barriga-vermelha
Ptilinopus huttoni	pombo-da-fruta-de-rapa
Ptilinopus dupetithouarsii	pombo-da-fruta-de-coroa-branca
Ptilinopus mercierii	pombo-da-fruta-das-marquesas
Ptilinopus insularis	pombo-da-fruta-de-henderson
Ptilinopus coronulatus	pombo-da-fruta-coroado
Ptilinopus pulchellus	pombo-da-fruta-bonito
Ptilinopus monacha	pombo-da-fruta-monge
Ptilinopus rivoli	pombo-da-fruta-de-peito-branco
Ptilinopus speciosus	pombo-da-fruta-de-geelvink
Ptilinopus solomonensis	pombo-da-fruta-das-salomão
Ptilinopus viridis	pombo-da-fruta-de-peito-vinoso
Ptilinopus eugeniae	pombo-da-fruta-de-cabeça-branca
Ptilinopus iozonus	pombo-da-fruta-de-barriga-laranja
Ptilinopus insolitus	pombo-da-fruta-das-bismarck
Ptilinopus hyogastrus	pombo-da-fruta-de-cabeça-cinzenta
Ptilinopus granulifrons	pombo-da-fruta-carunculado
Ptilinopus melanospilus	pombo-da-fruta-de-nuca-preta
Ptilinopus nainus	pombo-da-fruta-anão
Ptilinopus arcanus	pombo-da-fruta-de-negros
Ptilinopus victor	pombo-da-fruta-laranja
Ptilinopus luteovirens	pombo-da-fruta-dourado
Ptilinopus layardi	pombo-da-fruta-aveludado
Ptilinopus holosericea	pombo-da-fruta-da-nova-caledónia
Alectroenas nitidissimus	pombo-azul-das-maurícias
Alectroenas madagascariensis	pombo-azul-malgaxe
Alectroenas sganzini	pombo-azul-das-comores
Alectroenas pulcherrimus	pombo-azul-das-seicheles
Ducula poliocephala	pombo-imperial-filipino
Ducula forsteni	pombo-imperial-de-barriga-branca
Ducula mindorensis	pombo-imperial-de-mindoro
Ducula radiata	pombo-imperial-de-cabeça-cinzenta
Ducula carola	pombo-imperial-malhado
Ducula aenea	pombo-imperial-verde
Ducula oenothorax	pombo-imperial-de-engano
Ducula nicobarica	pombo-imperial-de-nicobar
Ducula perspicillata	pombo-imperial-de-lunetas
Ducula neglecta	pombo-imperial-de-ceram
Ducula concinna	pombo-imperial-elegante
Ducula pacifica	pombo-imperial-do-pacífico
Ducula oceanica	pombo-imperial-micronésio
Ducula aurorae	pombo-imperial-polinésio
Ducula galeata	pombo-imperial-das-marquesas
Ducula rubricera	pombo-imperial-de-cera-vermelha
Ducula myristicivora	pombo-imperial-das-especiarias
Ducula geelvinkiana	pombo-imperial-de-geelvink

Ducula rufigaster	pombo-imperial-de-cauda-púrpura
Ducula basilica	pombo-imperial-de-barriga-canela
Ducula finschii	pombo-imperial-de-finsch
Ducula chalconota	pombo-imperial-ruivo
Ducula pistrinaria	pombo-imperial-insular
Ducula rosacea	pombo-imperial-róseo
Ducula whartoni	pombo-imperial-fúnebre
Ducula pickeringii	pombo-imperial-cinzento
Ducula latrans	pombo-imperial-ladrador
Ducula brenchleyi	pombo-imperial-das-salomão
Ducula bakeri	pombo-imperial-de-vanuatu
Ducula goliath	pombo-imperial-gigante
Ducula pinon	pombo-imperial-de-pinon
Ducula melanochroa	pombo-imperial-preto
Ducula mullerii	pombo-imperial-de-colar
Ducula zoeae	pombo-imperial-de-zoe
Ducula cuprea	pombo-imperial-dos-nilgiris
Ducula badia	pombo-imperial-montês
Ducula lacernulata	pombo-imperial-de-dorso-escuro
Ducula cineracea	pombo-imperial-timorense
Ducula bicolor	pombo-imperial-bicolor
Ducula luctuosa	pombo-imperial-prateado
Ducula spilorrhoa	pombo-imperial-isabel
Ducula subflavescens	pombo-imperial-amarelado
Lopholaimus antarcticus	pombo-de-coque
Hemiphaga novaeseelandiae	pombo-maori
Hemiphaga chathamensis	pombo-das-chatham
Cryptophaps poecilorrhoa	pombo-sombrio
Gymnophaps albertisii	pombo-montês-da-papua
Gymnophaps mada	pombo-montês-de-buru
Gymnophaps stalkeri	pombo-montês-de-ceram
Gymnophaps solomonensis	pombo-montês-das-salomão

Heliornithidae Pés-de-barbatana e Mergulhão-sol

São aves aquáticas, que apresentam algumas semelhanças com os ralídeos, a saber: o pescoço longo, o corpo esguio, a cauda larga e o bico pontiagudo. Apreciam zonas com boa cobertura e podem ser muito esquivas. Uma das três espécies, o mergulhão-sol, tem a particularidade, única entre as aves, de ter uma prega de pele por baixo de cada asa, que lhe permite acolher uma ou duas crias de cada lado e, em caso de perigo, levantar voo com elas 'a bordo'.

Espécies: 3

Distribuição: América, África e Ásia, em latitudes tropicais

Podica senegalensis	pés-de-barbatana-africano
Heliopais personatus	pés-de-barbatana-asiático
Heliornis fulica	mergulhão-sol

Sarothruridae Frangas-d’água africanas e afins

Anteriormente consideradas parte dos ralídeos, estudos genéticos recentes demonstraram que estas tímidas aves formam uma família à parte, mais próxima dos pés-de-barbatana. A maioria apresenta dimorfismo sexual marcado e uma clara preferência por zonas florestais, características incomuns nos ralídeos, embora também habitem zonas próximas de água dentro da floresta. Quatro das espécies são endémicas de Madagáscar e outras quatro da Papua.

Espécies: 15

Distribuição: África subsariana, Madagáscar e ilha da Papua

Mentocrex kioloides	frango-d'água-de-cabeça-cinzenta
Mentocrex beankaensis	frango-d'água-de-tsingy
Sarothrura pulchra	franga-d'água-pintada
Sarothrura elegans	franga-d'água-elegante
Sarothrura rufa	franga-d'água-de-peito-vermelho
Sarothrura lugens	franga-d'água-de-cabeça-vermelha
Sarothrura boehmi	franga-d'água-de-boehm
Sarothrura ayresi	franga-d'água-d'asa-branca
Sarothrura affinis	franga-d'água-estriada
Sarothrura insularis	franga-d'água-malgaxe
Sarothrura watersi	franga-d'água-de-bico-fino
Rallicula leucospila	franga-d'água-de-listas-brancas
Rallicula rubra	franga-d'água-ferrugínea
Rallicula forbesi	franga-d'água-de-forbes
Rallicula mayri	franga-d'água-de-mayr

Rallidae Galinhas-d'água, Galeirões e afins

As aves desta família lembram galináceos, mas o seu bico, as patas e os dedos são mais compridos, estando em muitos casos adaptados ao meio aquático. Habitam caniçais e vegetação densa na proximidade de água, onde podem ser de difícil detecção, mas também florestas e pradarias. São omnívoras e muitas delas migratórias, tendo esta família colonizado com sucesso várias ilhas oceânicas isoladas por todo mundo.

Espécies: 153

Distribuição: Cosmopolita, excepto Antárctida

Canirallus oculeus	frango-d'água-de-garganta-cinzenta
Anurolimnas castaneiceps	franga-d'água-de-cabeça-castanha
Pardirallus maculatus	frango-d'água-pintalgado
Pardirallus nigricans	frango-d'água-sombrio
Pardirallus sanguinolentus	frango-d'água-plúmbeo
Mustelirallus albicollis	franga-d'água-de-garganta-cinzenta
Mustelirallus cerverai	franga-d'água-de-zapata
Mustelirallus colombianus	franga-d'água-colombiana
Mustelirallus erythrops	franga-d'água-de-bico-vermelho
Amaurolimnas concolor	frango-d'água-liso
Aramides axillaris	frango-d'água-de-pescoço-ruivo
Aramides mangle	frango-d'água-pequeno
Aramides albiventris	frango-d'água-de-barriga-branca
Aramides cajaneus	frango-d'água-de-pescoço-cinzento
Aramides wolfi	frango-d'água-moreno
Aramides ypecaha	frango-d'água-gigante
Aramides calopterus	frango-d'água-d'asa-ruiva
Aramides saracura	frango-d'água-ardósia
Rallus obsoletus	frango-d'água-da-califórnia
Rallus crepitans	frango-d'água-crepitante
Rallus tenuirostris	frango-d'água-asteca
Rallus longirostris	frango-d'água-dos-mangais
Rallus elegans	frango-d'água-real
Rallus wetmorei	frango-d'água-de-flancos-lisos
Rallus limicola	frango-d'água-virginiano
Rallus semiplumbeus	frango-d'água-de-bogotá
Rallus aequatorialis	frango-d'água-equatoriano
Rallus antarcticus	frango-d'água-austral
Rallus aquaticus	frango-d'água-europeu
Rallus indicus	frango-d'água-asiático
Rallus caerulescens	frango-d'água-africano
Rallus madagascariensis	frango-d'água-malgaxe
Crecopsis egregia	codornizão-africano
Rougetius rougetii	frango-d'água-etíope

Dryolimnas cuvieri	frango-d'água-de-garganta-branca
Dryolimnas augusti	frango-d'água-da-reunião
Crex crex	codornizão-europeu
Aramidopsis plateni	frango-d'água-roncador
Lewinia striata	frango-d'água-listado
Lewinia mirifica	frango-d'água-de-lução
Lewinia pectoralis	frango-d'água-de-peito-cinzento
Lewinia muelleri	frango-d'água-das-auckland
Diaphorapteryx hawkinsi	frango-d'água-de-hawkins
Gallirallus calayanensis	frango-d'água-de-calayan
Gallirallus wallacii	frango-d'água-invisível
Gallirallus australis	frango-d'água-weka
Gallirallus castaneoventris	frango-d'água-castanho
Gallirallus lafresnayanus	frango-d'água-da-nova-caledónia
Gallirallus modestus	frango-d'água-das-chatham
Gallirallus okinawae	frango-d'água-de-okinawa
Gallirallus torquatus	frango-d'água-zebra
Gallirallus philippensis	frango-d'água-filipino
Gallirallus owstoni	frango-d'água-de-guam
Gallirallus insignis	frango-d'água-de-patas-rosadas
Gallirallus rovianae	frango-d'água-das-salomão
Gallirallus woodfordi	frango-d'água-de-woodford
Gallirallus poecilopterus	frango-d'água-das-fiji
Gallirallus sylvestris	frango-d'água-de-lord-howe
Gallirallus dieffenbachii	frango-d'água-de-dieffenbach
Gallirallus pacificus	frango-d'água-do-taiti
Gallirallus wakensis	frango-d'água-de-wake
Porphyriops melanops	galinha-d'água-pintalgada
Porzana carolina	franga-d'água-americana
Porzana porzana	franga-d'água-grande
Porzana fluminea	franga-d'água-australiana
Tribonyx ventralis	galinha-d'água-de-cauda-preta
Tribonyx mortierii	galinha-d'água-da-tasmânia
Paragallinula angulata	galinha-d'água-pequena
Gallinula tenebrosa	galinha-d'água-escura
Gallinula galeata	galinha-d'água-americana
Gallinula chloropus	galinha-d'água-comum
Gallinula nesiotis	galinha-d'água-de-tristão-da-cunha
Gallinula comeri	galinha-d'água-de-gough
Gallinula silvestris	galinha-d'água-de-makira
Gallinula pacifica	galinha-d'água-de-samoa
Fulica rufifrons	galeirão-de-escudo-vermelho
Fulica cornuta	galeirão-de-chifres
Fulica gigantea	galeirão-gigante
Fulica armillata	galeirão-de-bico-manchado
Fulica atra	galeirão-comum
Fulica cristata	galeirão-de-crista
Fulica newtonii	galeirão-das-mascarenhas

Fulica alai	galeirão-havaiano
Fulica americana	galeirão-americano
Fulica ardesiaca	galeirão-andino
Fulica leucoptera	galeirão-d'asa-branca
Porphyrio alleni	caimão-de-allen
Porphyrio martinica	caimão-americano
Porphyrio flavirostris	caimão-celeste
Porphyrio porphyrio	caimão-europeu
Porphyrio madagascariensis	caimão-africano
Porphyrio poliocephalus	caimão-de-cabeça-cinzenta
Porphyrio indicus	caimão-de-dorso-preto
Porphyrio pulverulentus	caimão-filipino
Porphyrio melanotus	caimão-australasiano
Porphyrio albus	caimão-branco
Porphyrio paepae	caimão-das-marquesas
Porphyrio mantelli	caimão-takahe-do-norte
Porphyrio hochstetteri	caimão-takahe-do-sul
Rufirallus xenopterus	franga-d'água-de-faces-ruivas
Rufirallus leucopyrrhus	franga-d'água-de-peito-branco
Rufirallus fasciatus	franga-d'água-zebra
Rufirallus schomburgkii	franga-d'água-ocelada
Rufirallus viridis	franga-d'água-de-barrete
Coturnicops exquisitus	franga-d'água-de-swinhoe
Coturnicops noveboracensis	franga-d'água-amarelada
Laterallus notatus	franga-d'água-sarapintada
Laterallus spiloptera	franga-d'água-cinzenta
Laterallus rogersi	franga-d'água-da-inacessível
Laterallus jamaicensis	frango-d'água-escura
Laterallus spilonota	franga-d'água-das-galápagos
Laterallus flaviventer	franga-d'água-de-peito-amarelo
Laterallus exilis	franga-d'água-de-peito-cinzento
Laterallus albigularis	franga-d'água-de-garganta-branca
Laterallus ruber	franga-d'água-ruiva
Laterallus levraudi	franga-d'água-venezuelana
Laterallus melanophaius	franga-d'água-de-flancos-ruivos
Mundia elpenor	frango-d'água-de-ascensão
Aphanocrex podarces	frango-d'água-de-santa-helena
Zapornia flavirostra	franga-d'água-preta
Zapornia olivieri	franga-d'água-sakalava
Zapornia fusca	franga-d'água-de-peito-ruivo
Zapornia paykullii	franga-d'água-mandarina
Zapornia bicolor	franga-d'água-rabinegra
Zapornia akool	franga-d'água-castanha
Zapornia pusilla	franga-d'água-pequena
Zapornia astrictocarpus	franga-d'água-de-santa-helena
Zapornia parva	franga-d'água-bastarda
Zapornia tabuensis	franga-d'água-imaculada
Zapornia monasa	franga-d'água-de-kosrae

Zapornia nigra	franga-d'água-do-taiti
Zapornia atra	franga-d'água-de-henderson
Zapornia sandwichensis	franga-d'água-do-havai
Zapornia palmeri	franga-d'água-de-laysan
Rallina eurizonoides	franga-d'água-de-patas-azuis
Rallina canningi	franga-d'água-das-andamão
Rallina fasciata	franga-d'água-de-patas-vermelhas
Rallina tricolor	franga-d'água-tricolor
Gymnocrex rosenbergii	frango-d'água-de-celebes
Gymnocrex talaudensis	frango-d'água-das-talaud
Gymnocrex plumbeiventris	frango-d'água-de-barriga-cinzenta
Himantornis haematopus	frango-d'água-de-patas-vermelhas
Megacrex inepta	frango-d'água-da-papua
Poliolimnas cinereus	franga-d'água-de-sobrancelha-branca
Aenigmatolimnas marginalis	franga-d'água-raiada
Gallicrex cinerea	galo-d'água
Amaurornis phoenicurus	galinha-d'água-de-peito-branco
Amaurornis olivacea	galinha-do-mato-filipina
Amaurornis magnirostris	galinha-do-mato-das-talaud
Amaurornis isabellina	galinha-do-mato-isabelina
Amaurornis moluccana	galinha-do-mato-das-molucas
Aphanapteryx bonasia	frango-d'água-vermelho
Erythromachus leguati	frango-d'água-de-rodrigues

Psophiidae Trombeteiros

Estas são aves de média dimensão, pernas compridas, plumagem sedosa e cabeça pequena. São principalmente frugívoras, alimentando-se ao nível do solo dentro de floresta tropical densa. Surpreendentemente, nidificam em cavidades nas árvores. São conhecidas por se aproximarem de habitações humanas, onde as suas fortes vocalizações de alarme na proximidade de predadores são valorizadas por proteger as capoeiras.

Espécies: 3

Distribuição: Bacia amazónica, na América do Sul

Psophia crepitans	trombeteiro-d'asa-cinzenta
Psophia leucoptera	trombeteiro-d'asa-branca
Psophia viridis	trombeteiro-d'asa-verde

A silhueta esbelta dos grous e as suas belas danças de acasalamento estão bem presentes no imaginário de muitas culturas humanas. Estas aves de grande dimensão são omnívoras e ocupam habitats abertos de diversos tipos, desde zonas húmidas a desertos. Várias delas são migratórias, juntando-se em enormes bandos de muitos milhares de aves durante o inverno e a passagem migratória.

Espécies: 15

Distribuição: América do Norte, Europa, África, Ásia e Austrália

Balearica regulorum	grou-coroado-cinzento
Balearica pavonina	grou-coroado-preto
Leucogeranus leucogeranus	grou-siberiano
Antigone canadensis	grou-canadiano
Antigone vipio	grou-de-nuca-branca
Antigone antigone	grou-sarus
Antigone rubicunda	grou-brolga
Grus carunculata	grou-carunculado
Grus paradisea	grou-do-paraíso
Grus virgo	grou-pequeno
Grus japonensis	grou-da-manchúria
Grus americana	grou-americano
Grus grus	grou-eurasiático
Grus monacha	grou-de-capuz
Grus nigricollis	grou-de-pescoço-preto

Aramidae Carão

O carão faz lembrar uma íbis à primeira vista, mas é mais próximo dos grous. É uma ave aquática, cujo bico é especializado numa alimentação quase exclusivamente à base de caracóis. A variedade de nomes locais para esta espécie resulta da grande gama de vocalizações que produz, sendo o chamamento do macho particularmente intenso.

Espécies: 1

Distribuição: América Central, do Sul e Flórida

Aramus guarauna	carão

Podicipedidae — Mergulhões

Os mergulhões estão perfeitamente adaptados à vida na água, tendo as patas posicionadas tão atrás no corpo, que têm dificuldade em caminhar em terra. Habitam zonas húmidas de água doce, mas no inverno podem frequentar águas costeiras. Alimentam-se de animais aquáticos, tanto peixes como invertebrados, mergulhando e capturando-os na coluna de água ou no leito. Muitas das espécies encontram-se ameaçadas e três extinguiram-se no final do século XX.

Espécies: 22

Distribuição: Cosmopolita, excepto Antárctida

Tachybaptus rufolavatus	mergulhão-do-alaotra
Tachybaptus ruficollis	mergulhão-pequeno
Tachybaptus novaehollandiae	mergulhão-da-oceânia
Tachybaptus pelzelnii	mergulhão-malgaxe
Tachybaptus dominicus	mergulhão-anão
Podilymbus podiceps	mergulhão-caçador
Podilymbus gigas	mergulhão-de-atitlan
Rollandia rolland	mergulhão-d'orelhas-brancas
Rollandia microptera	mergulhão-do-titicaca
Poliocephalus poliocephalus	mergulhão-grisalho
Poliocephalus rufopectus	mergulhão-maori
Podiceps major	mergulhão-grande
Podiceps grisegena	mergulhão-de-pescoço-ruivo
Podiceps cristatus	mergulhão-de-crista
Podiceps auritus	mergulhão-de-penachos
Podiceps nigricollis	mergulhão-de-pescoço-preto
Podiceps andinus	mergulhão-colombiano
Podiceps occipitalis	mergulhão-prateado
Podiceps taczanowskii	mergulhão-do-junín
Podiceps gallardoi	mergulhão-de-capuz
Aechmophorus occidentalis	mergulhão-americano-ocidental
Aechmophorus clarkii	mergulhão-de-clark

Phoenicopteridae Flamingos

Estas icónicas aves de grande dimensão e tonalidades rosadas conseguem habitar zonas aquáticas de alta salinidade, hostis para muitas outras espécies, onde formam grandes colónias. O seu bico especializado permite-lhes obter por filtração o plâncton e as algas que abundam nesse tipo de habitat. São os betacarotenos presentes nessas presas que contribuem para a pigmentação da sua plumagem.

Espécies: 6

Distribuição: Caraíbas, América do Sul, África, Médio Oriente e bacia mediterrânica

Phoenicopterus roseus	flamingo-rosado
Phoenicopterus ruber	flamingo-vermelho
Phoenicopterus chilensis	flamingo-chileno
Phoeniconaias minor	flamingo-pequeno
Phoenicoparrus andinus	flamingo-andino-grande
Phoenicoparrus jamesi	flamingo-andino-pequeno

Turnicidae Toirões

Os toirões são pequenas aves terrestres que, pelo seu aspecto, podem fazer lembrar as codornizes, embora não sejam próximos destas, sendo na verdade aparentados às limícolas. São aves de hábitos terrestres, que raramente voam. Habitam em planícies cobertas de erva e nidificam no solo. Uma das espécies desta família terá ocorrido em Portugal até meados do século XX, mas não se conhecem registos recentes da sua ocorrência.

Espécies: 18

Distribuição: África, Ásia, Oceânia e, possivelmente, sul da Europa

Turnix tanki	toirão-de-patas-amarelas
Turnix maculosus	toirão-de-dorso-vermelho
Turnix suscitator	toirão-barrado
Turnix ocellatus	toirão-ocelado
Turnix sylvaticus	toirão-comum
Turnix velox	toirão-pequeno
Turnix pyrrhothorax	toirão-de-peito-ruivo
Turnix worcesteri	toirão-de-lução
Turnix everetti	toirão-de-sumba
Turnix nanus	toirão-anão
Turnix hottentottus	toirão-do-cabo
Turnix castanotus	toirão-de-dorso-castanho
Turnix olivii	toirão-de-peito-creme
Turnix varius	toirão-colorido
Turnix novaecaledoniae	toirão-da-nova-caledónia
Turnix melanogaster	toirão-de-peito-preto
Turnix nigricollis	toirão-malgaxe
Ortyxelos meiffrenii	toirão-d'asa-branca

Burhinidae Alcaravões

Estas são aves de médio porte, com plumagem de tons crípticos, com o bico forte e grandes olhos amarelos. Vivem no solo e, embora sejam geralmente considerados limícolas, a maioria das espécies de alcaravões prefere locais relativamente áridos. Têm hábitos predominantemente nocturnos. O nome genérico *Burhinus* deriva do grego e significa 'nariz-de-boi'.

Espécies: 10

Distribuição: Quase cosmopolita, ocorrendo em diversos continentes em latitudes tropicais e temperadas

Hesperoburhinus bistriatus	alcaravão-americano
Hesperoburhinus superciliaris	alcaravão-peruano
Esacus recurvirostris	alcaravão-grande
Esacus magnirostris	alcaravão-das-praias
Burhinus capensis	alcaravão-do-cabo
Burhinus vermiculatus	alcaravão-d'água
Burhinus grallarius	alcaravão-rabilongo
Burhinus oedicnemus	alcaravão-comum
Burhinus indicus	alcaravão-indiano
Burhinus senegalensis	alcaravão-senegalês

Pluvianellidae — Borrelho-de-magalhães

O borrelho-de-magalhães é um parente relativamente distante dos verdadeiros borrelhos (Charadriidae), partilhando o habitat aquático com estes, mas lembrando mais uma pequena rola com patas compridas. Habita zonas húmidas e costeiras da Patagónia, onde procura invertebrados em margens lodosas ou arenosas. Usa os pés para escavar na areia ou na vasa, ou para agitar o sedimento, liquefazendo-o e ganhando assim acesso a alimento.

Espécies: 1

Distribuição: extremo sul da América do Sul

Pluvianellus socialis	borrelho-de-magalhães

Chionidae Bicos-de-bainha

A família Chionidae compreende apenas duas espécies: são os bicos-de-bainha, aves de médio porte aparentadas às limícolas e geneticamente mais próximas dos alcaravões. Têm uma plumagem branca incluindo uma camada de penugem. A sua alimentação é muito oportunista: consomem invertebrados, fezes e carniça, geralmente junto à linha de maré. Também capturam ovos e crias de pinguins e corvos-marinhos e alimentos regurgitados pelos adultos.

Espécies: 2

Distribuição: Península antárctica e ilhas subantárcticas

Chionis albus	bico-de-bainha-antárctico
Chionis minor	bico-de-bainha-de-faces-pretas

Haematopodidae — Ostraceiros

Os ostraceiros são aves limícolas de médio porte com um forte bico, especialmente adaptado para abrir as conchas de bivalves. Habitam em zonas costeiras de todo o mundo, embora o ostraceiro-eurasiático se possa encontrar também em água doce, longe da costa. Nalgumas espécies, a forma do bico é até certo ponto plástica e pode mudar em poucas semanas, em função da dieta.

Espécies: 12

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Haematopus leucopodus	ostraceiro-de-magalhães
Haematopus ater	ostraceiro-castanho
Haematopus bachmani	ostraceiro-preto-americano
Haematopus palliatus	ostraceiro-americano
Haematopus meadewaldoi	ostraceiro-das-canárias
Haematopus moquini	ostraceiro-preto-africano
Haematopus ostralegus	ostraceiro-eurasiático
Haematopus finschi	ostraceiro-de-finsch
Haematopus longirostris	ostraceiro-australiano
Haematopus unicolor	ostraceiro-variável
Haematopus chathamensis	ostraceiro-das-chatham
Haematopus fuliginosus	ostraceiro-preto-australiano

Ibidorhynchidae Bico-de-íbis

O bico-de-íbis é uma ave limícola relativamente grande, do tamanho de um maçarico-galego. Habita em zonas remotas e frequenta principalmente rios pedregosos em zonas montanhosas ou de planalto. Pode ser encontrado em locais situados a altitudes elevadas, por vezes superando os 4000 metros acima do nível do mar. Alimenta-se de invertebrados aquáticos, que procura por entre as pedras dos rios e também captura pequenos peixes.

Espécies: 1

Distribuição: Ásia central

Ibidorhyncha struthersii	bico-de-íbis

Encontram-se reunidas nesta família seis espécies de pernilongos e quatro espécies de alfaiates. Todas elas são limícolas de tamanho médio, com patas, bico e pescoço longos, tendo a maioria a plumagem preta e branca. Os alfaiates têm um bico recurvado, que usam para varrer os lodos, ao passo que os pernilongos têm o bico direito. Defendem os locais de nidificação de forma muito vigorosa, em geral vocalizando intensamente.

Espécies: 10

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Himantopus himantopus	pernilongo-comum
Himantopus leucocephalus	pernilongo-de-nuca-preta
Himantopus mexicanus	pernilongo-americano
Himantopus melanurus	pernilongo-de-dorso-branco
Himantopus novaezelandiae	pernilongo-preto
Cladorhynchus leucocephalus	pernilongo-de-peito-ruivo
Recurvirostra avosetta	alfaiate-comum
Recurvirostra americana	alfaiate-americano
Recurvirostra novaehollandiae	alfaiate-australiano
Recurvirostra andina	alfaiate-andino

Charadriidae Borrelhos, Tarambolas e Abibes

Estas aves podem ser encontradas em zonas abertas pelo mundo fora, desde a tundra árctica até savanas tropicais. Embora de aparência diversificada, a maioria partilha um bico curto e uma forma característica de alimentação - uma série de pequenas corridas interrompidas por paragens para capturar presas ao nível do solo. Alimentam-se principalmente de invertebrados, nomeadamente insectos, minhocas e pequenos crustáceos.

Espécies: 69

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Pluvialis squatarola	tarambola-cinzenta
Pluvialis apricaria	tarambola-dourada
Pluvialis fulva	tarambola-siberiana
Pluvialis dominica	tarambola-americana
Oreopholus ruficollis	borrelho-de-garganta-ruiva
Zonibyx modestus	borrelho-de-peito-ruivo
Phegornis mitchellii	borrelho-diademado
Eudromias morinellus	borrelho-ruivo
Charadrius vociferus	borrelho-de-coleira-dupla
Charadrius hiaticula	borrelho-grande-de-coleira
Charadrius semipalmatus	borrelho-semipalmado
Charadrius melodus	borrelho-assobiadeiro
Thinornis cucullatus	borrelho-de-cabeça-preta
Thinornis forbesi	borrelho-de-forbes
Thinornis tricollaris	borrelho-de-três-golas
Thinornis melanops	borrelho-de-testa-preta
Thinornis novaeseelandiae	borrelho-das-chatham
Thinornis dubius	borrelho-pequeno-de-coleira
Thinornis placidus	borrelho-de-bico-comprido
Hoploxypterus cayanus	borrelho-alvinegro
Vanellus vanellus	abibe-eurasiático
Vanellus crassirostris	abibe-de-faces-brancas
Vanellus armatus	abibe-armado
Vanellus spinosus	abibe-esporado
Vanellus duvaucelii	abibe-ribeirinho
Vanellus malabaricus	abibe-malabar
Vanellus tectus	abibe-de-cabeça-preta
Vanellus albiceps	abibe-de-coroa-branca
Vanellus lugubris	abibe-lúgubre
Vanellus melanopterus	abibe-d'asa-preta
Vanellus coronatus	abibe-coroado

Vanellus senegallus	abibe-carunculado
Vanellus melanocephalus	abibe-etíope
Vanellus superciliosus	abibe-de-peito-castanho
Vanellus cinereus	abibe-de-cabeça-cinzenta
Vanellus indicus	abibe-do-índico
Vanellus macropterus	abibe-javanês
Vanellus tricolor	abibe-tricolor
Vanellus miles	abibe-mascarado
Vanellus gregarius	abibe-sociável
Vanellus leucurus	abibe-de-cauda-branca
Vanellus chilensis	abibe-sul-americano
Vanellus resplendens	abibe-andino
Erythrogonys cinctus	borrelho-cintado
Peltohyas australis	borrelho-do-campo
Anarhynchus asiaticus	borrelho-do-cáspio
Anarhynchus veredus	borrelho-oriental
Anarhynchus atrifrons	borrelho-tibetano
Anarhynchus mongolus	borrelho-mongol
Anarhynchus leschenaultii	borrelho-do-deserto
Anarhynchus bicinctus	borrelho-de-banda-dupla
Anarhynchus frontalis	borrelho-de-bico-torto
Anarhynchus obscurus	borrelho-maori-do-sul
Anarhynchus wilsonia	borrelho-de-bico-grosso
Anarhynchus collaris	borrelho-de-coleira-americano
Anarhynchus montanus	borrelho-montês
Anarhynchus alticola	borrelho-da-puna
Anarhynchus falklandicus	borrelho-de-crescente-preto
Anarhynchus thoracicus	borrelho-malgaxe
Anarhynchus pecuarius	borrelho-de-kittlitz
Anarhynchus sanctaehelenae	borrelho-de-santa-helena
Anarhynchus ruficapillus	borrelho-de-capuz-vermelho
Anarhynchus nivosus	borrelho-nevoso
Anarhynchus pallidus	borrelho-de-colar-ruivo
Anarhynchus peronii	borrelho-malaio
Anarhynchus marginatus	borrelho-de-testa-branca
Anarhynchus javanicus	borrelho-javanês
Anarhynchus alexandrinus	borrelho-de-coleira-interrompida
Anarhynchus dealbatus	borrelho-de-faces-brancas

Pluvianidae — Ave-do-crocodilo

Esta pequena limícola, de aspecto inconfundível, vive ao longo de grandes rios na África subsariana. Alimenta-se sobretudo de insectos. O nome vernáculo 'ave-do-crocodilo' baseia-se numa suposta relação simbiótica, descrita pelo historiador grego Heródoto, na qual uma ave denominada '*trochilus*' limpava os dentes dos crocodilos. Embora o mito persista até hoje, nunca foram obtidas provas fotográficas desse comportamento.

Espécies: 1

Distribuição: África subsariana

Pluvianus aegyptius	ave-do-crocodilo

Rostratulidae — Narcejas-pintadas

Com as suas patas curtas e o bico longo, as narcejas-pintadas assemelham-se às narcejas verdadeiras. Distinguem-se pela sua plumagem mais escura, pelos seus grandes olhos e pelo facto de existir dimorfismo sexual ao nível da plumagem, sendo que os machos são os que apresentam as cores mais apagadas. Estas aves frequentam pauis com vegetação densa e podem ter hábitos crepusculares ou nocturnos.

Espécies: 3

Distribuição: América do Sul, África subsariana, sul da Ásia e Austrália

Rostratula benghalensis	narceja-pintada-grande
Rostratula australis	narceja-pintada-australiana
Nycticryphes semicollaris	narceja-pintada-americana

Jacanidae Jaçanãs

As jaçanãs saltam à vista pelas suas patas, pés e unhas extremamente compridos, adaptados para caminhar na frágil vegetação flutuante de rios e lagoas. Estas aves alimentam-se de insectos, crustáceos e moluscos e, em certos casos, sementes de vegetação aquática. Na maioria das espécies, é o macho que é responsável pelos cuidados parentais.

Espécies: 8

Distribuição: pantropical

Hydrophasianus chirurgus	jaçanã-rabo-de-faisão
Jacana spinosa	jaçanã-centro-americana
Jacana jacana	jaçanã-sul-americana
Microparra capensis	jaçanã-pequena
Irediparra gallinacea	jaçanã-de-crista
Metopidius indicus	jaçanã-bronzeada
Actophilornis africanus	jaçanã-africana
Actophilornis albinucha	jaçanã-malgaxe

Pedionomidae — Errante-das-planícies

O errante-das-planícies, como o nome indica, ocupa planícies cobertas de vegetação herbácea nativa no interior australiano. É uma pequena ave omnívora, que voa apenas relutantemente e prefere caminhar com uma postura erecta. Tem hábitos crepusculares. Esta espécie encontra-se criticamente ameaçada, devido à conversão da vegetação nativa para cultivo ou pasto para gado.

Espécies: 1

Distribuição: interior australiano

Pedionomus torquatus	errante-das-planícies

Thinocoridae Agachadeiras

As agachadeiras são aves de pequena a média dimensão, com um aspecto e hábitos que lembram lagópodes ou cotovias, espécies que estão ausentes da América do Sul. São predominantemente herbívoras ou granívoras e ocorrem em zonas abertas com vegetação muito rasteira, desde os cumes dos Andes até às estepes da Patagónia. Quando levantam voo, as suas longas asas e o seu voo ágil traem o seu parentesco próximo das limícolas.

Espécies: 4

Distribuição: regiões frias da América do Sul (Andes e extremo sul do continente)

Attagis gayi	agachadeira-de-barriga-ruiva
Attagis malouinus	agachadeira-de-barriga-branca
Thinocorus orbignyianus	agachadeira-de-peito-cinzento
Thinocorus rumicivorus	agachadeira-pequena

Scolopacidae — Maçaricos, Pilritos e afins

Estas aves limícolas têm bicos de variadíssimas formas e comprimentos, adaptados a diferentes estratégias de capturar invertebrados em substratos arenosos ou lodosos. Muitas espécies são migratórias, nidificando em tundras e prados húmidos do hemisfério norte, quando os insectos são mais abundantes. O mais longo voo sem paragens conhecido numa ave terrestre é feito pela população invernante neozelandesa de fuselos, atravessando o Oceano Pacífico para nidificar no Alasca.

Espécies: 98

Distribuição: Cosmopolita, excepto Antárctida

Bartramia longicauda	maçarico-do-campo
Numenius tahitiensis	maçarico-de-coxas-arrepiadas
Numenius phaeopus	maçarico-galego-eurasiático
Numenius hudsonicus	maçarico-galego-americano
Numenius minutus	maçarico-pequeno
Numenius borealis	maçarico-esquimó
Numenius americanus	maçarico-bicudo
Numenius madagascariensis	maçarico-siberiano
Numenius tenuirostris	maçarico-de-bico-fino
Numenius arquata	maçarico-real
Limosa lapponica	fuselo
Limosa limosa	maçarico-de-bico-direito
Limosa haemastica	maçarico-café
Limosa fedoa	maçarico-marmoreado
Limnodromus semipalmatus	maçarico-das-estepes
Limnodromus scolopaceus	maçarico-de-bico-comprido
Limnodromus griseus	maçarico-de-bico-curto
Lymnocryptes minimus	narceja-galega
Scolopax minor	galinhola-americana
Scolopax rusticola	galinhola-eurasiática
Scolopax mira	galinhola-japonesa
Scolopax bukidnonensis	galinhola-filipina
Scolopax saturata	galinhola-javanesa
Scolopax rosenbergii	galinhola-da-papua
Scolopax celebensis	galinhola-de-celebes
Scolopax rochussenii	galinhola-das-molucas
Coenocorypha barrierensis	narceja-maori-do-norte
Coenocorypha iredalei	narceja-maori-do-sul
Coenocorypha pusilla	narceja-das-chatham
Coenocorypha huegeli	narceja-das-snares
Coenocorypha aucklandica	narceja-das-auckland

Gallinago imperialis	narceja-imperial
Gallinago jamesoni	narceja-andina
Gallinago stricklandii	narceja-patagónica
Gallinago solitaria	narceja-solitária
Gallinago nemoricola	narceja-do-bosque
Gallinago media	narceja-real
Gallinago megala	narceja-de-swinhoe
Gallinago stenura	narceja-siberiana
Gallinago hardwickii	narceja-japonesa
Gallinago nigripennis	narceja-africana
Gallinago gallinago	narceja-comum
Gallinago delicata	narceja-de-wilson
Gallinago undulata	narceja-gigante
Gallinago nobilis	narceja-nobre
Gallinago andina	narceja-da-puna
Gallinago macrodactyla	narceja-malgaxe
Gallinago paraguaiae	narceja-sul-americana
Gallinago magellanica	narceja-de-magalhães
Phalaropus tricolor	falaropo-tricolor
Phalaropus fulicarius	falaropo-de-bico-grosso
Phalaropus lobatus	falaropo-de-bico-fino
Xenus cinereus	maçarico-sovela
Actitis hypoleucos	maçarico-das-rochas
Actitis macularius	maçarico-maculado
Tringa ochropus	maçarico-bique-bique
Tringa solitaria	maçarico-solitário
Tringa brevipes	maçarico-de-cauda-cinzenta
Tringa incana	maçarico-itinerante
Tringa stagnatilis	perna-verde-fino
Tringa glareola	maçarico-de-dorso-malhado
Tringa totanus	perna-vermelha-comum
Tringa flavipes	perna-amarela-pequeno
Tringa guttifer	perna-verde-mosqueado
Tringa semipalmata	maçarico-d'asa-branca
Tringa erythropus	perna-vermelha-escuro
Tringa nebularia	perna-verde-comum
Tringa melanoleuca	perna-amarela-grande
Prosobonia cancellata	maçarico-de-kiritimati
Prosobonia leucoptera	maçarico-do-taiti
Prosobonia ellisi	maçarico-de-moorea
Prosobonia parvirostris	maçarico-das-tuamotu
Arenaria interpres	rola-do-mar-comum
Arenaria melanocephala	rola-do-mar-fusca
Calidris tenuirostris	seixoeira-grande
Calidris canutus	seixoeira-comum

Calidris virgata	pilrito-surfista
Calidris pugnax	combatente
Calidris falcinellus	pilrito-de-bico-grosso
Calidris acuminata	pilrito-acuminado
Calidris himantopus	pilrito-pernilongo
Calidris ferruginea	pilrito-de-bico-comprido
Calidris temminckii	pilrito-de-temminck
Calidris subminuta	pilrito-de-dedos-compridos
Calidris ruficollis	pilrito-de-pescoço-ruivo
Calidris pygmaea	pilrito-colhereiro
Calidris subruficollis	pilrito-canela
Calidris alba	pilrito-das-praias
Calidris alpina	pilrito-comum
Calidris maritima	pilrito-escuro
Calidris ptilocnemis	pilrito-das-rochas
Calidris bairdii	pilrito-de-bico-fino
Calidris minuta	pilrito-pequeno
Calidris minutilla	pilrito-anão
Calidris fuscicollis	pilrito-d'uropígio-branco
Calidris melanotos	pilrito-de-colete
Calidris mauri	pilrito-ocidental
Calidris pusilla	pilrito-semipalmado

Dromadidae **Caranguejeiro**

O caranguejeiro é uma ave limícola que se distingue pela sua plumagem preta e branca e, particularmente, pelo seu bico robusto, que faz lembrar o de uma andorinha-do-mar. Como o seu nome indica, alimenta-se principalmente de caranguejos. Ao contrário do que é habitual em limícolas, o caranguejeiro nidifica em cavidades escavadas em bancos de areia; as crias não são nidífugas, permanecendo no ninho alguns dias após a eclosão até conseguirem voar.

Espécies: 1

Distribuição: Zonas costeiras do oceano Índico

Dromas ardeola	caranguejeiro

Glareolidae Corredores e Perdizes-do-mar

Esta família compreende dois grupos de aves bem distintas: as perdizes-do-mar e os corredores. As primeiras têm patas curtas, um bico muito curto e asas muito longas; quando voam, podem fazer lembrar andorinhas gigantes – alimentam-se de insectos, que capturam sobretudo em voo. Os segundos vivem principalmente em zonas áridas ou desérticas, têm hábitos crepusculares ou nocturnos e caracterizam-se por um comportamento discreto.

Espécies: 17

Distribuição: Velho Mundo, incluindo Europa, África, Madagáscar, Ásia e Austrália

Smutsornis africanus	corredor-de-duas-golas
Rhinoptilus chalcopterus	corredor-asa-de-bronze
Rhinoptilus cinctus	corredor-de-três-golas
Rhinoptilus bitorquatus	corredor-do-godavari
Cursorius coromandelicus	corredor-indiano
Cursorius temminckii	corredor-de-temminck
Cursorius rufus	corredor-de-burchell
Cursorius cursor	corredor-sariano
Cursorius somalensis	corredor-somali
Glareola isabella	perdiz-do-mar-australiana
Glareola nuchalis	perdiz-do-mar-escura
Glareola cinerea	perdiz-do-mar-cinzenta
Glareola lactea	perdiz-do-mar-pequena
Glareola maldivarum	perdiz-do-mar-oriental
Glareola nordmanni	perdiz-do-mar-d'asa-preta
Glareola pratincola	perdiz-do-mar-ocidental
Glareola ocularis	perdiz-do-mar-malgaxe

Laridae Gaivotas, Garajaus e afins

Aqui se incluem as bem conhecidas gaivotas, aves de média dimensão, mas também os mais pequenos garajaus, andorinhas-do-mar e talha-mares. Nidificam em grandes colónias e são principalmente piscívoras, mas muitas gaivotas têm uma alimentação mais oportunista. Podem ser encontrados no mar alto, em águas costeiras e em zonas húmidas de água doce, sendo que algumas espécies habitam até em montanhas ou estepes longe da costa, desde que exista alguma água nas proximidades.

Espécies: 106

Distribuição: Cosmopolita

Rynchops flavirostris	talha-mar-africano
Rynchops albicollis	talha-mar-asiático
Rynchops niger	talha-mar-americano
Gygis alba	gaivina-branca
Gygis candida	gaivina-de-bico-azul
Gygis microrhyncha	gaivina-de-bico-pequeno
Anous stolidus	nodi-castanho
Anous tenuirostris	nodi-pequeno
Anous minutus	nodi-preto
Anous albivitta	nodi-cinzento
Anous ceruleus	nodi-azul
Onychoprion aleuticus	gaivina-das-aleutas
Onychoprion fuscatus	gaivina-de-dorso-preto
Onychoprion anaethetus	gaivina-de-dorso-castanho
Onychoprion lunatus	gaivina-de-dorso-cinzento
Sternula albifrons	chilreta-comum
Sternula saundersi	chilreta-de-saunders
Sternula antillarum	chilreta-americana
Sternula superciliaris	chilreta-amazónica
Sternula lorata	chilreta-peruana
Sternula nereis	chilreta-australiana
Sternula balaenarum	chilreta-da-damaralândia
Phaetusa simplex	gaivina-de-bico-grande
Gelochelidon nilotica	tagaz
Gelochelidon macrotarsa	tagaz-australiano
Hydroprogne caspia	garajau-grande
Larosterna inca	gaivina-inca
Chlidonias hybrida	gaivina-dos-pauis
Chlidonias albostriatus	gaivina-maori
Chlidonias niger	gaivina-preta
Chlidonias leucopterus	gaivina-d'asa-branca

Sterna aurantia	andorinha-do-mar-ribeirinha
Sterna forsteri	andorinha-do-mar-de-forster
Sterna trudeaui	andorinha-do-mar-de-coroa-branca
Sterna paradisaea	andorinha-do-mar-árctica
Sterna hirundinacea	andorinha-do-mar-sul-americana
Sterna vittata	andorinha-do-mar-antárctica
Sterna virgata	andorinha-do-mar-das-kerguelen
Sterna hirundo	andorinha-do-mar-comum
Sterna repressa	andorinha-do-mar-arábica
Sterna sumatrana	andorinha-do-mar-de-samatra
Sterna dougallii	andorinha-do-mar-rósea
Sterna striata	andorinha-do-mar-maori
Sterna acuticauda	andorinha-do-mar-de-barriga-preta
Thalasseus sandvicensis	garajau-comum
Thalasseus acuflavidus	garajau-de-cabot
Thalasseus elegans	garajau-elegante
Thalasseus bengalensis	garajau-bengalense
Thalasseus albididorsalis	garajau-real-africano
Thalasseus maximus	garajau-real-americano
Thalasseus bergii	garajau-de-bico-amarelo
Thalasseus bernsteini	garajau-chinês
Creagrus furcatus	gaivota-rabo-de-andorinha
Hydrocoloeus minutus	gaivota-pequena
Rhodostethia rosea	gaivota-rosada
Rissa tridactyla	gaivota-tridáctila
Rissa brevirostris	gaivota-de-patas-vermelhas
Pagophila eburnea	gaivota-marfim
Xema sabini	gaivota-de-sabine
Saundersilarus saundersi	gaivota-de-saunders
Chroicocephalus genei	gaivota-de-bico-fino
Chroicocephalus philadelphia	guincho-americano
Chroicocephalus novaehollandiae	gaivota-australiana
Chroicocephalus bulleri	gaivota-maori
Chroicocephalus serranus	guincho-andino
Chroicocephalus maculipennis	guincho-de-cabeça-castanha
Chroicocephalus ridibundus	guincho-comum
Chroicocephalus brunnicephalus	guincho-do-tibete
Chroicocephalus cirrocephalus	gaivota-de-cabeça-cinzenta
Chroicocephalus hartlaubii	gaivota-de-hartlaub
Leucophaeus modestus	gaivota-cinzenta
Leucophaeus scoresbii	gaivota-patagónica
Leucophaeus atricilla	gaivota-risonha
Leucophaeus pipixcan	gaivota-das-pradarias
Leucophaeus fuliginosus	gaivota-das-galápagos
Ichthyaetus ichthyaetus	gaivotão-de-cabeça-preta

Ichthyaetus relictus	gaivota-relíquia
Ichthyaetus audouinii	gaivota-de-audouin
Ichthyaetus melanocephalus	gaivota-de-cabeça-preta
Ichthyaetus hemprichii	gaivota-fuliginosa
Ichthyaetus leucophthalmus	gaivota-d'olho-branco
Larus pacificus	gaivotão-australiano
Larus belcheri	gaivota-caranguejeira-do-pacífico
Larus crassirostris	gaivota-japonesa
Larus atlanticus	gaivota-caranguejeira-do-atlântico
Larus heermanni	gaivota-mexicana
Larus canus	gaivota-parda
Larus brachyrhynchus	gaivota-de-bico-curto
Larus delawarensis	gaivota-de-bico-riscado
Larus livens	gaivota-de-cortez
Larus occidentalis	gaivota-ocidental
Larus cachinnans	gaivota-do-cáspio
Larus dominicanus	gaivota-dominicana
Larus argentatus	gaivota-prateada-europeia
Larus vegae	gaivota-siberiana
Larus mongolicus	gaivota-mongol
Larus michahellis	gaivota-de-patas-amarelas
Larus armenicus	gaivota-arménia
Larus marinus	gaivotão-real
Larus hyperboreus	gaivota-hiperbórea
Larus fuscus	gaivota-d'asa-escura
Larus californicus	gaivota-da-califórnia
Larus smithsonianus	gaivota-prateada-americana
Larus glaucescens	gaivota-de-bering
Larus schistisagus	gaivota-de-kamchatka
Larus glaucoides	gaivota-polar

Stercorariidae Moleiros

Os moleiros são aves marinhas de tamanho médio, com uma plumagem sobretudo castanha. Têm uma alimentação variada e oportunista, em parte baseada no cleptoparasitismo: perseguem outras aves marinhas, para lhes roubarem o alimento. O nome genérico *Stercorarius* vem do latim *stercus*, que significa esterco – este nome surge porque no passado se pensava que os moleiros se alimentavam dos excrementos de outras aves.

Espécies: 7

Distribuição: Tundra e ilhas oceânicas de ambos os hemisférios; invernam em ambientes pelágicos, incluindo nos trópicos

Stercorarius longicaudus	moleiro-rabilongo
Stercorarius parasiticus	moleiro-parasítico
Stercorarius pomarinus	moleiro-pomarino
Stercorarius skua	moleiro-grande
Stercorarius chilensis	moleiro-chileno
Stercorarius antarcticus	moleiro-subantárctico
Stercorarius maccormicki	moleiro-antárctico

Alcidae — Airos, Tordas e afins

A família dos alcídeos reúne diversas espécies de hábitos exclusivamente marinhos, incluindo airos, tordas e papagaios-do-mar. Têm patas curtas com membranas interdigitais e uma cauda curta. Além de conseguirem voar, são excelentes mergulhadores e nadadores, mas bastante desajeitados em terra. Devido à sua postura vertical e à plumagem onde predominam o preto e o branco, podem fazer lembrar pinguins, mas não são aparentados a estas aves.

Espécies: 25

Distribuição: Oceanos e zonas costeiras do hemisfério norte

Cerorhinca monocerata	mérgulo-cornudo
Fratercula cirrhata	papagaio-do-mar-de-penachos
Fratercula arctica	papagaio-do-mar-do-atlântico
Fratercula corniculata	papagaio-do-mar-cornudo
Ptychoramphus aleuticus	mérgulo-sombrio
Aethia pusilla	mérgulo-anão
Aethia pygmaea	mérgulo-de-bigodes
Aethia cristatella	mérgulo-de-penachos
Aethia psittacula	mérgulo-papagaio
Brachyramphus perdix	mérgulo-de-bico-longo
Brachyramphus brevirostris	mérgulo-de-bico-curto
Brachyramphus marmoratus	mérgulo-marmoreado
Cepphus grylle	airo-d'asa-branca
Cepphus carbo	airo-d'óculos
Cepphus columba	airo-columbino
Alca torda	torda-mergulheira
Pinguinus impennis	torda-gigante
Alle alle	torda-anã
Uria lomvia	airo-de-freio
Uria aalge	airo-comum
Synthliboramphus antiquus	mérgulo-ancião
Synthliboramphus wumizusume	mérgulo-japonês
Synthliboramphus scrippsi	mérgulo-da-califórnia
Synthliboramphus hypoleucus	mérgulo-de-guadalupe
Synthliboramphus craveri	mérgulo-d’asa-escura

Rhynochetidae Kagu

O kagu é uma ave terrestre sem capacidade de voo, endémica da Nova Caledónia, uma ilha no oceano Pacífico. De cor prateada e com uma exuberante crista, percorre as florestas e matos autóctones da ilha procurando invertebrados no solo e manta morta. Quando alarmado, abre as asas e a cauda numa postura que lembra o seu único parente não-extinto, a garça-sol da América do Sul (família seguinte).

Espécies: 1

Distribuição: Nova Caledónia

Rhynochetos jubatus	kagu

Eurypygidae **Garça-sol**

Embora não seja uma garça, esta ave faz certamente lembrar uma, devido ao seu longo pescoço e ao bico longo e pontiagudo, que utiliza para capturar presas animais (tanto vertebrados como invertebrados) nas margens de rios e lagos. Nidifica em árvores e, quando alarmada, adopta uma postura destinada a assustar predadores, abrindo as asas e a cauda e mostrando um padrão colorido que faz lembrar dois grandes olhos.

Espécies: 1

Distribuição: América Central e metade norte da América do Sul

Eurypyga helias	garça-sol

Phaethontidae Rabos-de-palha

Estas são aves elegantes, com plumagem branca e cauda muito longa, que habitam nos mares tropicais. Nidificam em ilhas isoladas, muitas vezes em locais inacessíveis, e passam a maior parte do seu tempo a viajar pelo oceano, em busca dos peixes-voadores e das lulas, de que se alimentam. Capturam as suas presas com um mergulho. O nome genérico *Phaethon* provém do grego e significa 'sol'.

Espécies: 3

Distribuição: Ilhas oceânicas em latitudes tropicais

Phaethon aethereus	rabo-de-palha-de-bico-vermelho
Phaethon rubricauda	rabo-de-palha-de-cauda-vermelha
Phaethon lepturus	rabo-de-palha-de-bico-laranja

Gaviidae Mobelhas

Estas são aves aquáticas mergulhadoras, com um tamanho intermédio entre um pato e um ganso. São excelentes nadadoras e alimentam-se sobretudo de peixe. As suas patas, dotadas de membranas interdigitais, ajudam-nas a progredir bem na água; contudo, por estarem situadas na parte traseira do corpo, dificultam os seus movimentos em terra. As mobelhas nidificam em lagos de água doce, em latitudes elevadas, e invernam em zonas costeiras.

Espécies: 5

Distribuição: Holárctico

Gavia stellata	mobelha-pequena
Gavia arctica	mobelha-árctica
Gavia pacifica	mobelha-do-pacífico
Gavia immer	mobelha-grande
Gavia adamsii	mobelha-de-bico-amarelo

Spheniscidae Pinguins

Os pinguins são emblemáticos dos mares frios e altamente produtivos do hemisfério sul, chegando até a cruzar o equador nas Ilhas Galápagos. São incapazes de voar, mas as suas asas funcionam como barbatanas, tornando-os excelentes nadadores e mergulhadores, que perseguem peixes, lulas e crustáceos a alta velocidade. As suas penas são curtas e densas, formando uma camada isolante e à prova de água. Nidificam colonialmente e são monógamos.

Espécies: 19

Distribuição: Antárctida e oceano circundante, América do Sul, África austral, Austrália e Nova Zelândia

Aptenodytes patagonicus	pinguim-rei
Aptenodytes forsteri	pinguim-imperador
Pygoscelis adeliae	pinguim-de-adélia
Pygoscelis antarcticus	pinguim-de-barbicha
Pygoscelis papua	pinguim-gentoo
Eudyptula minor	pinguim-pequeno
Spheniscus mendiculus	pinguim-das-galápagos
Spheniscus humboldti	pinguim-de-humboldt
Spheniscus magellanicus	pinguim-de-magalhães
Spheniscus demersus	pinguim-do-cabo
Megadyptes antipodes	pinguim-d'olho-amarelo
Eudyptes chrysolophus	pinguim-macaroni
Eudyptes schlegeli	pinguim-real
Eudyptes moseleyi	pinguim-saltador-setentrional
Eudyptes filholi	pinguim-saltador-oriental
Eudyptes chrysocome	pinguim-saltador-ocidental
Eudyptes pachyrhynchus	pinguim-de-fiordland
Eudyptes robustus	pinguim-das-snares
Eudyptes sclateri	pinguim-de-crista-erecta

Oceanitidae — Painhos do sul

Os painhos do sul são aves marinhas de muito pequena dimensão, medindo apenas 15 a 26 cm de comprimento. Alimentam-se no mar, patinhando com os pés na superfície da água e muitas vezes seguem os barcos ou os cetáceos. Nidificam colonialmente em ilhas e na Antárctida. Tal como sucede com outras aves marinhas, várias espécies encontram-se ameaçadas devido à introdução de predadores terrestres nos seus locais de reprodução.

Espécies: 10

Distribuição: Oceanos, sobretudo no hemisfério sul

Oceanites oceanicus	painho-casquilho
Oceanites gracilis	painho-de-elliot
Oceanites pincoyae	painho-pincoya
Garrodia nereis	painho-de-dorso-cinzento
Pelagodroma marina	calca-mar
Fregetta grallaria	painho-de-barriga-branca
Fregetta tropica	painho-de-barriga-preta
Fregetta lineata	painho-da-nova-caledónia
Fregetta maoriana	painho-maori
Nesofregetta fuliginosa	painho-de-garganta-branca

Diomedeidae Albatrozes

Os albatrozes são aves oceânicas de grande dimensão, cujas longas e estreitas asas podem ultrapassar 3 metros de envergadura. Estas permitem-lhes usar voo planado, propulsionado por fortes ventos, para percorrer milhares de quilómetros em busca de peixe, lulas e crustáceos. Nidificam colonialmente em ilhas oceânicas isoladas, onde a cria única de cada casal demora quase um ano a desenvolver-se. Esta reduzida taxa de reprodução contribui para o estatuto de conservação desfavorável em que todas as espécies se encontram.

Espécies: 21

Distribuição: todos os oceanos do hemisfério sul e ainda o Pacífico Norte

Diomedea sanfordi	albatroz-real-do-norte
Diomedea epomophora	albatroz-real-do-sul
Diomedea exulans	albatroz-errante
Diomedea dabbenena	albatroz-de-tristão-da-cunha
Diomedea antipodensis	albatroz-das-antípodas
Diomedea amsterdamensis	albatroz-de-amesterdão
Phoebastria irrorata	albatroz-das-galápagos
Phoebastria immutabilis	albatroz-de-laysan
Phoebastria nigripes	albatroz-de-patas-pretas
Phoebastria albatrus	albatroz-de-rabo-curto
Phoebetria fusca	albatroz-preto
Phoebetria palpebrata	albatroz-de-manto-claro
Thalassarche chlororhynchos	albatroz-de-nariz-amarelo
Thalassarche carteri	albatroz-de-carter
Thalassarche chrysostoma	albatroz-de-cabeça-cinzenta
Thalassarche bulleri	albatroz-de-buller
Thalassarche cauta	albatroz-arisco
Thalassarche salvini	albatroz-de-salvin
Thalassarche eremita	albatroz-das-chatham
Thalassarche melanophris	albatroz-de-sobrancelha
Thalassarche impavida	albatroz-de-campbell

Hydrobatidae — Painhos do norte

Tal como os seus 'primos' austrais, os painhos do norte são pequenas aves pelágicas, com comprimentos que vão de 13 a 25 cm. Têm contudo asas mais longas e patas mais curtas que aqueles. Alimentam-se no mar alto e nidificam principalmente em ilhas, tendo hábitos nocturnos em terra para evitar a predação por gaivotas e fragatas. A predação e a destruição de habitat causadas pela introdução de mamíferos é um factor que ameaça várias espécies.

Espécies: 18

Distribuição: Oceanos, principalmente no hemisfério norte

Hydrobates pelagicus	alma-de-mestre
Hydrobates furcatus	painho-cauda-d'andorinha
Hydrobates hornbyi	painho-de-colar
Hydrobates monorhis	painho-de-swinhoe
Hydrobates matsudairae	painho-de-matsudaira
Hydrobates leucorhous	painho-de-cauda-forcada
Hydrobates socorroensis	painho-de-socorro
Hydrobates cheimomnestes	painho-de-ainley
Hydrobates homochroa	painho-cinzento
Hydrobates castro	painho-da-madeira
Hydrobates monteiroi	painho-de-monteiro
Hydrobates jabejabe	painho-de-cabo-verde
Hydrobates tethys	painho-das-galápagos
Hydrobates melania	painho-preto
Hydrobates macrodactylus	painho-de-guadalupe
Hydrobates markhami	painho-escuro
Hydrobates tristrami	painho-de-tristram
Hydrobates microsoma	painho-pequeno

Procellariidae — Pardelas e afins

Os membros desta grande família de aves marinhas têm hábitos pelágicos, percorrendo longas distâncias pelo mar em busca de alimento ou em migração. Possuem um apurado olfacto, que lhes permite detectar concentrações de peixe e plâncton na vastidão marítima. Nidificam colonialmente em ilhas isoladas e desprovidas de predadores naturais. A introdução de mamíferos nessas ilhas e as capturas acidentais na pesca levam a que perto de metade das espécies tenham um estatuto de conservação desfavorável.

Espécies: 100

Distribuição: mares e oceanos de todo o mundo

Macronectes giganteus	pardelão-meridional
Macronectes halli	pardelão-setentrional
Fulmarus glacialis	fulmar-boreal
Fulmarus glacialoides	fulmar-austral
Thalassoica antarctica	pardela-antárctica
Daption capense	pardela-do-cabo
Pagodroma nivea	pardela-das-neves
Halobaena caerulea	pardela-azul
Pachyptila vittata	faigão-de-bico-largo
Pachyptila salvini	faigão-de-salvin
Pachyptila macgillivrayi	faigão-de-macgillivray
Pachyptila desolata	faigão-antárctico
Pachyptila belcheri	faigão-de-bico-fino
Pachyptila turtur	faigão-de-bico-curto
Pachyptila crassirostris	faigão-de-bico-grosso
Aphrodroma brevirostris	freira-de-bico-curto
Pterodroma macroptera	freira-d'asa-grande
Pterodroma lessonii	freira-de-cabeça-branca
Pterodroma gouldi	freira-de-faces-cinzentas
Pterodroma incerta	freira-de-schlegel
Pterodroma solandri	freira-de-solander
Pterodroma magentae	freira-de-magenta
Pterodroma ultima	freira-de-murphy
Pterodroma mollis	freira-suave
Pterodroma madeira	freira-da-madeira
Pterodroma feae	freira-de-cabo-verde
Pterodroma deserta	freira-das-desertas
Pterodroma cahow	freira-das-bermudas
Pterodroma hasitata	freira-das-antilhas
Pterodroma caribbaea	freira-jamaicana
Pterodroma externa	freira-das-joão-fernandes

Pterodroma occulta	freira-de-vanuatu
Pterodroma neglecta	freira-das-kermadec
Pterodroma heraldica	freira-de-herald
Pterodroma arminjoniana	freira-da-trindade
Pterodroma atrata	freira-de-henderson
Pterodroma alba	freira-das-fénix
Pterodroma baraui	freira-de-barau
Pterodroma sandwichensis	freira-havaiana
Pterodroma phaeopygia	freira-das-galápagos
Pterodroma inexpectata	freira-malhada
Pterodroma cervicalis	freira-de-pescoço-branco
Pterodroma nigripennis	freira-d'asa-preta
Pterodroma axillaris	freira-das-chatham
Pterodroma hypoleuca	freira-das-bonin
Pterodroma leucoptera	freira-de-garganta-branca
Pterodroma brevipes	freira-de-colar
Pterodroma cookii	freira-de-cook
Pterodroma defilippiana	freira-chilena
Pterodroma longirostris	freira-de-stejneger
Pterodroma pycrofti	freira-de-pycroft
Pterodroma rupinarum	freira-de-santa-helena
Pseudobulweria aterrima	freira-da-reunião
Pseudobulweria rostrata	freira-do-taiti
Pseudobulweria becki	freira-de-beck
Pseudobulweria macgillivrayi	freira-das-fiji
Procellaria cinerea	pardela-cinzenta
Procellaria aequinoctialis	pardela-de-queixo-branco
Procellaria conspicillata	pardela-d'óculos
Procellaria parkinsoni	pardela-de-parkinson
Procellaria westlandica	pardela-de-westland
Calonectris leucomelas	cagarra-do-pacífico
Calonectris diomedea	cagarra-do-mediterrâneo
Calonectris borealis	cagarra-do-atlântico
Calonectris edwardsii	cagarra-de-cabo-verde
Ardenna pacifica	pardela-rabilonga
Ardenna bulleri	pardela-de-dorso-cinzento
Ardenna grisea	pardela-preta
Ardenna tenuirostris	pardela-da-tasmânia
Ardenna creatopus	pardela-de-patas-rosadas
Ardenna carneipes	pardela-de-patas-claras
Ardenna gravis	pardela-de-barrete
Puffinus nativitatis	pardela-de-kiritimati
Puffinus puffinus	pardela-sombria
Puffinus yelkouan	pardela-do-mediterrâneo
Puffinus mauretanicus	pardela-balear

Puffinus bryani	pardela-de-bryan
Puffinus opisthomelas	pardela-da-califórnia
Puffinus auricularis	pardela-de-townsend
Puffinus newelli	pardela-de-newell
Puffinus myrtae	pardela-de-rapa
Puffinus gavia	pardela-agitada
Puffinus huttoni	pardela-de-hutton
Puffinus lherminieri	pardela-de-audubon
Puffinus persicus	pardela-persa
Puffinus bailloni	pardela-tropical
Puffinus subalaris	pardela-das-galápagos
Puffinus bannermani	pardela-de-bannerman
Puffinus heinrothi	pardela-de-heinroth
Puffinus assimilis	pardela-maori
Puffinus elegans	pardela-subantárctica
Puffinus baroli	pardela-pequena
Puffinus boydi	pardela-de-cabo-verde
Pelecanoides garnotii	pardela-mergulhadora-peruana
Pelecanoides magellani	pardela-mergulhadora-de-magalhães
Pelecanoides georgicus	pardela-mergulhadora-da-geórgia-do-sul
Pelecanoides urinatrix	pardela-mergulhadora-comum
Bulweria bulwerii	alma-negra-de-bulwer
Bulweria bifax	alma-negra-de-santa-helena
Bulweria fallax	alma-negra-arábica

Ciconiidae Cegonhas

As cegonhas são aves de grande porte, com patas longas e bico longo. A sua dieta é composta por matéria animal e inclui vertebrados e invertebrados. Tal como acontece com a maioria das rapinas, as cegonhas são aves planadoras, conseguindo tirar partido das correntes ascendentes na atmosfera para conseguir ganhar altura. No caso das espécies asiáticas, há várias que se encontram ameaçadas.

Espécies: 20

Distribuição: Quase cosmopolita, mas faltam em grande parte da América do Norte e nas regiões polares

Anastomus lamelligerus	cegonha-de-bico-aberto-africana
Anastomus oscitans	cegonha-de-bico-aberto-asiática
Leptoptilos crumenifer	marabu-africano
Leptoptilos javanicus	marabu-pequeno
Leptoptilos dubius	marabu-grande
Mycteria americana	cegonha-americana
Mycteria ibis	cegonha-de-bico-amarelo
Mycteria leucocephala	cegonha-pintada
Mycteria cinerea	cegonha-malaia
Jabiru mycteria	jabiru-americano
Ephippiorhynchus senegalensis	jabiru-africano
Ephippiorhynchus asiaticus	jabiru-asiático
Ciconia abdimii	cegonha-de-abdim
Ciconia episcopus	cegonha-lanuda
Ciconia stormi	cegonha-de-faces-amarelas
Ciconia nigra	cegonha-preta
Ciconia maguari	cegonha-maguari
Ciconia microscelis	cegonha-episcopal
Ciconia ciconia	cegonha-branca
Ciconia boyciana	cegonha-oriental

Fregatidae Fragatas

As fragatas, tal como os moleiros, têm a fama de serem piratas dos mares, devido ao seu hábito de perseguirem outras aves para lhes roubarem o alimento. Contudo, também caçam o seu próprio alimento, em especial peixes voadores e lulas. São aves marinhas de grande porte, com asas e cauda longas e plumagem preta. Os machos têm uma enorme bolsa gular vermelha, que fazem inflar durante a época de reprodução, a fim de impressionar as fêmeas.

Espécies: 5

Distribuição: Águas oceânicas, em latitudes tropicais

Fregata aquila	fragata-de-ascensão
Fregata magnificens	fragata-magnífica
Fregata ariel	fragata-pequena
Fregata minor	fragata-grande
Fregata andrewsi	fragata-da-ilha-de-natal

Sulidae Gansos-patolas e Alcatrazes

Esta família reúne dois grupos de aves marinhas de grande porte: os alcatrazes e os gansos-patolas. São aves com asas longas e pontiagudas e um bico cónico e aguçado. Alimentam-se sobretudo de peixes e lulas, que capturam com um espectacular mergulho, como um torpedo, podendo atingir profundidades de 25 metros enquanto perseguem as suas presas debaixo de água. Frequentam mar aberto, geralmente perto da costa, e preferem nidificar em ilhas.

Espécies: 11

Distribuição: Águas oceânicas, em latitudes tropicais e temperadas

Papasula abbotti	alcatraz-de-abbott
Morus bassanus	ganso-patola-do-atlântico
Morus capensis	ganso-patola-do-cabo
Morus serrator	ganso-patola-australiano
Sula sula	alcatraz-de-pés-vermelhos
Sula leucogaster	alcatraz-pardo
Sula brewsteri	alcatraz-de-cocos
Sula dactylatra	alcatraz-grande
Sula granti	alcatraz-de-nazca
Sula nebouxii	alcatraz-de-pés-azuis
Sula variegata	alcatraz-peruano

Anhingidae Mergulhões-serpente e Anhinga

Estas aves fazem lembrar corvos-marinhos, mas com um bico mais longo e pontiagudo. Tal como estes, mergulham em busca de peixe e são ágeis nadadoras. Utilizam o bico para empalar as presas, que depois trazem à superfície, atiram para o ar e engolem. Ocorrem em zonas húmidas de água doce, com águas pouco profundas e poisos disponíveis.

Espécies: 4

Distribuição: América tropical, África subsariana, Ásia tropical e Australásia

Anhinga melanogaster	mergulhão-serpente-asiático
Anhinga rufa	mergulhão-serpente-africano
Anhinga novaehollandiae	mergulhão-serpente-australiano
Anhinga anhinga	anhinga

Phalacrocoracidae — Corvos-marinhos

Os corvos-marinhos, cuja plumagem negra pode fazer lembrar corvídeos, são aves aquáticas de médio a grande porte, que se alimentam sobretudo de peixe. A maioria das espécies costuma abrir as asas ao sol, para as secar. Em certos países existe a tradição de domesticar os corvos-marinhos e de os treinar para pescar de forma controlada: atando um laço à garganta da ave, esta fica impedida de engolir peixes grandes, que são depois removidos pelo pescador.

Espécies: 36

Distribuição: Cosmopolita

Microcarbo pygmaeus	corvo-marinho-pigmeu
Microcarbo africanus	corvo-marinho-africano
Microcarbo coronatus	corvo-marinho-coroado
Microcarbo niger	corvo-marinho-javanês
Microcarbo melanoleucos	corvo-marinho-de-bico-curto
Poikilocarbo gaimardi	corvo-marinho-de-patas-vermelhas
Urile penicillatus	corvo-marinho-de-garganta-azul
Urile urile	corvo-marinho-de-faces-vermelhas
Urile pelagicus	corvo-marinho-pelágico
Urile perspicillatus	corvo-marinho-de-lunetas
Phalacrocorax neglectus	corvo-marinho-dos-baixios
Phalacrocorax nigrogularis	corvo-marinho-de-socotra
Phalacrocorax featherstoni	corvo-marinho-de-pitt
Phalacrocorax punctatus	corvo-marinho-de-pintas
Phalacrocorax fuscescens	corvo-marinho-da-tasmânia
Phalacrocorax varius	corvo-marinho-alvinegro
Phalacrocorax sulcirostris	corvo-marinho-preto
Phalacrocorax fuscicollis	corvo-marinho-indiano
Phalacrocorax capensis	corvo-marinho-do-cabo
Phalacrocorax capillatus	corvo-marinho-japonês
Phalacrocorax lucidus	corvo-marinho-de-peito-branco
Phalacrocorax carbo	corvo-marinho-de-faces-brancas
Gulosus aristotelis	corvo-marinho-de-crista
Nannopterum harrisi	corvo-marinho-das-galápagos
Nannopterum brasilianum	corvo-marinho-americano
Nannopterum auritum	corvo-marinho-d'orelhas
Leucocarbo magellanicus	corvo-marinho-de-magalhães
Leucocarbo bougainvilliorum	corvo-marinho-do-guano
Leucocarbo ranfurlyi	corvo-marinho-das-bounty
Leucocarbo carunculatus	corvo-marinho-maori
Leucocarbo onslowi	corvo-marinho-das-chatham
Leucocarbo chalconotus	corvo-marinho-de-otago
Leucocarbo stewarti	corvo-marinho-da-ilha-stewart

Leucocarbo colensoi	corvo-marinho-das-auckland
Leucocarbo campbelli	corvo-marinho-das-campbell
Leucocarbo atriceps	corvo-marinho-imperial

Threskiornithidae Íbis e Colhereiros

As 30 espécies de íbis e as 6 espécies de colhereiros encontram-se reunidas nesta família. São aves de médio ou grande porte, com o pescoço e as patas longas. As íbis têm plumagem preta, branca ou castanha e o bico curvado; já os colhereiros têm a plumagem branca ou rosada e o bico espalmado. Frequentam águas pouco profundas e nidificam colonialmente, geralmente em árvores, mas por vezes em ilhas no meio de zonas húmidas ou, nalguns casos, em escarpas.

Espécies: 36

Distribuição: Cosmopolita excepto regiões polares

Threskiornis aethiopicus	íbis-sagrada
Threskiornis bernieri	íbis-malgaxe
Threskiornis solitarius	íbis-da-reunião
Threskiornis melanocephalus	íbis-de-cabeça-preta
Threskiornis molucca	íbis-branca-australiana
Threskiornis spinicollis	íbis-pescoço-de-palha
Pseudibis papillosa	íbis-de-nuca-vermelha
Pseudibis davisoni	íbis-d'ombros-brancos
Pseudibis gigantea	íbis-gigante
Geronticus eremita	íbis-eremita
Geronticus calvus	íbis-calva
Nipponia nippon	íbis-japonesa
Bostrychia olivacea	íbis-olivácea
Bostrychia bocagei	íbis-de-são-tomé
Bostrychia rara	íbis-malhada
Bostrychia hagedash	íbis-hadada
Bostrychia carunculata	íbis-carunculada
Theristicus caerulescens	íbis-cinzenta
Theristicus caudatus	íbis-de-pescoço-ruivo
Theristicus melanopis	íbis-de-faces-pretas
Theristicus branickii	íbis-andina
Cercibis oxycerca	íbis-rabilonga
Mesembrinibis cayennensis	Íbis-verde
Phimosus infuscatus	íbis-de-faces-nuas
Eudocimus albus	íbis-branca-americana
Eudocimus ruber	íbis-escarlate
Plegadis falcinellus	íbis-preta
Plegadis chihi	íbis-de-faces-brancas
Plegadis ridgwayi	íbis-da-puna
Lophotibis cristata	íbis-de-poupa
Platalea leucorodia	colhereiro-comum

Platalea minor	colhereiro-pequeno
Platalea alba	colhereiro-africano
Platalea regia	colhereiro-real
Platalea flavipes	colhereiro-de-bico-amarelo
Platalea ajaja	colhereiro-rosado

Ardeidae Garças, Garçotes e afins

Os ardeídeos, vulgarmente chamados garças, são aves que têm longas patas, um longo pescoço e um longo bico em forma de arpão. Têm um porte médio a grande, mas existe uma grande variabilidade entre espécies quanto ao tamanho. A maioria frequenta zonas com água, alimentando-se de diversos tipos de vertebrados ou invertebrados aquáticos. Muitas espécies são coloniais, associando-se a outros ardeídeos ou até a outros grupos de aves aquáticas.

Espécies: 74

Distribuição: Cosmopolita excepto regiões polares

Tigriornis leucolopha	garça-tigre-africana
Tigrisoma lineatum	garça-tigre-da-floresta
Tigrisoma mexicanum	garça-tigre-mexicana
Tigrisoma fasciatum	garça-tigre-escura
Cochlearius cochlearius	garça-de-bico-largo
Agamia agami	garça-agami
Zebrilus undulatus	garça-zebra
Botaurus stellaris	abetouro-comum
Botaurus poiciloptilus	abetouro-da-oceânia
Botaurus lentiginosus	abetouro-americano
Botaurus pinnatus	abetouro-ruivo
Botaurus involucris	garçote-de-dorso-listado
Botaurus exilis	garçote-pequeno
Botaurus flavicollis	garçote-preto
Botaurus cinnamomeus	garçote-canela
Botaurus eurhythmus	garçote-da-manchúria
Botaurus sturmii	garçote-anão
Botaurus minutus	garçote-comum
Botaurus sinensis	garçote-amarelo
Botaurus dubius	garçote-australiano
Botaurus novaezelandiae	garçote-maori
Nyctanassa violacea	goraz-coroado
Nyctanassa carcinocatactes	goraz-das-bermudas
Nycticorax nycticorax	goraz-comum
Nycticorax olsoni	goraz-de-ascensão
Nycticorax duboisi	goraz-da-reunião
Nycticorax mauritianus	goraz-das-maurícias
Nycticorax megacephalus	goraz-de-rodrigues
Nycticorax caledonicus	goraz-ruivo
Gorsachius melanolophus	garça-nocturna-malaia
Gorsachius goisagi	garça-nocturna-japonesa

Pilherodius pileatus	garça-de-barrete
Syrigma sibilatrix	garça-assobiadeira
Egretta caerulea	garça-azul-pequena
Egretta tricolor	garça-tricolor
Egretta rufescens	garça-ruiva
Egretta vinaceigula	garça-de-garganta-vermelha
Egretta ardesiaca	garça-preta
Egretta sacra	garça-sagrada
Egretta eulophotes	garça-chinesa
Egretta thula	garça-branca-americana
Egretta garzetta	garça-branca-pequena
Egretta gularis	garça-dos-recifes
Egretta picata	garça-malhada
Egretta novaehollandiae	garça-de-faces-brancas
Calherodius leuconotus	garça-nocturna-de-dorso-branco
Oroanassa magnifica	garça-nocturna-magnífica
Butorides atricapilla	garça-dos-mangais
Butorides striata	garça-de-dorso-verde
Butorides sundevalli	garça-das-galápagos
Butorides virescens	garça-verde
Zonerodius heliosylus	garça-tigre-da-papua
Ardeola rufiventris	papa-ratos-de-barriga-ruiva
Ardeola ralloides	papa-ratos-comum
Ardeola idae	papa-ratos-malgaxe
Ardeola grayii	papa-ratos-indiano
Ardeola bacchus	papa-ratos-chinês
Ardeola speciosa	papa-ratos-javanês
Ardea pacifica	garça-de-pescoço-branco
Ardea alba	garça-branca-grande
Ardea brachyrhyncha	garça-de-bico-amarelo
Ardea intermedia	garça-média
Ardea plumifera	garça-emplumada
Ardea ibis	garça-boieira-ocidental
Ardea coromanda	garça-boieira-oriental
Ardea cinerea	garça-real
Ardea herodias	garça-azul-grande
Ardea cocoi	garça-cocoi
Ardea purpurea	garça-vermelha
Ardea humbloti	garça-malgaxe
Ardea insignis	garça-de-barriga-branca
Ardea sumatrana	garça-de-bico-grande
Ardea melanocephala	garça-de-cabeça-preta
Ardea goliath	garça-gigante

Scopidae — Cabeça-de-martelo

O cabeça-de-martelo é uma ave aquática de tamanho médio, sendo também conhecido pelos nomes de ave-martelo ou pássaro-martelo. Habita zonas de águas pouco profundas e constrói um ninho de grande dimensão. Embora no passado estivesse classificado nos Ciconiiformes, actualmente está nos Pelecaniformes; os seus parentes mais próximos são o bico-de-sapato e os pelicanos.

Espécies: 1

Distribuição: África subsariana, Madagáscar e sul da Península Arábica

Scopus umbretta	cabeça-de-martelo

Balaenicipitidae Bico-de-sapato

O bico-de-sapato, que deve o nome ao seu enorme bico que faz lembrar um sapato, é uma grande ave pernalta do tamanho de uma cegonha. O seu nome genérico *Balaeniceps* significa 'cabeça-de-baleia'. É uma ave aquática que vive em zonas húmidas de água doce, especialmente em pauis com papiro e outros tipos de vegetação emergente. Alimenta-se de vertebrados aquáticos.

Espécies: 1

Distribuição: África central e oriental

Balaeniceps rex	bico-de-sapato

Pelecanidae Pelicanos

A característica mais conhecida e mais diferenciadora dos pelicanos é a enorme bolsa que têm na garganta que serve não só para capturar as presas, mas também para drenar a água antes de as engolir. Estas aves, de grande porte, encontram-se ligadas ao meio aquático e têm uma distribuição alargada, sendo mais frequentes em climas quentes. Habitam em águas costeiras e interiores e nidificam colonialmente.

Espécies: 8

Distribuição: Cosmopolita excepto regiões polares

Pelecanus onocrotalus	pelicano-branco
Pelecanus rufescens	pelicano-rosado
Pelecanus philippensis	pelicano-oriental
Pelecanus crispus	pelicano-crespo
Pelecanus conspicillatus	pelicano-australiano
Pelecanus erythrorhynchos	pelicano-americano
Pelecanus occidentalis	pelicano-pardo
Pelecanus thagus	pelicano-peruano

Opisthocomidae — Cigana

Um mistério taxonómico, esta ave é peculiar de muitas formas. Nidifica em árvores nas margens de lagos e outras águas paradas, onde se alimenta quase exclusivamente de folhas. Para as digerir, tem um papo muito desenvolvido contendo bactérias semelhantes às encontradas em mamíferos ruminantes. As crias, quando alarmadas, atiram-se à água, utilizando depois garras na articulação da asa para trepar de volta para o ninho.

Espécies: 1

Distribuição: metade norte da América do Sul

Opisthocomus hoazin	cigana

Cathartidae Urubus e Condores

Os abutres do Novo Mundo partilham o estilo de vida e adaptações, embora não a origem evolutiva, com os abutres que nos são mais familiares na família Accipitridae. São aves necrófagas de grande dimensão, que se deslocam em voo planado e que dependem de um apurado sentido de olfacto e visão para encontrar alimento. As duas espécies de condores encontram-se ameaçadas.

Espécies: 7

Distribuição: Américas

Gymnogyps californianus	condor-da-califórnia
Sarcoramphus papa	urubu-rei
Vultur gryphus	condor-dos-andes
Coragyps atratus	urubu-preto
Cathartes aura	urubu-de-cabeça-vermelha
Cathartes burrovianus	urubu-de-cabeça-amarela
Cathartes melambrotus	urubu-amazónico

Sagittariidae Secretário

O secretário é uma ave de rapina de aspecto singular: tem um corpo de águia e umas longas pernas que fazem lembrar as de um grou, ficando assim com o aspecto de uma "rapina pernalta". Esta espécie, que é o único membro da sua família, vive na savana africana e tem uma distribuição alargada, mas as suas populações encontram-se em declínio.

Espécies: 1

Distribuição: África subsariana

Sagittarius serpentarius	secretário

Pandionidae — Águias-pesqueiras

A águia-pesqueira é uma ave de rapina de características únicas. Distingue-se de todas as outras rapinas diurnas pelo dedo exterior reversível e pela presença de espinhos na face inferior dos pés, muito úteis para segurar os peixes de que se alimenta. Embora historicamente tenha sido considerada uma única espécie, algumas autoridades taxonómicas consideram actualmente duas espécies, atribuindo o estatuto de espécie à população australiana.

Espécies: 1

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Pandion haliaetus	águia-pesqueira

Accipitridae Águias, Milhafres e afins

Aqui se inclui a larga maioria das aves de rapina. Grande parte delas têm dimensão média a grande e são predadoras de outros vertebrados, utilizando os seus bicos em gancho e poderosas garras. À parte essas características, são extremamente variadas em forma, estilo de voo, preferência de habitat e grau de especialização da sua dieta. Os abutres do Velho Mundo, por exemplo, são parte desta família e exclusivamente necrófagos, enquanto o vespeiro-europeu se especializou em atacar ninhos de abelhas e vespas.

Espécies: 256

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Elanus caeruleus	peneireiro-cinzento
Elanus axillaris	peneireiro-d'ombro-preto
Elanus leucurus	peneireiro-de-cauda-branca
Elanus scriptus	peneireiro-d'asa-escrita
Gampsonyx swainsonii	peneireiro-pérola
Chelictinia riocourii	peneireiro-cauda-de-andorinha
Polyboroides typus	gimnogene-pequeno
Polyboroides radiatus	gimnogene-malgaxe
Gypohierax angolensis	abutre-das-palmeiras
Gypaetus barbatus	quebra-ossos
Neophron percnopterus	abutre-do-egipto
Eutriorchis astur	águia-serpentária-malgaxe
Leptodon cayanensis	milhafre-de-cabeça-cinzenta
Leptodon forbesi	milhafre-nordestino
Chondrohierax uncinatus	milhafre-bico-de-gancho
Chondrohierax wilsonii	milhafre-cubano
Pernis apivorus	vespeiro-europeu
Pernis ptilorhynchus	vespeiro-oriental
Pernis celebensis	vespeiro-de-celebes
Pernis steerei	vespeiro-filipino
Elanoides forficatus	gavião-tesoura
Lophoictinia isura	milhafre-de-cauda-quadrada
Hamirostra melanosternon	milhafre-de-peito-preto
Aviceda cuculoides	gavião-cuco-africano
Aviceda madagascariensis	gavião-cuco-malgaxe
Aviceda jerdoni	gavião-cuco-oriental
Aviceda subcristata	gavião-cuco-australiano
Aviceda leuphotes	gavião-cuco-preto
Henicopernis longicauda	vespeiro-rabilongo
Henicopernis infuscatus	vespeiro-preto

Necrosyrtes monachus	abutre-de-capuz
Gyps africanus	grifo-africano
Gyps bengalensis	grifo-bengalense
Gyps indicus	grifo-indiano
Gyps tenuirostris	grifo-de-bico-fino
Gyps rueppelli	grifo-de-rüppell
Gyps himalayensis	grifo-dos-himalaias
Gyps fulvus	grifo-eurasiático
Gyps coprotheres	grifo-do-cabo
Sarcogyps calvus	abutre-de-cabeça-vermelha
Trigonoceps occipitalis	abutre-de-cabeça-branca
Aegypius monachus	abutre-preto
Torgos tracheliotos	abutre-real
Spilornis cheela	águia-cobreira-de-crista
Spilornis klossi	águia-cobreira-de-nicobar
Spilornis kinabaluensis	águia-cobreira-montesa
Spilornis rufipectus	águia-cobreira-de-celebes
Spilornis holospilus	águia-cobreira-filipina
Spilornis elgini	águia-cobreira-das-andamão
Pithecophaga jefferyi	águia-filipina
Terathopius ecaudatus	águia-bailarina
Circaetus cinerascens	águia-cobreira-de-cauda-branca
Circaetus fasciolatus	águia-cobreira-barrada
Circaetus spectabilis	águia-cobreira-congolesa
Circaetus beaudouini	águia-cobreira-saheliana
Circaetus pectoralis	águia-cobreira-de-peito-preto
Circaetus gallicus	águia-cobreira-eurasiática
Circaetus cinereus	águia-cobreira-castanha
Macheiramphus alcinus	gavião-morcegueiro
Harpyopsis novaeguineae	águia-da-papua
Morphnus guianensis	águia-de-crista
Harpia harpyja	harpia
Stephanoaetus coronatus	águia-coroada
Nisaetus kelaarti	águia-gavião-cingalesa
Nisaetus nanus	águia-gavião-anã
Nisaetus nipalensis	águia-gavião-montesa
Nisaetus alboniger	águia-gavião-de-blyth
Nisaetus bartelsi	águia-gavião-javanesa
Nisaetus lanceolatus	águia-gavião-de-celebes
Nisaetus pinskeri	águia-gavião-de-pinsker
Nisaetus philippensis	águia-gavião-filipina
Nisaetus cirrhatus	águia-gavião-variável
Nisaetus floris	águia-gavião-das-flores
Spizaetus tyrannus	águia-gavião-preta
Spizaetus melanoleucus	águia-gavião-alvinegra

Spizaetus ornatus	águia-gavião-coroada
Spizaetus isidori	águia-gavião-bicolor
Lophotriorchis kienerii	águia-de-barriga-ruiva
Polemaetus bellicosus	águia-marcial
Lophaetus occipitalis	águia-de-penacho
Ictinaetus malaiensis	águia-malaia
Clanga hastata	águia-indiana
Clanga pomarina	águia-pomarina
Clanga clanga	águia-gritadeira
Hieraaetus wahlbergi	águia-de-wahlberg
Hieraaetus ayresii	águia-de-ayres
Hieraaetus pennatus	águia-calçada
Hieraaetus weiskei	águia-anã
Hieraaetus morphnoides	águia-pequena
Aquila nipalensis	águia-das-estepes
Aquila rapax	águia-fulva
Aquila adalberti	águia-imperial-ibérica
Aquila heliaca	águia-imperial-oriental
Aquila chrysaetos	águia-real
Aquila africana	águia-africana
Aquila audax	águia-audaz
Aquila gurneyi	águia-das-molucas
Aquila verreauxii	águia-preta
Aquila fasciata	águia-de-bonelli
Aquila spilogaster	águia-dominó
Harpagus bidentatus	gavião-bidentado-ruivo
Harpagus diodon	gavião-bidentado-cinzento
Kaupifalco monogrammicus	gavião-papa-lagartos
Micronisus gabar	gavião-palrador
Melierax metabates	açor-cantor-escuro
Melierax poliopterus	açor-cantor-somali
Melierax canorus	açor-cantor-pálido
Urotriorchis macrourus	gavião-rabilongo
Erythrotriorchis buergersi	açor-d'ombros-castanhos
Erythrotriorchis radiatus	açor-ruivo
Microspizias superciliosus	gavião-minúsculo
Microspizias collaris	gavião-de-coleira-interrompida
Lophospiza trivirgata	açor-de-crista
Lophospiza griseiceps	açor-de-celebes
Aerospiza toussenelii	açor-de-peito-ruivo
Aerospiza tachiro	açor-africano
Aerospiza castanilius	gavião-de-flancos-ruivos
Tachyspiza badia	gavião-chicra
Tachyspiza butleri	gavião-de-nicobar
Tachyspiza brevipes	gavião-do-levante

Tachyspiza soloensis	gavião-chinês
Tachyspiza francesiae	gavião-de-frances
Tachyspiza trinotata	gavião-de-cauda-pintada
Tachyspiza novaehollandiae	açor-cinzento
Tachyspiza hiogaster	açor-variável
Tachyspiza fasciata	açor-da-oceânia
Tachyspiza melanochlamys	açor-de-dorso-preto
Tachyspiza albogularis	açor-bicolor
Tachyspiza haplochroa	açor-da-nova-caledónia
Tachyspiza rufitorques	açor-das-fiji
Tachyspiza henicogramma	açor-das-molucas
Tachyspiza luteoschistacea	açor-de-manto-ardósia
Tachyspiza imitator	açor-imitador
Tachyspiza poliocephala	açor-de-cabeça-cinzenta
Tachyspiza princeps	açor-da-nova-bretanha
Tachyspiza erythropus	gavião-de-patas-vermelhas
Tachyspiza minulla	gavião-pequeno
Tachyspiza gularis	gavião-japonês
Tachyspiza virgata	gavião-besra
Tachyspiza nanus	gavião-anão
Tachyspiza erythrauchen	gavião-das-molucas
Tachyspiza cirrocephala	gavião-de-colar
Tachyspiza brachyura	gavião-da-nova-bretanha
Tachyspiza rhodogaster	gavião-de-peito-ruivo
Accipiter madagascariensis	gavião-malgaxe
Accipiter ovampensis	gavião-do-ovambo
Accipiter nisus	gavião-europeu
Accipiter rufiventris	gavião-ruivo
Accipiter poliogaster	açor-de-barriga-cinzenta
Accipiter striatus	gavião-estriado
Accipiter chionogaster	gavião-de-peito-branco
Accipiter ventralis	gavião-andino
Accipiter erythronemius	gavião-de-coxas-ruivas
Astur cooperii	gavião-de-cooper
Astur gundlachi	gavião-cubano
Astur bicolor	gavião-bicolor
Astur chilensis	gavião-chileno
Astur melanoleucus	açor-preto
Astur henstii	açor-malgaxe
Astur gentilis	açor-eurasiático
Astur atricapillus	açor-americano
Astur meyerianus	açor-de-meyer
Megatriorchis doriae	açor-de-doria
Circus aeruginosus	tartaranhão-dos-pauis
Circus spilonotus	tartaranhão-oriental

Circus spilothorax	tartaranhão-da-papua
Circus approximans	tartaranhão-da-oceânia
Circus ranivorus	tartaranhão-africano
Circus maillardi	tartaranhão-da-reunião
Circus macrosceles	tartaranhão-malgaxe
Circus buffoni	tartaranhão-d'asa-longa
Circus assimilis	tartaranhão-malhado
Circus maurus	tartaranhão-preto
Circus cyaneus	tartaranhão-azulado
Circus hudsonius	tartaranhão-americano
Circus cinereus	tartaranhão-andino
Circus macrourus	tartaranhão-pálido
Circus melanoleucos	tartaranhão-alvinegro
Circus pygargus	tartaranhão-caçador
Milvus milvus	milhafre-real
Milvus migrans	milhafre-preto
Haliastur sphenurus	milhafre-assobiador
Haliastur indus	milhafre-brâmane
Haliaeetus pelagicus	pigargo-gigante
Haliaeetus leucoryphus	pigargo-de-pallas
Haliaeetus albicilla	pigargo-europeu
Haliaeetus leucocephalus	pigargo-americano
Icthyophaga leucogaster	pigargo-de-barriga-branca
Icthyophaga sanfordi	pigargo-das-salomão
Icthyophaga vocifer	pigargo-africano
Icthyophaga vociferoides	pigargo-malgaxe
Icthyophaga humilis	pigargo-pequeno
Icthyophaga ichthyaetus	pigargo-de-cabeça-cinzenta
Butastur rufipennis	bútio-dos-gafanhotos
Butastur teesa	bútio-d'olho-branco
Butastur liventer	bútio-d'asa-ruiva
Butastur indicus	bútio-de-faces-cinzentas
Ictinia mississippiensis	milhafre-do-mississípi
Ictinia plumbea	milhafre-cinzento
Busarellus nigricollis	bútio-de-colar
Rostrhamus sociabilis	caracoleiro-comum
Helicolestes hamatus	caracoleiro-do-igapó
Geranospiza caerulescens	bútio-pernilongo
Cryptoleucopteryx plumbea	bútio-plúmbeo
Buteogallus schistaceus	bútio-ardósia
Buteogallus anthracinus	bútio-preto-pequeno
Buteogallus gundlachii	bútio-cubano
Buteogallus aequinoctialis	bútio-caranguejeiro
Buteogallus meridionalis	bútio-da-savana
Buteogallus lacernulatus	bútio-de-pescoço-branco

Buteogallus urubitinga	bútio-preto-grande
Buteogallus solitarius	bútio-solitário
Buteogallus coronatus	bútio-do-chaco
Morphnarchus princeps	bútio-barrado
Rupornis magnirostris	bútio-dos-caminhos
Parabuteo unicinctus	bútio-de-harris
Parabuteo leucorrhous	bútio-d'uropígio-branco
Geranoaetus albicaudatus	bútio-de-cauda-branca
Geranoaetus polyosoma	bútio-variável
Geranoaetus melanoleucus	bútio-de-peito-preto
Pseudastur polionotus	bútio-pombo
Pseudastur albicollis	bútio-branco
Pseudastur occidentalis	bútio-de-dorso-cinzento
Leucopternis semiplumbeus	bútio-semiplúmbeo
Leucopternis melanops	bútio-de-mascarilha
Leucopternis kuhli	bútio-de-sobrancelha
Bermuteo avivorus	bútio-das-bermudas
Buteo plagiatus	bútio-cinzento
Buteo nitidus	bútio-de-listas-cinzentas
Buteo lineatus	bútio-d'ombros-ruivos
Buteo ridgwayi	bútio-dominicano
Buteo platypterus	bútio-d'asa-larga
Buteo albigula	bútio-de-garganta-branca
Buteo brachyurus	bútio-de-cauda-curta
Buteo solitarius	bútio-havaiano
Buteo swainsoni	bútio-de-swainson
Buteo galapagoensis	bútio-das-galápagos
Buteo albonotatus	bútio-de-cauda-barrada
Buteo jamaicensis	bútio-de-cauda-vermelha
Buteo ventralis	bútio-patagónico
Buteo regalis	bútio-ferruginoso
Buteo lagopus	bútio-calçado
Buteo hemilasius	bútio-mongol
Buteo japonicus	bútio-oriental
Buteo burmanicus	bútio-dos-himalaias
Buteo rufinus	bútio-mouro
Buteo bannermani	bútio-de-cabo-verde
Buteo socotraensis	bútio-de-socotra
Buteo buteo	bútio-d'asa-redonda
Buteo trizonatus	bútio-da-floresta
Buteo oreophilus	bútio-montês
Buteo archeri	bútio-somali
Buteo auguralis	bútio-de-pescoço-vermelho
Buteo brachypterus	bútio-malgaxe
Buteo augur	bútio-áugure

Buteo rufofuscus	bútio-chacal

Tytonidae — Corujas-das-torres e afins

A família Tytonidae é a mais pequena das duas famílias de rapinas nocturnas e reúne as chamadas corujas-das-torres. Estas são aves de tamanho médio, com uma cabeça grande e um disco facial em forma de coração, que recolhe ondas de som. As suas penas permitem-lhe ter um voo muito silencioso. Cerca de metade das espécies tem áreas de distribuição muito reduzidas, ocorrendo apenas em certas ilhas tropicais, e são relativamente mal conhecidas.

Espécies: 20

Distribuição: Quase cosmopolita, faltando na Antárctida e em grande parte da Ásia

Tyto tenebricosa	coruja-fuliginosa-grande
Tyto multipunctata	coruja-fuliginosa-pequena
Tyto inexspectata	coruja-de-minahassa
Tyto nigrobrunnea	coruja-de-taliabu
Tyto sororcula	coruja-das-tanimbar
Tyto manusi	coruja-de-manus
Tyto aurantia	coruja-dourada
Tyto novaehollandiae	coruja-da-oceânia
Tyto rosenbergii	coruja-de-celebes
Tyto soumagnei	coruja-malgaxe
Tyto alba	coruja-das-torres-ocidental
Tyto furcata	coruja-da-igreja
Tyto javanica	coruja-das-torres-oriental
Tyto deroepstorffi	coruja-das-andamão
Tyto glaucops	coruja-de-face-cinza
Tyto capensis	coruja-do-cabo
Tyto longimembris	coruja-do-capim
Tyto prigoginei	coruja-congolesa
Phodilus badius	coruja-baia-oriental
Phodilus assimilis	coruja-baia-cingalesa

Strigidae Mochos, Corujas e Bufos

Esta família inclui as chamadas corujas verdadeiras, reunindo quase todas as rapinas nocturnas (mochos, corujas e bufos), excepto as corujas-das-torres e espécies próximas destas. Têm um tamanho muito variável, desde o enorme bufo-real até ao minúsculo mocho-duende, que não é maior que um pardal. Apresentam uma cabeça grande, um disco facial redondo e uma plumagem críptica. Localizam as suas presas principalmente através da audição, graças aos seus ouvidos assimétricos.

Espécies: 238

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Uroglaux dimorpha	coruja-açor-da-papua
Ninox albifacies	coruja-gavião-risonha
Ninox rufa	coruja-gavião-ruiva
Ninox strenua	coruja-gavião-poderosa
Ninox connivens	coruja-gavião-ladradora
Ninox rudolfi	coruja-gavião-de-sumba
Ninox boobook	coruja-gavião-australiana
Ninox rotiensis	coruja-gavião-de-rote
Ninox fusca	coruja-gavião-timorense
Ninox plesseni	coruja-gavião-de-alor
Ninox leucopsis	coruja-gavião-da-tasmânia
Ninox novaeseelandiae	coruja-gavião-maori
Ninox japonica	coruja-gavião-japonesa
Ninox scutulata	coruja-gavião-castanha
Ninox obscura	coruja-gavião-escura
Ninox randi	coruja-gavião-chocolate
Ninox affinis	coruja-gavião-das-andamão
Ninox philippensis	coruja-gavião-de-lução
Ninox spilocephala	coruja-gavião-de-mindanau
Ninox leventisi	coruja-gavião-de-camiguin
Ninox reyi	coruja-gavião-das-sulu
Ninox rumseyi	coruja-gavião-de-cebu
Ninox spilonotus	coruja-gavião-de-romblon
Ninox mindorensis	coruja-gavião-de-mindoro
Ninox sumbaensis	coruja-gavião-pequena
Ninox burhani	coruja-gavião-das-togian
Ninox ochracea	coruja-gavião-de-celebes
Ninox ios	coruja-gavião-vermelha
Ninox hypogramma	coruja-gavião-de-halmaera
Ninox hantu	coruja-gavião-de-buru
Ninox squamipila	coruja-gavião-de-ceram
Ninox forbesi	coruja-gavião-das-tanimbar
Ninox natalis	coruja-gavião-da-ilha-de-natal

Ninox meeki	coruja-gavião-de-manus
Ninox theomacha	coruja-gavião-da-papua
Ninox punctulata	coruja-gavião-salpicada
Ninox odiosa	coruja-gavião-da-nova-bretanha
Ninox variegata	coruja-gavião-das-bismarck
Margarobyas lawrencii	mocho-cubano
Taenioptynx brodiei	mocho-pigmeu-de-colar
Taenioptynx sylvaticus	mocho-pigmeu-das-sundas
Micrathene whitneyi	mocho-duende
Xenoglaux loweryi	mocho-de-bigodes
Aegolius funereus	mocho-funéreo
Aegolius acadicus	mocho-serrador-nortenho
Aegolius gradyi	mocho-serrador-das-bermudas
Aegolius ridgwayi	mocho-pardo
Aegolius harrisii	mocho-canela
Athene cunicularia	mocho-buraqueiro
Athene brama	mocho-brâmane
Athene noctua	mocho-galego
Athene superciliaris	mocho-de-sobrancelhas
Athene blewitti	mocho-da-floresta
Athene jacquinoti	mocho-das-salomão-ocidentais
Athene granti	mocho-de-guadalcanal
Athene malaitae	mocho-de-malaita
Athene roseoaxillaris	mocho-de-makira
Surnia ulula	mocho-gavião
Glaucidium passerinum	mocho-pigmeu-eurasiático
Glaucidium perlatum	mocho-pigmeu-perlado
Glaucidium tephronotum	mocho-pigmeu-de-peito-ruivo
Glaucidium sjostedti	mocho-pigmeu-de-dorso-ruivo
Glaucidium cuculoides	mocho-pigmeu-listado
Glaucidium castanopterum	mocho-pigmeu-javanês
Glaucidium radiatum	mocho-pigmeu-da-selva
Glaucidium castanotum	mocho-pigmeu-cingalês
Glaucidium capense	mocho-pigmeu-barrado
Glaucidium albertinum	mocho-pigmeu-albertino
Glaucidium californicum	mocho-pigmeu-americano
Glaucidium gnoma	mocho-pigmeu-serrano
Glaucidium hoskinsii	mocho-pigmeu-da-baixa-califórnia
Glaucidium cobanense	mocho-pigmeu-guatemalteco
Glaucidium costaricanum	mocho-pigmeu-costa-riquenho
Glaucidium nubicola	mocho-pigmeu-do-chocó
Glaucidium jardinii	mocho-pigmeu-andino
Glaucidium bolivianum	mocho-pigmeu-dos-yungas
Glaucidium palmarum	mocho-pigmeu-de-colima
Glaucidium sanchezi	mocho-pigmeu-de-tamaulipas
Glaucidium griseiceps	mocho-pigmeu-centro-americano
Glaucidium parkeri	mocho-pigmeu-subtropical
Glaucidium hardyi	mocho-pigmeu-amazónico

Glaucidium minutissimum	mocho-pigmeu-mínimo
Glaucidium mooreorum	mocho-pigmeu-pernambucano
Glaucidium brasilianum	mocho-pigmeu-ferruginoso
Glaucidium peruanum	mocho-pigmeu-peruano
Glaucidium nana	mocho-pigmeu-austral
Glaucidium siju	mocho-pigmeu-cubano
Otus gurneyi	mocho-d'orelhas-gigante
Otus sagittatus	mocho-d'orelhas-de-testa-branca
Otus rufescens	mocho-d'orelhas-vermelho
Otus thilohoffmanni	mocho-d'orelhas-cingalês
Otus icterorhynchus	mocho-d'orelhas-de-bico-amarelo
Otus ireneae	mocho-d'orelhas-de-sokoke
Otus balli	mocho-d'orelhas-das-andamão
Otus alfredi	mocho-d'orelhas-das-flores
Otus spilocephalus	mocho-d'orelhas-montês
Otus angelinae	mocho-d'orelhas-javanês
Otus mirus	mocho-d'orelhas-de-mindanau
Otus longicornis	mocho-d'orelhas-de-lução
Otus mindorensis	mocho-d'orelhas-de-mindoro
Otus hartlaubi	mocho-d'orelhas-de-são-tomé
Otus madagascariensis	mocho-d'orelhas-de-torotoroka
Otus rutilus	mocho-d'orelhas-malgaxe
Otus mayottensis	mocho-d'orelhas-de-maiote
Otus pauliani	mocho-d'orelhas-das-comores
Otus capnodes	mocho-d'orelhas-de-anjouan
Otus moheliensis	mocho-d'orelhas-de-mohéli
Otus grucheti	mocho-d'orelhas-da-reunião
Otus sauzieri	mocho-d'orelhas-das-maurícias
Otus murivorus	mocho-d'orelhas-de-rodrigues
Otus pembaensis	mocho-d'orelhas-de-pemba
Otus scops	mocho-d'orelhas-europeu
Otus cyprius	mocho-d'orelhas-cipriota
Otus bikegila	mocho-d’orelhas-do-príncipe
Otus brucei	mocho-d'orelhas-pálido
Otus pamelae	mocho-d'orelhas-árabe
Otus senegalensis	mocho-d'orelhas-africano
Otus feae	mocho-d'orelhas-de-ano-bom
Otus socotranus	mocho-d'orelhas-de-socotra
Otus sunia	mocho-d'orelhas-oriental
Otus elegans	mocho-d'orelhas-elegante
Otus magicus	mocho-d'orelhas-das-molucas
Otus tempestatis	mocho-d'orelhas-de-wetar
Otus sulaensis	mocho-d'orelhas-das-sula
Otus beccarii	mocho-d'orelhas-de-biak
Otus manadensis	mocho-d'orelhas-de-celebes
Otus mendeni	mocho-d'orelhas-das-banggai
Otus siaoensis	mocho-d'orelhas-de-siau
Otus collari	mocho-d'orelhas-de-sangihe

Otus mantananensis	mocho-d'orelhas-de-mantanani
Otus insularis	mocho-d'orelhas-das-seicheles
Otus alius	mocho-d'orelhas-de-nicobar
Otus umbra	mocho-d'orelhas-de-simeulue
Otus enganensis	mocho-d'orelhas-de-engano
Otus mentawi	mocho-d'orelhas-das-mentawai
Otus brookii	mocho-d'orelhas-real
Otus bakkamoena	mocho-d'orelhas-indiano
Otus lettia	mocho-d'orelhas-de-colar
Otus semitorques	mocho-d'orelhas-japonês
Otus lempiji	mocho-d'orelhas-das-sundas
Otus megalotis	mocho-d'orelhas-filipino
Otus nigrorum	mocho-d'orelhas-de-negros
Otus everetti	mocho-d'orelhas-de-everett
Otus fuliginosus	mocho-d'orelhas-de-palawan
Otus silvicola	mocho-d'orelhas-de-wallace
Otus jolandae	mocho-d'orelhas-de-lombok
Otus podarginus	mocho-d’orelhas-de-palau
Ptilopsis leucotis	mocho-de-faces-brancas-setentrional
Ptilopsis granti	mocho-de-faces-brancas-meridional
Asio grammicus	coruja-jamaicana
Asio clamator	bufo-gritador
Asio otus	bufo-pequeno
Asio abyssinicus	bufo-abissínio
Asio madagascariensis	bufo-malgaxe
Asio stygius	bufo-sombrio
Asio flammeus	coruja-do-nabal
Asio capensis	coruja-dos-pântanos
Asio solomonensis	bufo-das-salomão
Jubula lettii	mocho-de-crina
Bubo scandiacus	bufo-das-neves
Bubo virginianus	bufo-americano
Bubo nigrescens	bufo-colombiano
Bubo nacurutu	bufo-tropical
Bubo magellanicus	bufo-andino
Bubo bubo	bufo-real
Bubo bengalensis	bufo-indiano
Bubo ascalaphus	bufo-do-deserto
Bubo capensis	bufo-do-cabo
Bubo milesi	bufo-árabe
Bubo cinerascens	bufo-cinzento
Bubo africanus	bufo-africano
Bubo vosseleri	bufo-das-usambara
Ketupa poensis	bufo-da-guiné
Ketupa leucosticta	bufo-de-cabinda
Ketupa lactea	bufo-leitoso
Ketupa shelleyi	bufo-barrado
Ketupa blakistoni	bufo-pescador-da-manchúria

Ketupa zeylonensis	bufo-pescador-castanho
Ketupa flavipes	bufo-pescador-fulvo
Ketupa ketupu	bufo-pescador-malaio
Ketupa sumatrana	bufo-malaio
Ketupa nipalensis	bufo-nepalês
Ketupa coromanda	bufo-fuliginoso
Ketupa philippensis	bufo-filipino
Scotopelia peli	corujão-pesqueiro-de-pel
Scotopelia ussheri	corujão-pesqueiro-ruivo
Scotopelia bouvieri	corujão-pesqueiro-vermiculado
Psiloscops flammeolus	mocho-flamejado
Gymnasio nudipes	corujinha-porto-riquenha
Megascops trichopsis	corujinha-bigoduda
Megascops clarkii	corujinha-serrana
Megascops albogularis	corujinha-de-garganta-branca
Megascops choliba	corujinha-sul-americano
Megascops barbarus	corujinha-barbuda
Megascops cooperi	corujinha-do-pacífico
Megascops kennicottii	corujinha-da-califórnia
Megascops asio	corujinha-norte-americana
Megascops seductus	corujinha-do-balsas
Megascops guatemalae	corujinha-guatemalteca
Megascops koepckeae	corujinha-de-koepcke
Megascops ingens	corujinha-arruivada
Megascops petersoni	corujinha-canela
Megascops marshalli	corujinha-de-marshall
Megascops hoyi	corujinha-dos-yungas
Megascops centralis	corujinha-do-chocó
Megascops roraimae	corujinha-das-colinas
Megascops sanctaecatarinae	corujinha-catarinense
Megascops gilesi	corujinha-de-santa-marta
Megascops roboratus	corujinha-de-tumbes
Megascops watsonii	corujinha-amazónica
Megascops atricapilla	corujinha-de-barrete
Pulsatrix perspicillata	coruja-d'óculos
Pulsatrix koeniswaldiana	coruja-de-sobrancelhas-amarelas
Pulsatrix melanota	coruja-de-sobrancelhas-andina
Lophostrix cristata	coruja-de-crista
Strix seloputo	coruja-malhada
Strix ocellata	coruja-ocelada
Strix leptogrammica	coruja-castanha
Strix aluco	coruja-do-mato
Strix mauritanica	coruja-magrebina
Strix nivicolum	coruja-dos-himalaias
Strix hadorami	coruja-do-deserto
Strix butleri	coruja-de-omã
Strix occidentalis	coruja-pintalgada
Strix varia	coruja-barrada

Strix sartorii	coruja-mexicana
Strix fulvescens	coruja-fulva
Strix hylophila	coruja-de-barras-ruivas
Strix chacoensis	coruja-do-chaco
Strix rufipes	coruja-de-patas-vermelhas
Strix uralensis	coruja-dos-urais
Strix davidi	coruja-do-sujuão
Strix nebulosa	coruja-da-lapónia
Strix woodfordii	coruja-da-floresta
Strix virgata	coruja-listada
Strix nigrolineata	coruja-alvinegra
Strix huhula	coruja-preta
Strix albitarsis	coruja-de-pés-brancos

Coliidae Rabos-de-junco

Endémicos do continente africano, os rabos-de-junco são aves com um corpo relativamente pequeno e uma cauda muito longa. Frequentam savanas e bosques pouco densos. São muito acrobáticos e muitas vezes alimentam-se de barriga para cima ou, simplesmente, penduram-se em ramos, a descansar. Conseguem até pendurar-se com uma pata, usando a outra para se alimentarem. Também conseguem rastejar pelos ramos, como se fossem ratinhos.

Espécies: 6

Distribuição: África subsariana

Colius striatus	rabo-de-junco-estriado
Colius leucocephalus	rabo-de-junco-de-cabeça-branca
Colius castanotus	rabo-de-junco-de-dorso-vermelho
Colius colius	rabo-de-junco-de-dorso-branco
Urocolius macrourus	rabo-de-junco-de-nuca-azul
Urocolius indicus	rabo-de-junco-de-faces-vermelhas

Leptosomidae Rolieiro-cuco

Esta família tem um único membro: o rolieiro-cuco. Esta espécie, endémica de ilhas do Oceano Índico, frequenta diversos tipos de espaços arborizados, nidificando em cavidades de árvores. A sua alimentação é composta por invertebrados. Não se encontra ameaçada e parece adaptar-se bem às alterações de habitat. Além disso, em Madagáscar o rolieiro-cuco não é perseguido, havendo alguns mitos e crenças que dizem ser esta uma ave de bom presságio.

Espécies: 1

Distribuição: Madagáscar e Ilhas Comores

Leptosomus discolor	rolieiro-cuco

Trogonidae Trogons, Quetzais e Republicanos

Os trogons e republicanos são aves de média dimensão e cauda comprida, características das florestas tropicais de várias partes do mundo. São generalistas no que toca à alimentação. Apesar da sua plumagem vistosa, normalmente pousam imóveis a coberto da vegetação, o que dificulta a sua detecção. O quetzal-resplandecente, uma ave importante na mitologia dos povos da América Central e ave nacional da Guatemala, é parte desta família.

Espécies: 47

Distribuição: pantropical

Apaloderma narina	republicano-comum
Apaloderma aequatoriale	republicano-de-faces-amarelas
Apaloderma vittatum	republicano-de-cauda-barrada
Apalharpactes reinwardtii	republicano-javanês
Apalharpactes mackloti	republicano-de-samatra
Harpactes fasciatus	republicano-malabar
Harpactes kasumba	republicano-de-nuca-vermelha
Harpactes diardii	republicano-de-diard
Harpactes ardens	republicano-filipino
Harpactes whiteheadi	republicano-montês
Harpactes orrhophaeus	republicano-canela
Harpactes duvaucelii	republicano-escarlate
Harpactes oreskios	republicano-de-barriga-laranja
Harpactes erythrocephalus	republicano-de-cabeça-vermelha
Harpactes wardi	republicano-de-ward
Euptilotis neoxenus	quetzal-d'orelhas
Pharomachrus pavoninus	quetzal-pavão
Pharomachrus auriceps	quetzal-de-cabeça-dourada
Pharomachrus mocinno	quetzal-resplandecente
Pharomachrus fulgidus	quetzal-de-pontas-brancas
Pharomachrus antisianus	quetzal-de-crista
Priotelus temnurus	trogom-cubano
Priotelus roseigaster	trogom-dominicano
Trogon clathratus	trogom-costa-riquenho
Trogon massena	trogom-de-cauda-lisa
Trogon comptus	trogom-de-cauda-azul
Trogon mesurus	trogom-equatoriano
Trogon melanurus	trogom-de-cauda-preta
Trogon melanocephalus	trogom-de-cabeça-preta
Trogon citreolus	trogom-citrino
Trogon chionurus	trogom-de-cauda-branca
Trogon bairdii	trogom-de-baird

Trogon viridis	trogom-de-dorso-verde
Trogon caligatus	trogom-violeta
Trogon ramonianus	trogom-amazónico
Trogon violaceus	trogom-guianense
Trogon curucui	trogom-de-coroa-azul
Trogon surrucura	trogom-variado
Trogon tenellus	trogom-dourado-nortenho
Trogon cupreicauda	trogom-dourado-ocidental
Trogon rufus	trogom-dourado-amazónico
Trogon chrysochloros	trogom-dourado-atlântico
Trogon ambiguus	trogom-de-cauda-acobreada
Trogon elegans	trogom-elegante
Trogon mexicanus	trogom-mexicano
Trogon collaris	trogom-de-colar
Trogon personatus	trogom-mascarado

Upupidae Poupas

As poupas são aves coloridas, fáceis de reconhecer devido à combinação de cores da sua plumagem e ao tufo de penas (‘poupa’) que apresentam no alto da cabeça. Alimentam-se sobretudo de invertebrados e nidificam em cavidades. Durante a época dos ninhos, a glândula uropigial da fêmea e das crias permite expelir um líquido de cheiro fétido, que serve para se defenderem de predadores.

Espécies: 3

Distribuição: Europa, África e Ásia

Upupa epops	poupa-comum
Upupa marginata	poupa-malgaxe
Upupa antaios	poupa-gigante

Phoeniculidae Zombeteiros

Os zombeteiros são aparentados às poupas e esse facto está reflectido no seu nome inglês 'wood hoopoes'. São aves de médio porte, com plumagem escura e brilhante, que vivem nas florestas e nas savanas africanas. Têm patas curtas e caudas longas, que usam para se agarrarem aos troncos das árvores, como os pica-paus. Usam o longo bico para perscrutarem as fendas nas cascas das árvores, em busca dos invertebrados de que se alimentam.

Espécies: 9

Distribuição: África subsariana

Phoeniculus castaneiceps	zombeteiro-de-cabeça-castanha
Phoeniculus bollei	zombeteiro-de-cabeça-branca
Phoeniculus purpureus	zombeteiro-de-bico-vermelho
Phoeniculus somaliensis	zombeteiro-de-bico-preto
Phoeniculus damarensis	zombeteiro-da-damaralândia
Phoeniculus granti	zombeteiro-de-grant
Rhinopomastus aterrimus	zombeteiro-preto
Rhinopomastus cyanomelas	bico-de-cimitarra
Rhinopomastus minor	zombeteiro-pequeno

Bucerotidae — Calaus típicos

Os calaus são aves arborícolas (com excepção dos calaus-terrestres) de dimensão média a grande, com um bico espesso, longo e curvo, que faz lembrar o dos tucanos e que, nalgumas espécies, tem um casquete na mandíbula superior. São aves arborícolas, que se alimentam de fruta e também de pequenos animais. Nidificam em cavidades, onde a fêmea se sela e permanece durante meses, desde a postura até as crias conseguirem voar, sendo alimentada pelo macho através de uma pequena abertura.

Espécies: 64

Distribuição: África subsariana, sul da Ásia e Melanésia

Bucorvus abyssinicus	calau-terrestre-abissínio
Bucorvus leadbeateri	calau-terrestre-meridional
Tockus ruahae	calau-de-ruaha
Tockus kempi	calau-ocidental
Tockus damarensis	calau-da-damaralândia
Tockus rufirostris	calau-meridional
Tockus erythrorhynchus	calau-de-bico-vermelho
Tockus monteiri	calau-de-monteiro
Tockus deckeni	calau-de-von-der-decken
Tockus jacksoni	calau-de-jackson
Tockus leucomelas	calau-de-bico-amarelo-meridional
Tockus flavirostris	calau-de-bico-amarelo-oriental
Lophoceros bradfieldi	calau-de-bradfield
Lophoceros alboterminatus	calau-coroado-africano
Lophoceros semifasciatus	calau-preto-ocidental
Lophoceros fasciatus	calau-preto-congolês
Lophoceros hemprichii	calau-de-hemprich
Lophoceros nasutus	calau-cinzento
Lophoceros camurus	calau-pigmeu
Lophoceros pallidirostris	calau-de-bico-pálido
Bycanistes fistulator	calau-assobiador
Bycanistes bucinator	calau-trombeteiro
Bycanistes cylindricus	calau-de-faces-castanhas
Bycanistes albotibialis	calau-de-calças-brancas
Bycanistes subcylindricus	calau-de-faces-cinzentas
Bycanistes brevis	calau-de-faces-prateadas
Ceratogymna atrata	calau-de-casquete-preto
Ceratogymna elata	calau-de-casquete-amarelo
Horizocerus hartlaubi	calau-de-hartlaub
Horizocerus granti	calau-de-grant

Horizocerus albocristatus	calau-de-touca-branca
Horizocerus cassini	calau-de-cassin
Berenicornis comatus	calau-de-pescoço-branco
Buceros rhinoceros	calau-rinoceronte
Buceros bicornis	calau-malhado-grande
Buceros hydrocorax	calau-ruivo
Rhinoplax vigil	calau-de-elmo
Anthracoceros marchei	calau-de-palawan
Anthracoceros albirostris	calau-de-faces-brancas
Anthracoceros coronatus	calau-coroado-indiano
Anthracoceros montani	calau-das-sulu
Anthracoceros malayanus	calau-malaio
Ocyceros griseus	calau-malabar
Ocyceros gingalensis	calau-cingalês
Ocyceros birostris	calau-indiano
Anorrhinus tickelli	calau-ferrugíneo
Anorrhinus austeni	calau-castanho
Anorrhinus galeritus	calau-de-crista
Aceros nipalensis	calau-nepalês
Rhyticeros plicatus	calau-da-papua
Rhyticeros narcondami	calau-de-narcondam
Rhyticeros undulatus	calau-vincado
Rhyticeros everetti	calau-de-sumba
Rhyticeros subruficollis	calau-de-garganta-lisa
Rhyticeros cassidix	calau-grande-de-celebes
Rhabdotorrhinus waldeni	calau-de-panay
Rhabdotorrhinus leucocephalus	calau-de-mindanau
Rhabdotorrhinus exarhatus	calau-pequeno-de-celebes
Rhabdotorrhinus corrugatus	calau-rugoso
Penelopides manillae	calau-pequeno-das-filipinas
Penelopides mindorensis	calau-pequeno-de-mindoro
Penelopides affinis	calau-pequeno-de-mindanau
Penelopides samarensis	calau-pequeno-de-samar
Penelopides panini	calau-pequeno-de-panay

Coraciidae Rolieiros

Os rolieiros são aves de tamanho médio, assemelham-se a corvídeos na estrutura, aliás o nome genérico *Coracias* deriva do grego *korax* e deverá referir-se a um tipo de corvídeo. Apresentam plumagens com cores vivas, onde predominam os azuis intensos, os castanhos e os rosados. Todas as espécies nidificam em cavidades. O nome comum rolieiro está relacionado com o facto de algumas destas espécies fazerem acrobacias aéreas.

Espécies: 13

Distribuição: Europa, África, Ásia e Oceania

Coracias naevius	rolieiro-de-sobrancelhas-brancas
Coracias benghalensis	rolieiro-indiano
Coracias affinis	rolieiro-indochinês
Coracias temminckii	rolieiro-d'asa-púrpura
Coracias spatulatus	rolieiro-de-raquetes
Coracias caudatus	rolieiro-de-peito-lilás
Coracias abyssinicus	rolieiro-abissínio
Coracias garrulus	rolieiro-europeu
Coracias cyanogaster	rolieiro-de-barriga-azul
Eurystomus gularis	rolieiro-de-garganta-azul
Eurystomus glaucurus	rolieiro-de-bico-amarelo
Eurystomus orientalis	rolieiro-oriental
Eurystomus azureus	rolieiro-das-molucas

Brachypteraciidae — Rolieiros-terrestres

Esta família endémica de Madagáscar compreende cinco espécies. São aves não migradoras, do tamanho de corvídeos e aparentadas aos rolieiros, pertencendo, tal como estes, à ordem Coraciiformes. São na sua maioria aves florestais, que se alimentam de invertebrados e de pequenos répteis. Quatro das cinco espécies encontram-se ameaçadas, devido à sua distribuição restrita e à destruição de habitat.

Espécies: 5

Distribuição: Madagáscar

Brachypteracias leptosomus	rolieiro-terrestre-de-patas-curtas
Geobiastes squamiger	rolieiro-terrestre-escamoso
Atelornis pittoides	rolieiro-terrestre-de-cabeça-azul
Atelornis crossleyi	rolieiro-terrestre-de-cabeça-ruiva
Uratelornis chimaera	rolieiro-terrestre-rabilongo

Alcedinidae Guarda-rios e Cucaburras

A maioria dos guarda-rios, como o nome indica, podem ser encontrados a "patrulhar" zonas húmidas e cursos de água pelo mundo fora, em busca de peixe, que é capturado em mergulho, com o seu grande bico em forma de lança. No entanto, várias espécies de guarda-rios e os cucaburras da Austrália são na verdade aves inteiramente terrestres, de ambientes florestais, onde usam o seu bico para capturar presas animais. As aves desta família nidificam em cavidades nas árvores ou buracos no solo.

Espécies: 117

Distribuição: Cosmopolita, excepto Antárctida e parte das regiões boreais

Actenoides monachus	guarda-rios-monge
Actenoides princeps	guarda-rios-escamado
Actenoides bougainvillei	guarda-rios-de-bigodes
Actenoides lindsayi	guarda-rios-mosqueado
Actenoides hombroni	guarda-rios-de-mindanau
Actenoides concretus	guarda-rios-de-colar-ruivo
Melidora macrorrhina	guarda-rios-bico-de-gancho
Lacedo pulchella	guarda-rios-bonito
Tanysiptera galatea	guarda-rios-comum-do-paraíso
Tanysiptera ellioti	guarda-rios-do-paraíso-de-kofiau
Tanysiptera riedelii	guarda-rios-do-paraíso-de-biak
Tanysiptera carolinae	guarda-rios-do-paraíso-de-numfor
Tanysiptera hydrocharis	guarda-rios-pequeno-do-paraíso
Tanysiptera sylvia	guarda-rios-do-paraíso-de-peito-creme
Tanysiptera nigriceps	guarda-rios-do-paraíso-de-cabeça-preta
Tanysiptera nympha	guarda-rios-ninfa-do-paraíso
Tanysiptera danae	guarda-rios-do-paraíso-de-cabeça-castanha
Cittura cyanotis	guarda-rios-lilás
Cittura sanghirensis	guarda-rios-de-sangihe
Dacelo rex	cucaburra-bico-de-pá
Dacelo tyro	cucaburra-escamosa
Dacelo gaudichaud	cucaburra-de-barriga-ruiva
Dacelo novaeguineae	cucaburra-risonha
Dacelo leachii	cucaburra-d'asa-azul
Caridonax fulgidus	guarda-rios-d'uropígio-branco
Pelargopsis capensis	guarda-rios-bico-de-cegonha
Pelargopsis melanorhyncha	guarda-rios-de-bico-grande
Pelargopsis amauroptera	guarda-rios-d'asas-castanhas
Halcyon coromanda	guarda-rios-avermelhado
Halcyon smyrnensis	guarda-rios-de-peito-branco

Halcyon gularis	guarda-rios-de-peito-castanho
Halcyon cyanoventris	guarda-rios-javanês
Halcyon badia	guarda-rios-de-dorso-castanho
Halcyon pileata	guarda-rios-de-touca-preta
Halcyon leucocephala	guarda-rios-de-cabeça-cinzenta
Halcyon albiventris	guarda-rios-de-cabeça-castanha
Halcyon chelicuti	guarda-rios-estriado
Halcyon malimbica	guarda-rios-de-peito-azul
Halcyon senegalensis	guarda-rios-dos-bosques
Halcyon senegaloides	guarda-rios-dos-mangais
Todiramphus nigrocyaneus	guarda-rios-índigo
Todiramphus winchelli	guarda-rios-de-loros-ruivos
Todiramphus diops	guarda-rios-azul-e-branco
Todiramphus lazuli	guarda-rios-lazúli
Todiramphus macleayii	guarda-rios-da-floresta
Todiramphus albonotatus	guarda-rios-de-manto-branco
Todiramphus leucopygius	guarda-rios-ultramarino
Todiramphus farquhari	guarda-rios-de-vanuatu
Todiramphus funebris	guarda-rios-fúnebre
Todiramphus chloris	guarda-rios-de-colar-branco
Todiramphus sordidus	guarda-rios-de-loros-brancos
Todiramphus colonus	guarda-rios-das-luisíadas
Todiramphus albicilla	guarda-rios-das-marianas
Todiramphus tristrami	guarda-rios-melanésio
Todiramphus sacer	guarda-rios-do-pacífico
Todiramphus enigma	guarda-rios-das-talaud
Todiramphus cinnamominus	guarda-rios-de-guam
Todiramphus pelewensis	guarda-rios-de-palau
Todiramphus reichenbachii	guarda-rios-de-ponapé
Todiramphus saurophagus	guarda-rios-das-praias
Todiramphus sanctus	guarda-rios-sagrado
Todiramphus recurvirostris	guarda-rios-de-samoa
Todiramphus australasia	guarda-rios-canela
Todiramphus tutus	guarda-rios-de-borabora
Todiramphus ruficollaris	guarda-rios-de-mangaia
Todiramphus veneratus	guarda-rios-do-taiti
Todiramphus gambieri	guarda-rios-de-mangareva
Todiramphus godeffroyi	guarda-rios-das-marquesas
Todiramphus pyrrhopygius	guarda-rios-de-dorso-ruivo
Syma torotoro	guarda-rios-de-bico-amarelo
Syma megarhyncha	guarda-rios-montês
Ispidina lecontei	guarda-rios-anão
Ispidina picta	guarda-rios-pigmeu-africano
Corythornis madagascariensis	guarda-rios-pigmeu-malgaxe
Corythornis leucogaster	guarda-rios-de-barriga-branca

Corythornis cristatus	guarda-rios-de-poupa
Corythornis vintsioides	guarda-rios-malgaxe
Alcedo coerulescens	guarda-rios-cerúleo
Alcedo peninsulae	guarda-rios-de-gola-azul-malaio
Alcedo euryzona	guarda-rios-de-gola-azul-javanês
Alcedo quadribrachys	guarda-rios-resplandecente
Alcedo meninting	guarda-rios-de-faces-azuis
Alcedo atthis	guarda-rios-comum
Alcedo semitorquata	guarda-rios-cobalto
Alcedo hercules	guarda-rios-hércules
Ceyx erithaca	guarda-rios-pigmeu-de-dorso-preto
Ceyx rufidorsa	guarda-rios-pigmeu-de-dorso-ruivo
Ceyx melanurus	guarda-rios-pigmeu-filipino
Ceyx sangirensis	guarda-rios-pigmeu-de-sangihe
Ceyx fallax	guarda-rios-pigmeu-de-celebes
Ceyx lepidus	guarda-rios-pigmeu-das-molucas
Ceyx margarethae	guarda-rios-dimorfo
Ceyx wallacii	guarda-rios-pigmeu-das-sula
Ceyx cajeli	guarda-rios-pigmeu-de-buru
Ceyx solitarius	guarda-rios-pigmeu-da-papua
Ceyx dispar	guarda-rios-pigmeu-de-manus
Ceyx mulcatus	guarda-rios-pigmeu-da-nova-irlanda
Ceyx sacerdotis	guarda-rios-pigmeu-da-nova-bretanha
Ceyx meeki	guarda-rios-pigmeu-de-santa-isabel
Ceyx collectoris	guarda-rios-pigmeu-da-nova-geórgia
Ceyx nigromaxilla	guarda-rios-pigmeu-de-guadalcanal
Ceyx gentianus	guarda-rios-pigmeu-de-makira
Ceyx cyanopectus	guarda-rios-pigmeu-índigo
Ceyx argentatus	guarda-rios-argênteo-do-sul
Ceyx flumenicola	guarda-rios-argênteo-do-norte
Ceyx azureus	guarda-rios-azurite
Ceyx websteri	guarda-rios-das-bismarck
Ceyx pusillus	guarda-rios-polegarzinho
Chloroceryle aenea	guarda-rios-pigmeu-americano
Chloroceryle inda	guarda-rios-verde-e-ruivo
Chloroceryle americana	guarda-rios-verde
Chloroceryle amazona	guarda-rios-amazónico
Megaceryle lugubris	guarda-rios-pedrês
Megaceryle maxima	guarda-rios-gigante
Megaceryle torquata	guarda-rios-de-barriga-ruiva
Megaceryle alcyon	guarda-rios-cintado
Ceryle rudis	guarda-rios-malhado

Todidae Tódis

Os tódis são pequenas aves de cores vivas e bico longo e vermelho. Ocorrem principalmente em zonas arborizadas, distribuindo-se por várias ilhas das Caraíbas. Alimentam-se de insectos e nidificam em buracos que escavam em paredes de terra. A existência de fósseis desta família na América do Norte e Europa indica que em tempos a família terá tido uma distribuição muito mais ampla.

Espécies: 5

Distribuição: Caraíbas

Todus multicolor	tódi-cubano
Todus subulatus	tódi-de-bico-largo
Todus angustirostris	tódi-de-bico-fino
Todus todus	tódi-jamaicano
Todus mexicanus	tódi-porto-riquenho

Momotidae Momotos

Os momotos são aves de média dimensão facilmente identificáveis pelas longas penas da cauda, com a forma de raquetes, que se movimentam de um lado para o outro como o pêndulo de um relógio. Habitam em florestas e nidificam, como muitos outros Coraciiformes, em buracos escavados na terra. A sua alimentação é à base de insectos grandes e pequenos vertebrados.

Espécies: 14

Distribuição: América tropical

Hylomanes momotula	momoto-anão
Aspatha gularis	momoto-de-garganta-azul
Momotus mexicanus	momoto-mexicano
Momotus coeruliceps	momoto-de-coroa-azul
Momotus lessonii	momoto-coroado
Momotus subrufescens	momoto-gritador
Momotus bahamensis	momoto-de-trinidade
Momotus momota	momoto-amazónico
Momotus aequatorialis	momoto-andino
Baryphthengus martii	momoto-ruivo
Baryphthengus ruficapillus	momoto-de-coroa-ruiva
Electron carinatum	momoto-pequeno
Electron platyrhynchum	momoto-de-bico-largo
Eumomota superciliosa	momoto-de-sobrancelha-azul

Meropidae Abelharucos

Os abelharucos destacam-se pela sua plumagem colorida, com a qual embelezam florestas, savanas e outras zonas abertas com algumas árvores. Como o nome indica, têm uma predilecção por abelhas e vespas, que perseguem e caçam em voo. São capazes de remover o ferrão antes de engolir as suas presas. Nidificam colonialmente em buracos no solo ou em paredes de terra, que eles próprios escavam.

Espécies: 31

Distribuição: África, Europa, sul e sudeste asiático e Austrália

Nyctyornis amictus	abelharuco-de-barba-vermelha
Nyctyornis athertoni	abelharuco-de-barba-azul
Meropogon forsteni	abelharuco-de-barba-púrpura
Merops breweri	abelharuco-de-cabeça-preta
Merops muelleri	abelharuco-de-cabeça-azul
Merops mentalis	abelharuco-de-bigodes
Merops gularis	abelharuco-preto
Merops hirundineus	abelharuco-de-cauda-forcada
Merops pusillus	abelharuco-pequeno
Merops variegatus	abelharuco-de-peito-azul
Merops lafresnayii	abelharuco-etíope
Merops oreobates	abelharuco-montês
Merops bulocki	abelharuco-de-garganta-vermelha
Merops bullockoides	abelharuco-de-testa-branca
Merops revoilii	abelharuco-somali
Merops albicollis	abelharuco-de-garganta-branca
Merops boehmi	abelharuco-de-böhm
Merops viridissimus	abelharuco-verde-africano
Merops cyanophrys	abelharuco-verde-árabe
Merops orientalis	abelharuco-verde-asiático
Merops persicus	abelharuco-persa
Merops superciliosus	abelharuco-malgaxe
Merops philippinus	abelharuco-de-cauda-azul
Merops ornatus	abelharuco-australiano
Merops viridis	abelharuco-de-garganta-azul
Merops americanus	abelharuco-filipino
Merops leschenaulti	abelharuco-de-cabeça-castanha
Merops apiaster	abelharuco-europeu
Merops malimbicus	abelharuco-rosado
Merops nubicus	abelharuco-núbio
Merops nubicoides	abelharuco-carmim

Galbulidae Bicos-d'agulha

Como o nome indica, estas aves florestais possuem um bico longo e aguçado, que utilizam para capturar insectos ágeis e de grande dimensão em voo, como borboletas ou libélulas. São tão especializados neste tipo de presas que conseguem distinguir borboletas tóxicas, com coloração de aviso, de outras espécies que são comestíveis mas mimetizam essa coloração. Escavam o seu ninho em paredes de terra.

Espécies: 18

Distribuição: América tropical

Galbalcyrhynchus leucotis	bico-d'agulha-d'orelhas-brancas
Galbalcyrhynchus purusianus	bico-d'agulha-do-purus
Brachygalba salmoni	bico-d'agulha-de-dorso-escuro
Brachygalba goeringi	bico-d'agulha-pálido
Brachygalba lugubris	bico-d'agulha-castanho
Brachygalba albogularis	bico-d'agulha-de-faces-brancas
Jacamaralcyon tridactyla	bico-d'agulha-tridáctilo
Galbula albirostris	bico-d'agulha-de-bico-amarelo
Galbula cyanicollis	bico-d'agulha-de-faces-azuis
Galbula ruficauda	bico-d'agulha-de-cauda-ruiva
Galbula galbula	bico-d'agulha-de-cauda-verde
Galbula pastazae	bico-d'agulha-acobreado
Galbula tombacea	bico-d'agulha-de-queixo-branco
Galbula cyanescens	bico-d'agulha-de-testa-azulada
Galbula chalcothorax	bico-d'agulha-violáceo
Galbula leucogastra	bico-d'agulha-bronzeado
Galbula dea	bico-d'agulha-do-paraíso
Jacamerops aureus	bico-d'agulha-grande

Bucconidae Barbudos e Barbudinhos americanos

Estas aves assemelham-se aos cucaburras da Austrália, sendo algo cabeçudos, com uma cauda curta e um bico poderoso e em gancho. Caçam presas animais, desde pequenos insectos a pequenos vertebrados, por emboscada a partir de um poiso na floresta. A sua designação deve-se às penas alongadas da face, que se pensa protegerem contra picadas e mordidas das suas presas.

Espécies: 38

Distribuição: América tropical

Notharchus hyperrhynchus	barbudo-de-bico-grosso
Notharchus macrorhynchos	barbudo-guianense
Notharchus swainsoni	barbudo-de-barriga-castanha
Notharchus pectoralis	barbudo-de-peito-preto
Notharchus ordii	barbudo-de-peito-castanho
Notharchus tectus	barbudo-de-sobrancelha
Bucco macrodactylus	barbudo-de-coroa-ruiva
Bucco tamatia	barbudo-pintalgado
Bucco noanamae	barbudo-de-cabeça-cinzenta
Bucco capensis	barbudo-de-colar
Nystalus radiatus	barbudo-barrado
Nystalus chacuru	barbudo-d'orelhas-brancas
Nystalus striolatus	barbudo-estriado-oriental
Nystalus obamai	barbudo-estriado-ocidental
Nystalus maculatus	barbudo-da-caatinga
Nystalus striatipectus	barbudo-do-chaco
Hypnelus ruficollis	barbudo-de-garganta-ruiva
Hypnelus bicinctus	barbudo-de-duplo-colar
Malacoptila striata	barbudo-de-crescente
Malacoptila fusca	barbudo-raiado
Malacoptila semicincta	barbudo-de-nuca-laranja
Malacoptila fulvogularis	barbudo-de-listas-pretas
Malacoptila rufa	barbudo-de-pescoço-ruivo
Malacoptila panamensis	barbudo-panamense
Malacoptila mystacalis	barbudo-de-bigodes-americano
Micromonacha lanceolata	barbudinho-lanceolado
Nonnula rubecula	barbudinho-de-peito-fulvo
Nonnula sclateri	barbudinho-amarelado
Nonnula brunnea	barbudinho-castanho
Nonnula frontalis	barbudinho-canela
Nonnula ruficapilla	barbudinho-coroado
Nonnula amaurocephala	barbudinho-de-cabeça-ruiva
Hapaloptila castanea	barbudo-subtropical

Monasa atra	barbudo-d'asa-branca
Monasa nigrifrons	barbudo-preto
Monasa morphoeus	barbudo-de-testa-branca
Monasa flavirostris	barbudo-de-bico-amarelo
Chelidoptera tenebrosa	barbudo-andorinha

Capitonidae — Capitães

Os capitães são aves coloridas da dimensão de um pardal, que frequentam a copa de florestas tropicais. O seu bico relativamente forte é útil para uma dieta à base tanto de frutas como de insectos. Pertencem à ordem dos Piciformes, tal como os pica-paus, e assim como estes são capazes de escavar cavidades nas árvores para construírem o seu ninho.

Espécies: 15

Distribuição: metade norte da América do Sul, Panamá e Costa Rica

Capito aurovirens	capitão-de-coroa-escarlate
Capito wallacei	capitão-de-banda-escarlate
Capito fitzpatricki	capitão-de-sira
Capito maculicoronatus	capitão-de-coroa-branca
Capito squamatus	capitão-de-testa-laranja
Capito hypoleucus	capitão-de-dorso-branco
Capito dayi	capitão-cintado
Capito brunneipectus	capitão-de-peito-castanho
Capito niger	capitão-de-pintas-pretas
Capito auratus	capitão-dourado
Capito quinticolor	capitão-de-cinco-cores
Eubucco richardsoni	capitão-de-garganta-limão
Eubucco bourcierii	capitão-de-cabeça-vermelha
Eubucco tucinkae	capitão-de-capuz-vermelho
Eubucco versicolor	capitão-multicolor

Semnornithidae	Capitão-tucano e Capitão-de-bico-dentado

Esta família inclui apenas duas espécies, muito semelhantes aos capitães da família anterior em morfologia e hábitos, mas que têm uma origem evolutiva mais antiga, sendo igualmente aparentados dos tucanos. Ambas as espécies habitam em florestas húmidas de montanha e têm áreas de distribuição bastante restritas.

Espécies: 2

Distribuição: Costa Rica, Panamá, Colômbia e Equador

Semnornis frantzii	capitão-de-bico-dentado
Semnornis ramphastinus	capitão-tucano

Ramphastidae Tucanos, Tucaninhos e Araçaris

As aves desta família são consideradas um símbolo das florestas tropicais das Américas, pelo seu grande tamanho, pela plumagem de cores vivas e pelo longo e espesso bico. Este funciona como um radiador, permitindo que os tucanos passem muito tempo expostos ao sol na copa das árvores, sem sobreaquecer. Ocorrem principalmente em florestas, onde se alimentam principalmente de frutas, mas também de crias de outras aves. Nidificam em cavidades nas árvores.

Espécies: 39

Distribuição: América tropical

Aulacorhynchus prasinus	tucaninho-esmeralda
Aulacorhynchus albivitta	tucaninho-de-garganta-branca
Aulacorhynchus atrogularis	tucaninho-de-garganta-preta
Aulacorhynchus huallagae	tucaninho-do-huallaga
Aulacorhynchus coeruleicinctis	tucaninho-de-peito-azul
Aulacorhynchus haematopygus	tucaninho-d'uropígio-vermelho
Aulacorhynchus whitelianus	tucaninho-dos-tepuis
Aulacorhynchus derbianus	tucaninho-verde
Aulacorhynchus sulcatus	tucaninho-de-bico-sulcado
Pteroglossus viridis	araçari-verde
Pteroglossus inscriptus	araçari-de-letras
Pteroglossus bitorquatus	araçari-de-pescoço-vermelho
Pteroglossus azara	araçari-bico-de-marfim
Pteroglossus aracari	araçari-de-pescoço-preto
Pteroglossus castanotis	araçari-de-faces-castanhas
Pteroglossus pluricinctus	araçari-de-cinta-dupla
Pteroglossus torquatus	araçari-de-colar
Pteroglossus erythropygius	araçari-de-bico-pálido
Pteroglossus frantzii	araçari-de-bico-laranja
Pteroglossus beauharnaesii	araçari-de-caracóis
Pteroglossus bailloni	araçari-banana
Selenidera spectabilis	tucaninho-d'orelhas-amarelas
Selenidera piperivora	tucaninho-guianense
Selenidera reinwardtii	tucaninho-de-coleira
Selenidera nattereri	tucaninho-d'orelhas-castanhas
Selenidera gouldii	tucaninho-de-gould
Selenidera maculirostris	tucaninho-de-bico-manchado
Andigena hypoglauca	tucano-montês-de-peito-cinzento
Andigena laminirostris	tucano-montês-de-placas
Andigena cucullata	tucano-montês-de-capuz
Andigena nigrirostris	tucano-montês-de-bico-preto

Ramphastos dicolorus	tucano-bicolor
Ramphastos vitellinus	tucano-de-bico-preto
Ramphastos citreolaemus	tucano-de-peito-citrino
Ramphastos brevis	tucano-do-chocó
Ramphastos sulfuratus	tucano-de-bico-verde
Ramphastos toco	tucano-gigante
Ramphastos tucanus	tucano-de-peito-branco
Ramphastos ambiguus	tucano-de-peito-amarelo

Os barbudos asiáticos são aves florestais, que se alimentam de insectos e frutas, em especial de figos. Regurgitam os caroços das frutas, contribuindo assim para a dispersão de sementes. Em tempos estas aves foram incluídas numa mesma família juntamente com os capitães sul-americanos e os barbaças africanos, mas hoje são considerados uma família distinta. Distribuem-se pela região oriental, com destaque para a península malaia e a Indonésia.

Espécies: 35

Distribuição: Ásia meridional

Psilopogon pyrolophus	barbudo-incandescente
Psilopogon virens	barbudo-grande
Psilopogon lagrandieri	barbudo-de-crisso-vermelho
Psilopogon zeylanicus	barbudo-de-cabeça-castanha
Psilopogon lineatus	barbudo-listado
Psilopogon viridis	barbudo-de-faces-brancas
Psilopogon faiostrictus	barbudo-de-faces-verdes
Psilopogon corvinus	barbudo-de-garganta-castanha
Psilopogon chrysopogon	barbudo-de-faces-douradas
Psilopogon rafflesii	barbudo-de-coroa-vermelha
Psilopogon mystacophanos	barbudo-de-garganta-vermelha
Psilopogon javensis	barbudo-javanês
Psilopogon flavifrons	barbudo-de-testa-amarela
Psilopogon franklinii	barbudo-de-garganta-dourada
Psilopogon auricularis	barbudo-adornado
Psilopogon oorti	barbudo-de-sobrancelhas-pretas
Psilopogon annamensis	barbudo-indochinês
Psilopogon faber	barbudo-chinês
Psilopogon nuchalis	barbudo-da-formosa
Psilopogon asiaticus	barbudo-de-garganta-azul
Psilopogon chersonesus	barbudo-de-garganta-turquesa
Psilopogon monticola	barbudo-montês
Psilopogon incognitus	barbudo-de-bigodes-asiático
Psilopogon henricii	barbudo-de-coroa-amarela
Psilopogon armillaris	barbudo-de-coroa-azul
Psilopogon pulcherrimus	barbudo-de-nuca-dourada
Psilopogon australis	barbudo-de-faces-amarelas
Psilopogon cyanotis	barbudo-de-faces-azuis
Psilopogon duvaucelii	barbudo-de-faces-pretas
Psilopogon eximius	barbudo-do-bornéu
Psilopogon rubricapillus	barbudo-cingalês
Psilopogon malabaricus	barbudo-malabar

Psilopogon haemacephalus	barbudo-latoeiro
Caloramphus fuliginosus	barbudo-castanho-do-bornéu
Caloramphus hayii	barbudo-castanho-malaio

Lybiidae Barbaças e Barbadinhos

Esta família, que integra a ordem dos piciformes, reúne um conjunto de espécies, de aspecto compacto e bico espesso. Em português estas aves são conhecidas pelos nomes de barbaças (espécies maiores) ou barbadinhos (espécies menores). Estes nomes derivam do facto de a maioria das espécies ter pelos junto à base do bico. Estas aves, que frequentam geralmente zonas arborizadas, alimentam-se principalmente de frutos, mas também de insectos.

Espécies: 44

Distribuição: África subsariana

Trachylaemus goffinii	barbaças-de-goffin
Trachylaemus purpuratus	barbaças-de-bico-amarelo
Trachyphonus vaillantii	barbaças-de-poupa
Trachyphonus erythrocephalus	barbaças-de-cabeça-vermelha
Trachyphonus margaritatus	barbaças-de-peito-amarelo
Trachyphonus darnaudii	barbaças-de-d'arnaud
Trachyphonus usambiro	barbaças-massai
Cryptolybia olivacea	barbaças-verde
Gymnobucco bonapartei	barbaças-de-garganta-cinzenta
Gymnobucco sladeni	barbaças-de-sladen
Gymnobucco peli	barbaças-de-cerdas-nasais
Gymnobucco calvus	barbaças-calvo
Stactolaema leucotis	barbaças-d'orelhas-brancas
Stactolaema whytii	barbaças-de-whyte
Stactolaema anchietae	barbaças-de-anchieta
Pogoniulus scolopaceus	barbadinho-malhado
Pogoniulus simplex	barbadinho-verde
Pogoniulus leucomystax	barbadinho-de-bigodes
Pogoniulus coryphaea	barbadinho-de-montanha
Pogoniulus atroflavus	barbadinho-d'uropígio-vermelho
Pogoniulus subsulphureus	barbadinho-de-garganta-amarela
Pogoniulus bilineatus	barbadinho-d'uropígio-amarelo
Pogoniulus uropygialis	barbadinho-abissínio
Pogoniulus pusillus	barbadinho-de-testa-vermelha
Pogoniulus chrysoconus	barbadinho-de-testa-amarela
Buccanodon duchaillui	barbaças-de-manchas-amarelas
Tricholaema hirsuta	barbaças-hirsuto
Tricholaema diademata	barbaças-de-testa-vermelha
Tricholaema frontata	barbaças-do-miombo
Tricholaema leucomelas	barbaças-das-acácias
Tricholaema lacrymosa	barbaças-fúnebre

Tricholaema melanocephala	barbaças-de-cabeça-preta
Lybius undatus	barbaças-etíope
Lybius vieilloti	barbaças-de-vieillot
Lybius leucocephalus	barbaças-de-cabeça-branca
Lybius chaplini	barbaças-de-chaplin
Lybius rubrifacies	barbaças-de-faces-vermelhas
Lybius guifsobalito	barbaças-de-bico-preto
Lybius torquatus	barbaças-de-colar
Pogonornis melanopterus	barbaças-de-peito-castanho
Pogonornis minor	barbaças-de-dorso-preto
Pogonornis bidentatus	barbaças-bidentado
Pogonornis dubius	barbaças-de-peito-vermelho
Pogonornis rolleti	barbaças-de-peito-preto

Indicatoridae — Indicadores

Os indicadores são parentes próximos dos pica-paus. Têm uma plumagem composta por cores discretas. O nome destas aves deriva do curioso hábito que uma ou duas espécies desenvolveram de 'indicar' aos humanos a localização das colmeias – uma vez aberta a colónia e retirado o mel, as aves alimentam-se das larvas e da cera remanescente, sendo aliás das poucas aves que consomem cera de abelha. Também se alimentam de insectos e mel.

Espécies: 16

Distribuição: África subsariana e Ásia

Prodotiscus insignis	indicador-de-cassin
Prodotiscus zambesiae	indicador-de-dorso-verde
Prodotiscus regulus	indicador-de-dorso-castanho
Melignomon zenkeri	indicador-de-zenker
Melignomon eisentrauti	indicador-de-patas-amarelas
Indicator pumilio	indicador-anão
Indicator willcocksi	indicador-de-willcocks
Indicator meliphilus	indicador-pálido
Indicator exilis	indicador-pigmeu
Indicator minor	indicador-pequeno
Indicator maculatus	indicador-malhado
Indicator variegatus	indicador-de-garganta-malhada
Indicator xanthonotus	indicador-indiano
Indicator archipelagicus	indicador-malaio
Indicator indicator	indicador-grande
Melichneutes robustus	indicador-cauda-de-lira

Picidae Pica-paus

Os pica-paus formam uma vasta família, que inclui também os torcicolos e os chupa-seivas. Têm uma distribuição muito alargada, mas faltam na Australásia, assim como em Madagáscar e nas regiões polares. A maioria das espécies vive em zonas arborizadas e alimenta-se de invertebrados, que procuram sob a casca das árvores. Os pica-paus conseguem produzir sons não vocais martelando na madeira e usam estes sons para comunicar.

Espécies: 239

Distribuição: Europa, África, Ásia e Américas

Jynx torquilla	torcicolo-eurasiático
Jynx ruficollis	torcicolo-de-garganta-vermelha
Picumnus innominatus	pica-pauzinho-asiático
Picumnus aurifrons	pica-pauzinho-amazónico
Picumnus lafresnayi	pica-pauzinho-de-lafresnaye
Picumnus pumilus	pica-pauzinho-do-orinoco
Picumnus exilis	pica-pauzinho-de-testa-dourada
Picumnus sclateri	pica-pauzinho-equatoriano
Picumnus squamulatus	pica-pauzinho-de-escamas-pretas
Picumnus spilogaster	pica-pauzinho-de-barriga-branca
Picumnus minutissimus	pica-pauzinho-guianense
Picumnus pygmaeus	pica-pauzinho-pintalgado
Picumnus steindachneri	pica-pauzinho-do-huallaga
Picumnus varzeae	pica-pauzinho-da-várzea
Picumnus cirratus	pica-pauzinho-barrado
Picumnus dorbignyanus	pica-pauzinho-ocelado
Picumnus temminckii	pica-pauzinho-de-faces-ocres
Picumnus albosquamatus	pica-pauzinho-de-escamas-brancas
Picumnus fuscus	pica-pauzinho-de-faces-castanhas
Picumnus rufiventris	pica-pauzinho-ruivo
Picumnus limae	pica-pauzinho-cearense
Picumnus nebulosus	pica-pauzinho-meridional
Picumnus castelnau	pica-pauzinho-de-peito-liso
Picumnus subtilis	pica-pauzinho-de-cuzco
Picumnus olivaceus	pica-pauzinho-oliváceo
Picumnus granadensis	pica-pauzinho-colombiano
Picumnus cinnamomeus	pica-pauzinho-canela
Verreauxia africana	pica-pau-pigmeu-africano
Sasia abnormis	pica-pau-pigmeu-ruivo
Sasia ochracea	pica-pau-pigmeu-de-sobrancelha-branca
Nesoctites micromegas	pica-pau-anão-das-antilhas
Hemicircus concretus	pica-pau-atarracado

Hemicircus canente	pica-pau-canente
Melanerpes candidus	pica-pau-branco
Melanerpes lewis	pica-pau-de-lewis
Melanerpes herminieri	pica-pau-de-guadalupe
Melanerpes portoricensis	pica-pau-porto-riquenho
Melanerpes erythrocephalus	pica-pau-de-cabeça-vermelha
Melanerpes formicivorus	pica-pau-das-bolotas
Melanerpes cruentatus	pica-pau-de-penachos-amarelos
Melanerpes flavifrons	pica-pau-de-testa-amarela
Melanerpes chrysauchen	pica-pau-de-nuca-dourada
Melanerpes pulcher	pica-pau-do-magdalena
Melanerpes pucherani	pica-pau-centro-americano
Melanerpes cactorum	pica-pau-dos-cactos
Melanerpes striatus	pica-pau-dominicano
Melanerpes radiolatus	pica-pau-jamaicano
Melanerpes chrysogenys	pica-pau-de-faces-amarelas
Melanerpes hypopolius	pica-pau-do-balsas
Melanerpes pygmaeus	pica-pau-do-iucatão
Melanerpes rubricapillus	pica-pau-de-coroa-vermelha
Melanerpes uropygialis	pica-pau-do-deserto
Melanerpes hoffmannii	pica-pau-de-hoffmann
Melanerpes aurifrons	pica-pau-de-testa-dourada
Melanerpes carolinus	pica-pau-carolino
Melanerpes superciliaris	pica-pau-das-antilhas
Sphyrapicus thyroideus	chupa-seiva-preto
Sphyrapicus varius	chupa-seiva-de-barriga-amarela
Sphyrapicus nuchalis	chupa-seiva-de-nuca-vermelha
Sphyrapicus ruber	chupa-seiva-de-peito-ruivo
Xiphidiopicus percussus	pica-pau-verde-cubano
Pardipicus nivosus	pica-pau-das-térmitas
Pardipicus caroli	pica-pau-d'orelhas-castanhas
Geocolaptes olivaceus	pica-pau-terrestre
Campethera punctuligera	pica-pau-ponteado
Campethera bennettii	pica-pau-de-bennett
Campethera scriptoricauda	pica-pau-tanzaniano
Campethera nubica	pica-pau-núbio
Campethera abingoni	pica-pau-de-cauda-dourada
Campethera mombassica	pica-pau-de-mombaça
Campethera notata	pica-pau-de-knysna
Campethera maculosa	pica-pau-de-costas-douradas
Campethera tullbergi	pica-pau-de-tullberg
Campethera taeniolaema	pica-pau-zebrado
Yungipicus temminckii	pica-pau-de-celebes
Yungipicus nanus	pica-pau-de-touca-castanha
Yungipicus canicapillus	pica-pau-de-barrete-cinzento
Yungipicus maculatus	pica-pau-pequeno-filipino

Yungipicus ramsayi	pica-pau-das-sulu
Yungipicus moluccensis	pica-pau-das-sundas
Yungipicus kizuki	pica-pau-kizuki
Picoides tridactylus	pica-pau-tridáctilo
Picoides dorsalis	pica-pau-de-dorso-barrado
Picoides arcticus	pica-pau-de-dorso-preto
Dendrocoptes dorae	pica-pau-árabe
Dendrocoptes auriceps	pica-pau-de-testa-castanha
Dendrocoptes medius	pica-pau-médio
Leiopicus mahrattensis	pica-pau-marata
Chloropicus namaquus	pica-pau-de-bigodes
Chloropicus xantholophus	pica-pau-de-crista-amarela
Chloropicus pyrrhogaster	pica-pau-ventre-de-fogo
Dendropicos elachus	pica-pau-saheliano
Dendropicos poecilolaemus	pica-pau-de-peito-malhado
Dendropicos abyssinicus	pica-pau-abissínio
Dendropicos fuscescens	pica-pau-cardeal
Dendropicos gabonensis	pica-pau-gabonês
Dendropicos lugubris	pica-pau-lúgubre
Dendropicos stierlingi	pica-pau-de-stierling
Dendropicos elliotii	pica-pau-de-elliot
Dendropicos goertae	pica-pau-de-peito-cinzento
Dendropicos spodocephalus	pica-pau-etíope
Dendropicos griseocephalus	pica-pau-de-cabeça-cinzenta
Dendropicos obsoletus	pica-pau-de-dorso-castanho
Dryobates nuttallii	pica-pau-galego-da-califórnia
Dryobates scalaris	pica-pau-galego-mexicano
Dryobates pubescens	pica-pau-galego-americano
Dryobates cathpharius	pica-pau-galego-oriental
Dryobates pernyii	pica-pau-galego-de-colar
Dryobates minor	pica-pau-galego-eurasiático
Veniliornis passerinus	pica-pau-pequeno-sul-americano
Veniliornis frontalis	pica-pau-dos-yungas
Veniliornis spilogaster	pica-pau-de-pintas-brancas
Veniliornis mixtus	pica-pau-axadrezado
Veniliornis lignarius	pica-pau-austral
Veniliornis callonotus	pica-pau-de-dorso-escarlate
Veniliornis dignus	pica-pau-de-barriga-amarela
Veniliornis nigriceps	pica-pau-barrado
Veniliornis sanguineus	pica-pau-sanguíneo
Veniliornis kirkii	pica-pau-d'uropígio-vermelho
Veniliornis affinis	pica-pau-de-manchas-vermelhas
Veniliornis chocoensis	pica-pau-do-chocó
Veniliornis cassini	pica-pau-de-colar-dourado
Veniliornis maculifrons	pica-pau-d'orelhas-amarelas

Leuconotopicus borealis	pica-pau-de-faces-brancas
Leuconotopicus fumigatus	pica-pau-pardo
Leuconotopicus arizonae	pica-pau-do-arizona
Leuconotopicus stricklandi	pica-pau-de-strickland
Leuconotopicus villosus	pica-pau-cabeludo
Leuconotopicus albolarvatus	pica-pau-de-cabeça-branca
Dendrocopos hyperythrus	pica-pau-de-barriga-ruiva
Dendrocopos macei	pica-pau-de-peito-fulvo
Dendrocopos analis	pica-pau-de-peito-sardento
Dendrocopos atratus	pica-pau-de-peito-estriado
Dendrocopos darjellensis	pica-pau-de-darjeeling
Dendrocopos himalayensis	pica-pau-dos-himalaias
Dendrocopos assimilis	pica-pau-de-sinde
Dendrocopos syriacus	pica-pau-sírio
Dendrocopos leucopterus	pica-pau-d'asa-branca
Dendrocopos major	pica-pau-malhado
Dendrocopos noguchii	pica-pau-de-okinawa
Dendrocopos leucotos	pica-pau-de-dorso-branco
Piculus simplex	pica-pau-d'asa-ruiva
Piculus callopterus	pica-pau-panamense
Piculus leucolaemus	pica-pau-de-garganta-branca
Piculus litae	pica-pau-de-lita
Piculus flavigula	pica-pau-de-garganta-amarela
Piculus chrysochloros	pica-pau-verde-e-dourado
Piculus aurulentus	pica-pau-de-sobrancelha-amarela
Colaptes rubiginosus	pica-pau-oliváceo
Colaptes aeruginosus	pica-pau-bronzeado
Colaptes auricularis	pica-pau-de-coroa-cinzenta
Colaptes rivolii	pica-pau-de-manto-carmim
Colaptes atricollis	pica-pau-peruano
Colaptes punctigula	pica-pau-de-peito-sarapintado
Colaptes melanochloros	pica-pau-verde-barrado
Colaptes auratus	pica-pau-mosqueado
Colaptes mexicanoides	pica-pau-guatemalteco
Colaptes chrysoides	pica-pau-da-califórnia
Colaptes oceanicus	pica-pau-bermudense
Colaptes fernandinae	pica-pau-cubano
Colaptes pitius	pica-pau-chileno
Colaptes rupicola	pica-pau-andino
Colaptes campestris	pica-pau-do-campo
Celeus loricatus	pica-pau-canela
Celeus undatus	pica-pau-ondulado
Celeus castaneus	pica-pau-avelã
Celeus elegans	pica-pau-elegante
Celeus lugubris	pica-pau-louro

Celeus flavescens	pica-pau-de-cabeça-amarela
Celeus ochraceus	pica-pau-ocráceo
Celeus flavus	pica-pau-amarelo
Celeus spectabilis	pica-pau-de-cabeça-ruiva
Celeus obrieni	pica-pau-do-parnaíba
Celeus torquatus	pica-pau-de-colar-preto
Celeus galeatus	pica-pau-de-capacete
Dryocopus schulzii	pica-pau-de-faixa-branca
Dryocopus lineatus	pica-pau-listado
Dryocopus pileatus	pica-pau-grande-americano
Dryocopus javensis	pica-pau-de-barriga-branca
Dryocopus hodgei	pica-pau-das-andamão
Dryocopus martius	pica-pau-preto
Campephilus pollens	pica-pau-poderoso
Campephilus splendens	pica-pau-esplêndido
Campephilus haematogaster	pica-pau-de-barriga-vermelha
Campephilus rubricollis	pica-pau-de-pescoço-vermelho
Campephilus robustus	pica-pau-robusto
Campephilus melanoleucos	pica-pau-de-crista-vermelha
Campephilus guatemalensis	pica-pau-de-bico-pálido
Campephilus gayaquilensis	pica-pau-de-guaiaquil
Campephilus leucopogon	pica-pau-de-dorso-creme
Campephilus magellanicus	pica-pau-de-magalhães
Campephilus principalis	pica-pau-de-bico-marfim
Campephilus imperialis	pica-pau-imperial
Chrysophlegma miniaceum	pica-pau-vermelhão
Chrysophlegma mentale	pica-pau-de-garganta-axadrezada
Chrysophlegma flavinucha	pica-pau-grande-de-nuca-amarela
Picus chlorolophus	pica-pau-pequeno-de-nuca-amarela
Picus puniceus	pica-pau-d'asa-carmesim
Picus viridanus	pica-pau-lanceolado
Picus vittatus	pica-pau-rendado
Picus xanthopygaeus	pica-pau-de-garganta-listada
Picus squamatus	pica-pau-escamoso
Picus awokera	pica-pau-japonês
Picus viridis	pica-pau-verde-europeu
Picus sharpei	pica-pau-verde-ibérico
Picus vaillantii	pica-pau-mourisco
Picus rabieri	pica-pau-de-colar-vermelho
Picus erythropygius	pica-pau-de-cabeça-preta
Picus canus	pica-pau-cinzento
Picus dedemi	pica-pau-de-samatra
Dinopium shorii	pica-pau-incandescente-dos-himalaias
Dinopium javanense	pica-pau-incandescente-comum
Dinopium everetti	pica-pau-incandescente-filipino

Dinopium benghalense	pica-pau-incandescente-indiano
Dinopium psarodes	pica-pau-incandescente-vermelho
Chrysocolaptes validus	pica-pau-vigoroso
Chrysocolaptes lucidus	pica-pau-sultão-malhado
Chrysocolaptes haematribon	pica-pau-sultão-de-lução
Chrysocolaptes xanthocephalus	pica-pau-sultão-de-faces-amarelas
Chrysocolaptes erythrocephalus	pica-pau-sultão-de-cabeça-vermelha
Chrysocolaptes strictus	pica-pau-sultão-javanês
Chrysocolaptes guttacristatus	pica-pau-sultão-grande
Chrysocolaptes socialis	pica-pau-sultão-do-malabar
Chrysocolaptes stricklandi	pica-pau-sultão-cingalês
Chrysocolaptes festivus	pica-pau-sultão-de-dorso-branco
Gecinulus grantia	pica-pau-do-bambu-nortenho
Gecinulus viridis	pica-pau-do-bambu-meridional
Gecinulus rafflesii	pica-pau-incandescente-de-raffles
Blythipicus rubiginosus	pica-pau-bordô
Blythipicus pyrrhotis	pica-pau-d'orelhas-vermelhas
Micropternus brachyurus	pica-pau-ferrugíneo
Meiglyptes grammithorax	pica-pau-d'uropígio-bege
Meiglyptes tristis	pica-pau-triste
Meiglyptes jugularis	pica-pau-dominó
Meiglyptes tukki	pica-pau-tukik
Mulleripicus fulvus	pica-pau-fuliginoso-de-celebes
Mulleripicus funebris	pica-pau-filipino-nortenho
Mulleripicus fuliginosus	pica-pau-filipino-meridional
Mulleripicus pulverulentus	pica-pau-ardósia

Cariamidae Seriemas

Com as suas pernas altas e plumas compridas na face, estas espécies parecem ser o equivalente do secretário nas savanas e florestas secas da América do Sul. Sabe-se agora que são parentes próximos dos falcões. Tal como o secretário, as seriemas alimentam-se principalmente de presas animais. Não são excelentes voadoras, preferindo correr. Constroem um ninho volumoso de ramos no alto de arbustos ou pequenas árvores.

Espécies: 2

Distribuição: parte central da América do Sul

Cariama cristata	seriema-de-patas-vermelhas
Chunga burmeisteri	seriema-de-patas-pretas

Falconidae Falcões e Caracaras

Os falcões e caracaras pertencem a uma linhagem evolutiva muito distante das restantes aves de rapina. Os falcões são aves de asas e cauda longas e voo ágil, que usam para perseguir e caçar variadas presas animais. Aqui se inclui o animal mais rápido do mundo, o falcão-peregrino, que consegue alcançar mais de 320 km/h em voo picado. As caracaras das Américas distinguem-se pelas asas mais arredondadas e pele nua na cabeça, sendo também mais omnívoras na sua dieta.

Espécies: 65

Distribuição: cosmopolita, excepto Antárctida

Spiziapteryx circumcincta	falcão-pigmeu-do-chaco
Caracara lutosa	caracara-de-guadalupe
Caracara plancus	caracara-de-crista
Ibycter americanus	caracara-vespeiro
Daptrius ater	caracara-preto
Daptrius chimachima	caracara-de-cabeça-amarela
Daptrius chimango	caracara-unicolor
Daptrius australis	caracara-austral
Daptrius carunculatus	caracara-do-páramo
Daptrius megalopterus	caracara-andino
Daptrius albogularis	caracara-de-garganta-branca
Herpetotheres cachinnans	falcão-risonho
Micrastur ruficollis	falcão-de-pescoço-castanho
Micrastur plumbeus	falcão-plúmbeo
Micrastur gilvicollis	falcão-amazónico
Micrastur mintoni	falcão-críptico
Micrastur mirandollei	falcão-de-dorso-cinzento
Micrastur semitorquatus	falcão-de-coleira-interrompida
Micrastur buckleyi	falcão-de-buckley
Polihierax semitorquatus	falcão-pigmeu-africano
Microhierax caerulescens	falconete-de-colar
Microhierax fringillarius	falconete-de-coxas-pretas
Microhierax latifrons	falconete-de-testa-branca
Microhierax erythrogenys	falconete-filipino
Microhierax melanoleucos	falconete-alvinegro
Neohierax insignis	falcão-pigmeu-asiático
Falco naumanni	peneireiro-das-torres
Falco tinnunculus	peneireiro-de-dorso-malhado
Falco rupicolus	peneireiro-africano
Falco newtoni	peneireiro-malgaxe
Falco punctatus	peneireiro-das-maurícias
Falco duboisi	peneireiro-da-reunião
Falco araeus	peneireiro-das-seicheles

Falco moluccensis	peneireiro-das-molucas
Falco cenchroides	peneireiro-australiano
Falco sparverius	peneireiro-americano
Falco rupicoloides	peneireiro-d'olho-branco
Falco alopex	peneireiro-vulpino
Falco ardosiaceus	peneireiro-ardósia
Falco dickinsoni	peneireiro-de-dickinson
Falco zoniventris	peneireiro-listado
Falco chicquera	falcão-de-nuca-vermelha
Falco vespertinus	falcão-de-pés-vermelhos
Falco amurensis	falcão-do-amur
Falco eleonorae	falcão-da-rainha
Falco concolor	falcão-sombrio
Falco femoralis	falcão-de-colete
Falco columbarius	esmerilhão
Falco rufigularis	falcão-morcegueiro
Falco deiroleucus	falcão-de-peito-laranja
Falco subbuteo	ógea-eurasiática
Falco cuvierii	ógea-africana
Falco severus	ógea-oriental
Falco longipennis	ógea-australiana
Falco novaeseelandiae	falcão-maori
Falco berigora	falcão-berigora
Falco hypoleucos	falcão-cinzento
Falco subniger	falcão-preto
Falco biarmicus	falcão-lanário
Falco jugger	falcão-caçador
Falco cherrug	falcão-sacre
Falco rusticolus	falcão-gerifalte
Falco mexicanus	falcão-das-pradarias
Falco peregrinus	falcão-peregrino
Falco fasciinucha	falcão-taita

Estes papagaios, todos eles com nomes da língua maori da Nova Zelândia, partilham entre si o facto de estarem fortemente ameaçados, devido a predação por mamíferos introduzidos nestas ilhas. O seu principal habitat é a floresta nativa, embora a kea ocorra em regiões alpinas na ilha do sul. São omnívoros, à excepção do kakapo, que se alimenta apenas de material vegetal. A kea é capaz de utilizar ferramentas e conhecida pela sua inteligência.

Espécies: 4

Distribuição: Nova Zelândia (e uma espécie extinta na ilha de Norfolk)

Strigops habroptilus	kakapo
Nestor notabilis	kea
Nestor meridionalis	kaká-neozelandês
Nestor productus	kaká-de-norfolk

As catatuas são bem conhecidas como animais domésticos, mas na sua região de origem são uma presença constante em muitos tipos de habitats, incluindo zonas urbanas. Alimentam-se de frutos e sementes, razão pela qual são consideradas pragas agrícolas em certas regiões. Nidificam em cavidades, mas não são capazes de as escavar, dependendo de árvores nativas onde estas se formam naturalmente, já que não existem pica-paus na região.

Espécies: 22

Distribuição: Austrália, Papua e ilhas orientais do arquipélago indo-malaio

Zanda funerea	catatua-preta-de-cauda-amarela
Zanda baudinii	catatua-preta-de-bico-comprido
Zanda latirostris	catatua-preta-de-bico-curto
Calyptorhynchus banksii	catatua-preta-de-cauda-vermelha
Calyptorhynchus lathami	catatua-preta-lustrosa
Nymphicus hollandicus	caturra
Probosciger aterrimus	catatua-das-palmeiras
Callocephalon fimbriatum	catatua-gang-gang
Eolophus roseicapilla	catatua-galah
Cacatua leadbeateri	catatua-rosada
Cacatua haematuropygia	catatua-filipina
Cacatua goffiniana	catatua-das-tanimbar
Cacatua ducorpsii	catatua-das-salomão
Cacatua pastinator	catatua-ocidental
Cacatua sanguinea	catatua-sanguínea
Cacatua tenuirostris	catatua-de-bico-longo
Cacatua alba	catatua-branca
Cacatua ophthalmica	catatua-d'olho-azul
Cacatua moluccensis	catatua-das-molucas
Cacatua sulphurea	catatua-pequena-de-crista-amarela
Cacatua citrinocristata	catatua-de-crista-laranja
Cacatua galerita	catatua-grande-de-crista-amarela

Psittacidae — Papagaios, Periquitos e afins (África e Novo Mundo)

Os papagaios e periquitos das Américas e de África são espécies móveis, sociais e bastante ruidosas, que nidificam em cavidades, tal como os seus primos da família Psittaculidae. A maioria tem uma coloração verde, que lhes permite camuflarem-se nos ambientes florestais que ocupam. São principalmente granívoros e frugívoros. Algumas espécies reúnem-se para consumir argila de paredes de terra, que se pensa neutralizar toxinas vegetais ingeridas durante a alimentação.

Espécies: 181

Distribuição: América do Sul e Central, África subsariana

Psittacus erithacus	papagaio-cinzento
Psittacus timneh	papagaio-timneh
Poicephalus gulielmi	papagaio-de-testa-vermelha
Poicephalus flavifrons	papagaio-de-faces-amarelas
Poicephalus fuscicollis	papagaio-de-pescoço-castanho
Poicephalus robustus	papagaio-do-cabo
Poicephalus meyeri	papagaio-de-meyer
Poicephalus rueppellii	papagaio-de-rüppell
Poicephalus cryptoxanthus	papagaio-de-cabeça-castanha
Poicephalus crassus	papagaio-de-niamniam
Poicephalus senegalus	papagaio-do-senegal
Poicephalus rufiventris	papagaio-de-barriga-ruiva
Touit batavicus	periquito-de-cauda-lilás
Touit huetii	periquito-d'ombros-vermelhos
Touit costaricensis	periquito-de-testa-vermelha
Touit dilectissimus	periquito-de-testa-azul
Touit purpuratus	periquito-d'uropígio-azul
Touit melanonotus	periquito-de-dorso-castanho
Touit surdus	periquito-de-cauda-dourada
Touit stictopterus	periquito-d'asa-pintalgada
Psilopsiagon aymara	periquito-aimara
Psilopsiagon aurifrons	periquito-andino-pequeno
Bolborhynchus lineola	periquito-barrado
Bolborhynchus ferrugineifrons	periquito-de-loros-ruivos
Bolborhynchus orbygnesius	periquito-andino-grande
Nannopsittaca panychlora	periquito-dos-tepuis
Nannopsittaca dachilleae	periquito-do-manu
Myiopsitta monachus	periquito-monge
Myiopsitta luchsi	periquito-das-escarpas
Brotogeris sanctithomae	periquito-de-testa-amarela
Brotogeris tirica	periquito-liso
Brotogeris versicolurus	periquito-d'asa-branca

Brotogeris chiriri	periquito-d'asa-amarela
Brotogeris pyrrhoptera	periquito-de-faces-cinzentas
Brotogeris jugularis	periquito-de-queixo-laranja
Brotogeris cyanoptera	periquito-d'asa-cobalto
Brotogeris chrysoptera	periquito-d'asa-dourada
Pionopsitta pileata	papagaio-de-barrete-ruivo
Triclaria malachitacea	papagaio-de-barriga-azul
Pyrilia haematotis	papagaio-de-cabeça-parda
Pyrilia pyrilia	papagaio-de-cabeça-dourada
Pyrilia pulchra	papagaio-de-faces-rosadas
Pyrilia barrabandi	papagaio-de-faces-laranja
Pyrilia caica	papagaio-de-nuca-dourada
Pyrilia aurantiocephala	papagaio-calvo
Pyrilia vulturina	papagaio-abutre
Hapalopsittaca amazonina	papagaio-ferruginoso
Hapalopsittaca fuertesi	papagaio-d'asa-índigo
Hapalopsittaca pyrrhops	papagaio-equatoriano
Hapalopsittaca melanotis	papagaio-d'asa-preta
Pionus fuscus	papagaio-fusco
Pionus sordidus	papagaio-de-bico-vermelho
Pionus maximiliani	papagaio-de-cabeça-escamosa
Pionus tumultuosus	papagaio-de-faces-manchadas
Pionus seniloides	papagaio-de-barrete-branco
Pionus menstruus	papagaio-de-cabeça-azul
Pionus senilis	papagaio-de-coroa-branca
Pionus chalcopterus	papagaio-d'asa-bronze
Graydidascalus brachyurus	papagaio-de-cauda-curta
Alipiopsitta xanthops	papagaio-do-cerrado
Amazona festiva	papagaio-da-várzea
Amazona vinacea	papagaio-de-peito-roxo
Amazona tucumana	papagaio-de-tucumão
Amazona pretrei	papagaio-d'óculos-vermelhos
Amazona agilis	papagaio-de-bico-preto
Amazona albifrons	papagaio-de-testa-branca
Amazona collaria	papagaio-jamaicano
Amazona leucocephala	papagaio-cubano
Amazona ventralis	papagaio-dominicano
Amazona vittata	papagaio-porto-riquenho
Amazona finschi	papagaio-de-coroa-lilás
Amazona autumnalis	papagaio-de-loros-vermelhos
Amazona lilacina	papagaio-lilás
Amazona diadema	papagaio-diademado
Amazona viridigenalis	papagaio-de-coroa-vermelha
Amazona xantholora	papagaio-do-iucatão
Amazona dufresniana	papagaio-de-faces-azuis
Amazona rhodocorytha	papagaio-de-sobrancelha-vermelha
Amazona arausiaca	papagaio-de-colar-vermelho
Amazona versicolor	papagaio-de-santa-lúcia

Amazona oratrix	papagaio-de-cabeça-amarela
Amazona auropalliata	papagaio-de-nuca-amarela
Amazona ochrocephala	papagaio-de-coroa-amarela
Amazona barbadensis	papagaio-d'ombros-amarelos
Amazona aestiva	papagaio-de-testa-turquesa
Amazona mercenarius	papagaio-de-nuca-escamosa
Amazona farinosa	papagaio-moleiro
Amazona kawalli	papagaio-de-kawall
Amazona imperialis	papagaio-imperial
Amazona brasiliensis	papagaio-de-cauda-vermelha
Amazona amazonica	papagaio-d'asa-laranja
Amazona guildingii	papagaio-de-são-vincente
Forpus modestus	periquito-de-bico-escuro
Forpus cyanopygius	periquito-mexicano
Forpus crassirostris	periquito-ribeirinho
Forpus spengeli	periquito-d'asa-turquesa
Forpus xanthopterygius	periquito-d'asa-azul
Forpus passerinus	periquito-d'uropígio-verde
Forpus conspicillatus	periquito-d'óculos
Forpus coelestis	periquito-do-pacífico
Forpus xanthops	periquito-de-cabeça-amarela
Pionites melanocephalus	papagaio-de-barrete-preto
Pionites leucogaster	papagaio-de-barriga-branca
Deroptyus accipitrinus	papagaio-de-leque-vermelho
Pyrrhura cruentata	periquitão-sanguíneo
Pyrrhura devillei	periquitão-asa-de-fogo
Pyrrhura frontalis	periquitão-de-barriga-castanha
Pyrrhura lepida	periquitão-paraense
Pyrrhura perlata	periquitão-de-barriga-vermelha
Pyrrhura molinae	periquitão-de-faces-verdes
Pyrrhura pfrimeri	periquitão-goiano
Pyrrhura griseipectus	periquitão-cearense
Pyrrhura leucotis	periquitão-d'orelhas-brancas
Pyrrhura subandina	periquitão-subandino
Pyrrhura caeruleiceps	periquitão-de-perijá
Pyrrhura picta	periquitão-de-testa-azul
Pyrrhura emma	periquitão-venezuelano
Pyrrhura amazonum	periquitão-de-santarém
Pyrrhura lucianii	periquitão-do-purus
Pyrrhura roseifrons	periquitão-de-testa-rosa
Pyrrhura viridicata	periquitão-de-santa-marta
Pyrrhura egregia	periquitão-dos-tepuis
Pyrrhura melanura	periquitão-de-cauda-castanha
Pyrrhura orcesi	periquitão-de-el-oro
Pyrrhura albipectus	periquitão-de-pescoço-branco
Pyrrhura rupicola	periquitão-de-barrete
Pyrrhura calliptera	periquitão-de-peito-castanho
Pyrrhura hoematotis	periquitão-d'orelhas-vermelhas

Pyrrhura rhodocephala	periquitão-de-cabeça-rosa
Pyrrhura hoffmanni	periquitão-d'asa-amarela
Enicognathus ferrugineus	periquito-austral
Enicognathus leptorhynchus	periquito-de-bico-fino
Cyanoliseus patagonus	periquito-das-barreiras
Anodorhynchus hyacinthinus	arara-azul
Anodorhynchus leari	arara-índigo
Anodorhynchus glaucus	arara-glauca
Rhynchopsitta pachyrhyncha	papagaio-de-bico-grosso
Rhynchopsitta terrisi	papagaio-de-testa-castanha
Eupsittula nana	periquito-jamaicano
Eupsittula canicularis	periquito-de-testa-laranja
Eupsittula aurea	periquito-de-testa-dourada
Eupsittula pertinax	periquito-de-garganta-castanha
Eupsittula cactorum	periquito-dos-cactos
Conuropsis carolinensis	periquito-carolino
Aratinga weddellii	periquitão-de-cabeça-fusca
Aratinga nenday	periquitão-de-cabeça-preta
Aratinga solstitialis	periquitão-sol
Aratinga maculata	periquitão-de-peito-amarelo
Aratinga jandaya	periquitão-nordestino
Aratinga auricapillus	periquitão-de-testa-vermelha
Cyanopsitta spixii	arara-de-spix
Orthopsittaca manilatus	arara-de-barriga-ruiva
Primolius couloni	arara-de-cabeça-azul
Primolius auricollis	arara-de-colar-dourado
Primolius maracana	arara-d'asa-azul
Ara ararauna	arara-azul-e-amarela
Ara glaucogularis	arara-de-garganta-azul
Ara severus	arara-de-testa-castanha
Ara rubrogenys	arara-de-testa-vermelha
Ara tricolor	arara-cubana
Ara militaris	arara-militar
Ara ambiguus	arara-verde
Ara macao	arara-escarlate
Ara chloropterus	arara-verde-e-vermelha
Leptosittaca branickii	periquitão-de-lista-dourada
Ognorhynchus icterotis	periquitão-d'orelhas-amarelas
Guaruba guarouba	periquitão-dourado
Diopsittaca nobilis	arara-d'ombros-vermelhos
Thectocercus acuticaudatus	periquitão-de-cabeça-azul
Psittacara holochlorus	periquitão-verde
Psittacara brevipes	periquitão-de-socorro
Psittacara strenuus	periquitão-do-pacífico
Psittacara wagleri	periquitão-de-testa-escarlate
Psittacara frontatus	periquitão-das-cordilheiras
Psittacara mitratus	periquitão-mitrado
Psittacara erythrogenys	periquitão-de-máscara-vermelha

Psittacara finschi	periquitão-de-testa-carmim
Psittacara leucophthalmus	periquitão-d'olho-branco
Psittacara euops	periquitão-cubano
Psittacara chloropterus	periquitão-dominicano
Psittacara maugei	periquitão-porto-riquenho

Psittaculidae — Papagaios, Periquitos e afins (Velho Mundo)

Esta família contém a maioria dos papagaios e periquitos do Velho Mundo, incluindo os inseparáveis de África e uma grande diversidade de espécies da Oceânia. Nidificam em cavidades nas árvores e por isso frequentam zonas florestais ou pelo menos com árvores dispersas. Tal como na família anterior, são frugívoros e granívoros, mas algumas espécies têm adaptações únicas para se alimentar de néctar e pólen (os lóris) ou de invertebrados na casca de árvores (os papagaios-pigmeus).

Espécies: 202

Distribuição: África subsariana, Madagáscar, Ásia tropical e Oceânia

Psittrichas fulgidus	papagaio-urubu
Mascarinus mascarinus	papagaio-das-mascarenhas
Coracopsis vasa	papagaio-vasa
Coracopsis nigra	papagaio-preto
Coracopsis sibilans	papagaio-comorense
Coracopsis barklyi	papagaio-das-seicheles
Micropsitta keiensis	papagaio-pigmeu-de-touca-amarela
Micropsitta geelvinkiana	papagaio-pigmeu-de-geelvink
Micropsitta pusio	papagaio-pigmeu-de-faces-fulvas
Micropsitta meeki	papagaio-pigmeu-de-meek
Micropsitta finschii	papagaio-pigmeu-de-finsch
Micropsitta bruijnii	papagaio-pigmeu-de-peito-vermelho
Polytelis swainsonii	periquito-soberbo
Polytelis anthopeplus	periquito-regente
Polytelis alexandrae	periquito-princesa
Alisterus amboinensis	papagaio-rei-das-molucas
Alisterus chloropterus	papagaio-rei-da-papua
Alisterus scapularis	papagaio-rei-australiano
Aprosmictus jonquillaceus	papagaio-timorense
Aprosmictus erythropterus	papagaio-d'asa-vermelha
Prioniturus mada	periquito-raquete-de-buru
Prioniturus platurus	periquito-raquete-de-dorso-dourado
Prioniturus waterstradti	periquito-raquete-de-mindanau
Prioniturus montanus	periquito-raquete-montês
Prioniturus platenae	periquito-raquete-de-palawan
Prioniturus mindorensis	periquito-raquete-de-mindoro
Prioniturus verticalis	periquito-raquete-das-sulu
Prioniturus flavicans	periquito-raquete-de-peito-amarelo
Prioniturus luconensis	periquito-raquete-de-lução
Prioniturus discurus	periquito-raquete-de-coroa-azul
Eclectus roratus	papagaio-ecléctico-das-molucas

Eclectus cornelia	papagaio-ecléctico-de-sumba
Eclectus riedeli	papagaio-ecléctico-das-tanimbar
Eclectus polychloros	papagaio-ecléctico-da-papua
Eclectus infectus	papagaio-ecléctico-oceânico
Geoffroyus geoffroyi	papagaio-de-faces-vermelhas
Geoffroyus simplex	papagaio-de-colar-azul
Geoffroyus heteroclitus	papagaio-cantor
Psittinus cyanurus	papagaio-d'uropígio-azul
Psittinus abbotti	papagaio-de-simeulue
Tanygnathus megalorynchos	papagaio-de-bico-grande
Tanygnathus lucionensis	papagaio-de-nuca-azul
Tanygnathus everetti	papagaio-de-everett
Tanygnathus sumatranus	papagaio-de-dorso-azul
Tanygnathus gramineus	papagaio-de-buru
Psittacula finschii	periquito-de-cabeça-cinzenta
Psittacula himalayana	periquito-dos-himalaias
Psittacula roseata	periquito-de-cabeça-rosa
Psittacula cyanocephala	periquito-cabeça-de-ameixa
Psittacula alexandri	periquito-de-bigode
Psittacula derbiana	periquito-de-derby
Psittacula longicauda	periquito-rabilongo
Psittacula columboides	periquito-malabar
Psittacula calthrapae	periquito-cingalês
Psittacula eupatria	periquito-alexandrino
Psittacula wardi	periquito-das-seicheles
Psittacula krameri	periquito-de-colar
Psittacula eques	periquito-das-maurícias
Psittacula exsul	periquito-de-rodrigues
Psittacula caniceps	periquito-de-nicobar
Psittacula bensoni	periquito-das-mascarenhas
Psittacella brehmii	papagaio-tigre-de-brehm
Psittacella picta	papagaio-tigre-pintado
Psittacella modesta	papagaio-tigre-modesto
Psittacella madaraszi	papagaio-tigre-de-madarasz
Psephotus haematonotus	periquito-d'uropígio-vermelho
Northiella haematogaster	periquito-de-máscara-azul
Northiella narethae	periquito-de-naretha
Psephotellus varius	periquito-das-acácias
Psephotellus dissimilis	periquito-encapuzado
Psephotellus chrysopterygius	periquito-d'ombros-dourados
Psephotellus pulcherrimus	periquito-do-paraíso
Purpureicephalus spurius	periquito-de-barrete-vermelho
Platycercus caledonicus	rosela-verde
Platycercus elegans	rosela-elegante
Platycercus venustus	rosela-do-norte
Platycercus adscitus	rosela-de-cabeça-pálida
Platycercus eximius	rosela-oriental
Platycercus icterotis	rosela-ocidental

Barnardius zonarius	periquito-de-barnard
Lathamus discolor	periquito-migrador
Prosopeia splendens	papagaio-escarlate
Prosopeia personata	papagaio-mascarado
Prosopeia tabuensis	papagaio-granate
Eunymphicus cornutus	periquito-cornudo
Eunymphicus uvaeensis	periquito-de-ouvea
Cyanoramphus saisseti	periquito-da-nova-caledónia
Cyanoramphus cookii	periquito-de-norfolk
Cyanoramphus subflavescens	periquito-de-lord-howe
Cyanoramphus forbesi	periquito-das-chatham
Cyanoramphus unicolor	periquito-das-antípodas
Cyanoramphus malherbi	kakariki-de-testa-laranja
Cyanoramphus hochstetteri	periquito-de-reischek
Cyanoramphus auriceps	kakariki-de-testa-amarela
Cyanoramphus novaezelandiae	kakariki-de-testa-vermelha
Cyanoramphus zealandicus	periquito-de-testa-preta
Cyanoramphus ulietanus	periquito-de-raiatea
Pezoporus wallicus	periquito-terrestre
Pezoporus occidentalis	periquito-nocturno
Neopsephotus bourkii	periquito-rosado
Neophema chrysostoma	periquito-crisóstomo
Neophema elegans	periquito-elegante
Neophema petrophila	periquito-das-rochas
Neophema chrysogaster	periquito-de-barriga-laranja
Neophema pulchella	periquito-turquesa
Neophema splendida	periquito-esplêndido
Oreopsittacus arfaki	loriquito-de-faces-floridas
Charminetta wilhelminae	loriquito-pigmeu
Hypocharmosyna rubronotata	loriquito-de-testa-vermelha
Hypocharmosyna placentis	loriquito-de-flancos-vermelhos
Charmosynopsis toxopei	loriquito-de-buru
Charmosynopsis pulchella	loriquito-fada
Synorhacma multistriata	loriquito-estriado
Charmosyna josefinae	loriquito-de-josefina
Charmosyna papou	loriquito-da-papua
Charmosyna stellae	loriquito-de-stella
Charmosynoides margarethae	loriquito-de-margarita
Vini meeki	loriquito-de-meek
Vini rubrigularis	loriquito-de-queixo-vermelho
Vini palmarum	loriquito-das-palmeiras
Vini amabilis	loriquito-de-garganta-vermelha
Vini diadema	loriquito-da-nova-caledónia
Vini solitaria	lóris-das-fiji
Vini australis	loriquito-de-samoa
Vini ultramarina	loriquito-ultramarino
Vini stepheni	loriquito-de-henderson
Vini kuhlii	loriquito-de-rimatara

Vini peruviana	loriquito-azul
Neopsittacus musschenbroekii	loriquito-de-bico-amarelo
Neopsittacus pullicauda	loriquito-de-bico-laranja
Lorius albidinucha	lóris-de-nuca-branca
Lorius chlorocercus	lóris-de-colar-amarelo
Lorius domicella	lóris-de-nuca-púrpura
Lorius garrulus	lóris-tagarela
Lorius hypoinochrous	lóris-de-barriga-púrpura
Lorius lory	lóris-tricolor
Psitteuteles versicolor	loriquito-versicolor
Parvipsitta porphyrocephala	loriquito-de-coroa-púrpura
Parvipsitta pusilla	loriquito-pequeno
Pseudeos fuscata	lóris-sombrio
Pseudeos cardinalis	lóris-cardeal
Chalcopsitta duivenbodei	lóris-castanho
Chalcopsitta atra	lóris-preto
Chalcopsitta scintillata	lóris-listado-amarelo
Glossoptilus goldiei	loriquito-de-goldie
Glossopsitta concinna	loriquito-almiscarado
Saudareos johnstoniae	loriquito-de-mindanau
Saudareos iris	loriquito-íris
Saudareos flavoviridis	loriquito-das-sula
Saudareos meyeri	loriquito-de-celebes
Saudareos ornata	loriquito-ornado
Eos reticulata	lóris-listado-azul
Eos semilarvata	lóris-de-ceram
Eos bornea	lóris-vermelho
Eos cyanogenia	lóris-d'asa-preta
Eos histrio	lóris-vermelho-e-azul
Eos squamata	lóris-de-colar-violeta
Trichoglossus rubiginosus	loriquito-de-ponapé
Trichoglossus chlorolepidotus	loriquito-de-peito-escamoso
Trichoglossus haematodus	loriquito-das-molucas
Trichoglossus rosenbergii	loriquito-de-biak
Trichoglossus moluccanus	loriquito-arco-íris
Trichoglossus rubritorquis	loriquito-de-colar-vermelho
Trichoglossus euteles	loriquito-de-cabeça-olivácea
Trichoglossus capistratus	loriquito-timorense
Trichoglossus weberi	loriquito-das-flores
Trichoglossus forsteni	loriquito-de-forsten
Melopsittacus undulatus	periquito-australiano
Nannopsittacus gulielmitertii	papagaio-dos-figos-de-testa-azul
Nannopsittacus nigrifrons	papagaio-dos-figos-de-testa-preta
Nannopsittacus melanogenia	papagaio-dos-figos-de-faces-escuras
Cyclopsitta diophthalma	papagaio-dos-figos-maquilhado
Cyclopsitta desmarestii	papagaio-dos-figos-grande
Cyclopsitta edwardsii	papagaio-dos-figos-de-edwards
Cyclopsitta salvadorii	papagaio-dos-figos-de-salvadori

Bolbopsittacus lunulatus	papagaio-goiabeiro
Loriculus vernalis	papagaio-morcego-vernal
Loriculus beryllinus	papagaio-morcego-cingalês
Loriculus philippensis	papagaio-morcego-filipino
Loriculus bonapartei	papagaio-morcego-de-bico-preto
Loriculus camiguinensis	papagaio-morcego-de-camiguin
Loriculus galgulus	papagaio-morcego-de-coroa-azul
Loriculus stigmatus	papagaio-morcego-de-celebes
Loriculus amabilis	papagaio-morcego-das-molucas
Loriculus sclateri	papagaio-morcego-das-sula
Loriculus catamene	papagaio-morcego-de-sangihe
Loriculus aurantiifrons	papagaio-morcego-da-papua
Loriculus tener	papagaio-morcego-das-bismarck
Loriculus exilis	papagaio-morcego-pigmeu
Loriculus pusillus	papagaio-morcego-javanês
Loriculus flosculus	papagaio-morcego-das-flores
Agapornis canus	inseparável-malgaxe
Agapornis pullarius	inseparável-de-cabeça-vermelha
Agapornis taranta	inseparável-abissínio
Agapornis swindernianus	inseparável-de-colar
Agapornis roseicollis	inseparável-de-faces-rosadas
Agapornis fischeri	inseparável-de-fischer
Agapornis personatus	inseparável-de-cabeça-preta
Agapornis lilianae	inseparável-do-niassa
Agapornis nigrigenis	inseparável-de-faces-pretas
Lophopsittacus mauritianus	papagaio-de-bico-largo
Necropsittacus rodricanus	papagaio-de-rodrigues

LISTA DE NOMES

2ª PARTE – PASSERIFORMES

Acanthisittidae Carriças-neozelandesas

Estas são aves minúsculas que vivem em zonas florestais da Nova Zelândia e se alimentam de insectos. No passado a família terá sido composta por cinco ou seis espécies, mas actualmente apenas sobrevivem duas. A designação "carriça" deriva de semelhanças morfológicas com as verdadeiras carriças, não havendo proximidade genética com essa família. Na verdade, pensa-se que a família das carriças neozelandesas não seja aparentada a nenhuma outra.

Espécies: 4

Distribuição: Nova Zelândia

Acanthisitta chloris	carriça-neozelandesa-verde
Xenicus longipes	carriça-neozelandesa-do-mato
Xenicus gilviventris	carriça-neozelandesa-das-rochas
Traversia lyalli	carriça-neozelandesa-de-stephens

A sapaioa é uma ave insectívora das florestas tropicais húmidas do Chocó, que se estendem entre os Andes e o Oceano Pacífico. O seu aspecto inconspícuo esconde uma complicada origem evolutiva, sendo o único descendente nas Américas de uma antiga linhagem de passeriformes do Velho Mundo, sendo as pitas da Ásia os seus parentes mais próximos.

Espécies: 1

Distribuição: Colômbia, Equador e Panamá

Sapayoa aenigma sapaioa

Philepittidae Filepitas

Esta pequena família, endémica de Madagáscar, compreende apenas quatro espécies, repartidas por dois géneros. São pequenas aves florestais, que se alimentam essencialmente de frutas. Apresentam dimorfismo sexual evidente e os machos têm carúnculas de cor viva em redor dos olhos, mais visíveis na época reprodutora. As carúnculas obtêm a sua coloração a partir de fibras de colagénio – este método de pigmentação é único em todo o reino animal.

Espécies: 4

Distribuição: Madagáscar

Philepitta schlegeli	filepita-de-schlegel
Philepitta castanea	filepita-veludo
Neodrepanis coruscans	filepita-comum
Neodrepanis hypoxantha	filepita-de-barriga-amarela

Eurylaimidae Bocarras asiáticas e Bocarra-de-grauer

As aves desta família caracterizam-se por terem cores vivas, um bico largo, cabeça grande e olhos grandes. Habitam florestas húmidas densas, movendo-se sobretudo nas copas. Alimentam-se principalmente de animais, tanto invertebrados como pequenos vertebrados. No passado esta família incluía a sapaioa, as filepitas e as bocarras africanas e verdes, mas entretanto estas aves foram separadas e passaram a integrar as suas próprias famílias.

Espécies: 10

Distribuição: Sobretudo Ásia, com uma espécie em África

Pseudocalyptomena graueri	bocarra-de-grauer
Psarisomus dalhousiae	bocarra-rabilonga
Corydon sumatranus	bocarra-sombria
Sarcophanops samarensis	bocarra-das-vissaias
Sarcophanops steerii	bocarra-de-mindanau
Serilophus rubropygius	bocarra-de-sobrancelha-cinzenta
Serilophus lunatus	bocarra-de-peito-cinzento
Cymbirhynchus macrorhynchos	bocarra-preta-e-vermelha
Eurylaimus javanicus	bocarra-javanesa
Eurylaimus ochromalus	bocarra-preta-e-amarela

Calyptomenidae Bocarras africanas e Bocarras verdes

Esta família reúne três espécies africanas e três asiáticas. São pequenos passeriformes de hábitos florestais, que têm a cabeça grande, as patas curtas e o bico largo. As diferenças entre os dois grupos são substanciais: as espécies africanas são insectívoras e têm a plumagem dominada por tons de castanho e cinzento, ao passo que as asiáticas são essencialmente frugívoras e a sua plumagem é verde iridescente.

Espécies: 6

Distribuição: África subsariana, península malaia e Bornéu

Smithornis sharpei	bocarra-de-cabeça-cinzenta
Smithornis rufolateralis	bocarra-de-flancos-vermelhos
Smithornis capensis	bocarra-africana
Calyptomena viridis	bocarra-verde
Calyptomena hosii	bocarra-de-hose
Calyptomena whiteheadi	bocarra-de-whitehead

Pittidae — Pitas

As pitas são aves de cores garridas mas bastante tímidas. Têm uma silhueta característica, com patas longas e uma cauda muito curta. Podem ser avistadas ao nível do solo em bosques densos de latitudes tropicais ou temperadas, por onde saltitam em busca de invertebrados de grande dimensão, dos quais se alimentam. Muitas delas têm um estatuto de conservação desfavorável, devido à desflorestação e à degradação do seu habitat.

Espécies: 46

Distribuição: África tropical, Ásia meridional, Japão, Papua e Austrália

Hydrornis phayrei	pita-orelhuda
Hydrornis caeruleus	pita-gigante
Hydrornis oatesi	pita-de-nuca-ruiva
Hydrornis schneideri	pita-de-schneider
Hydrornis nipalensis	pita-de-nuca-azul
Hydrornis soror	pita-de-cauda-azul
Hydrornis irena	pita-malaia
Hydrornis guajanus	pita-javanesa
Hydrornis schwaneri	pita-do-bornéu
Hydrornis baudii	pita-de-cabeça-azul
Hydrornis cyaneus	pita-azul
Hydrornis gurneyi	pita-de-gurney
Hydrornis elliotii	pita-de-elliot
Erythropitta kochi	pita-de-lução
Erythropitta erythrogaster	pita-filipina
Erythropitta dohertyi	pita-das-sula
Erythropitta celebensis	pita-de-celebes
Erythropitta rufiventris	pita-molucana-do-norte
Erythropitta rubrinucha	pita-molucana-do-sul
Erythropitta macklotii	pita-da-papua
Erythropitta novaehibernicae	pita-das-bismarck
Erythropitta meeki	pita-das-luisíadas
Erythropitta venusta	pita-graciosa
Erythropitta granatina	pita-granada
Erythropitta ussheri	pita-de-coroa-preta
Erythropitta arquata	pita-de-bandas-azuis
Pitta angolensis	pita-angolana
Pitta reichenowi	pita-de-peito-verde
Pitta brachyura	pita-indiana

Pitta moluccensis	pita-d'asa-azul
Pitta megarhyncha	pita-dos-mangais
Pitta sordida	pita-de-capuz-ocidental
Pitta abbotti	pita-de-capuz-de-nicobar
Pitta forsteni	pita-de-capuz-de-minahasa
Pitta novaeguineae	pita-de-capuz-oriental
Pitta rosenbergii	pita-de-capuz-de-biak
Pitta nympha	pita-fada
Pitta versicolor	pita-ruidosa
Pitta maxima	pita-de-peito-marfim
Pitta concinna	pita-ornada
Pitta elegans	pita-elegante
Pitta vigorsii	pita-do-mar-de-banda
Pitta anerythra	pita-de-faces-pretas
Pitta steerii	pita-de-peito-azul
Pitta superba	pita-soberba
Pitta iris	pita-arco-íris

Furnariidae Forneiros, Trepa-troncos e afins

Uma das mais amplas famílias de passeriformes, os furnarídeos podem ser encontrados em todo o tipo de habitats da América do Sul e Central. São principalmente aves insectívoras, de coloração castanha ou arruivada e cauda relativamente comprida, com pontas espinhosas nas rectrizes. Constroem ninhos bastante elaborados. Os trepa-troncos têm hábitos semelhantes aos das nossas trepadeiras, enquanto os forneiros, que dão o nome à família, constroem um ninho semelhante a um forno de barro.

Espécies: 321

Distribuição: América do Sul e Central

Sclerurus mexicanus	vira-folhas-de-garganta-vermelha
Sclerurus obscurior	vira-folhas-sombrio
Sclerurus rufigularis	vira-folhas-de-bico-curto
Sclerurus guatemalensis	vira-folhas-escamoso
Sclerurus caudacutus	vira-folhas-de-cauda-preta
Sclerurus albigularis	vira-folhas-de-garganta-cinzenta
Sclerurus scansor	vira-folhas-de-garganta-pálida
Geositta peruviana	mineiro-peruano
Geositta tenuirostris	mineiro-de-bico-comprido
Geositta cunicularia	mineiro-comum
Geositta punensis	mineiro-da-puna
Geositta poeciloptera	mineiro-brasileiro
Geositta crassirostris	mineiro-de-bico-grosso
Geositta rufipennis	mineiro-d'asa-ruiva
Geositta maritima	mineiro-cinzento
Geositta antarctica	mineiro-austral
Geositta saxicolina	mineiro-d'asa-escura
Geositta isabellina	mineiro-grande
Certhiasomus stictolaemus	trepa-troncos-de-garganta-pintalgada
Sittasomus griseicapillus	trepa-troncos-oliváceo
Deconychura typica	trepa-troncos-rabudo-pequeno
Deconychura longicauda	trepa-troncos-rabudo-nortenho
Deconychura pallida	trepa-troncos-rabudo-meridional
Dendrocincla tyrannina	trepa-troncos-tiranino
Dendrocincla merula	trepa-troncos-de-queixo-branco
Dendrocincla homochroa	trepa-troncos-ruivo
Dendrocincla anabatina	trepa-troncos-sépia
Dendrocincla fuliginosa	trepa-troncos-fuliginoso
Dendrocincla turdina	trepa-troncos-turdino

Glyphorynchus spirurus	trepa-troncos-de-bico-revirado
Dendrexetastes rufigula	trepa-troncos-de-garganta-canela
Nasica longirostris	trepa-troncos-de-bico-comprido
Dendrocolaptes sanctithomae	trepa-troncos-barrado-ocidental
Dendrocolaptes certhia	trepa-troncos-barrado-amazónico
Dendrocolaptes picumnus	trepa-troncos-variado
Dendrocolaptes hoffmannsi	trepa-troncos-de-hoffmann
Dendrocolaptes platyrostris	trepa-troncos-do-planalto
Hylexetastes stresemanni	trepa-troncos-de-barriga-barrada
Hylexetastes perrotii	trepa-troncos-de-bico-vermelho
Hylexetastes uniformis	trepa-troncos-uniforme
Xiphocolaptes promeropirhynchus	trepa-troncos-de-bico-forte
Xiphocolaptes falcirostris	trepa-troncos-de-bigode
Xiphocolaptes albicollis	trepa-troncos-de-garganta-branca
Xiphocolaptes major	trepa-troncos-gigante
Xiphorhynchus obsoletus	trepa-troncos-riscado
Xiphorhynchus fuscus	trepa-troncos-anão
Xiphorhynchus atlanticus	trepa-troncos-atlântico
Xiphorhynchus pardalotus	trepa-troncos-assobiador
Xiphorhynchus ocellatus	trepa-troncos-ocelado-amazónico
Xiphorhynchus elegans	trepa-troncos-elegante
Xiphorhynchus spixii	trepa-troncos-de-spix
Xiphorhynchus guttatus	trepa-troncos-de-garganta-bege
Xiphorhynchus susurrans	trepa-troncos-cacau
Xiphorhynchus flavigaster	trepa-troncos-de-bico-claro
Xiphorhynchus lachrymosus	trepa-troncos-lacrimoso
Xiphorhynchus erythropygius	trepa-troncos-pintalgado
Xiphorhynchus triangularis	trepa-troncos-de-dorso-oliváceo
Dendroplex picus	trepa-troncos-de-bico-direito
Dendroplex kienerii	trepa-troncos-da-várzea
Campylorhamphus trochilirostris	trepa-troncos-de-foice-vermelha
Campylorhamphus falcularius	trepa-troncos-de-foice-preta
Campylorhamphus procurvoides	trepa-troncos-de-foice-amazónico
Campylorhamphus probatus	trepa-troncos-de-foice-do-tapajós
Campylorhamphus multostriatus	trepa-troncos-de-foice-do-xingu
Campylorhamphus pusillus	trepa-troncos-de-foice-castanha
Drymotoxeres pucheranii	trepa-troncos-de-foice-grande
Drymornis bridgesii	trepa-troncos-rioplatense
Lepidocolaptes leucogaster	trepa-troncos-listado
Lepidocolaptes souleyetii	trepa-troncos-de-cabeça-riscada
Lepidocolaptes angustirostris	trepa-troncos-de-bico-estreito
Lepidocolaptes affinis	trepa-troncos-de-cabeça-pontilhada

Lepidocolaptes lacrymiger	trepa-troncos-serrano
Lepidocolaptes squamatus	trepa-troncos-escamoso-do-norte
Lepidocolaptes falcinellus	trepa-troncos-escamoso-do-sul
Lepidocolaptes albolineatus	trepa-troncos-guianense
Lepidocolaptes duidae	trepa-troncos-do-duida
Lepidocolaptes fatimalimae	trepa-troncos-do-inambari
Lepidocolaptes fuscicapillus	trepa-troncos-de-cabeça-parda
Xenops tenuirostris	bico-virado-fino
Xenops mexicanus	bico-virado-mexicano
Xenops genibarbis	bico-virado-amazónico
Xenops minutus	bico-virado-de-garganta-branca
Xenops rutilans	bico-virado-riscado
Berlepschia rikeri	trepa-palmeiras
Microxenops milleri	bico-virado-de-cauda-ruiva
Pygarrhichas albogularis	bico-virado-austral
Ochetorhynchus ruficaudus	trepa-montes-de-bico-direito
Ochetorhynchus andaecola	trepa-montes-de-bico-curvo
Ochetorhynchus phoenicurus	trepa-montes-patagónico
Ochetorhynchus melanurus	trepa-montes-chileno
Pseudocolaptes lawrencii	corre-ramos-de-barba-branca
Pseudocolaptes johnsoni	corre-ramos-barbudo-ocidental
Pseudocolaptes boissonneautii	corre-ramos-barbudo-oriental
Premnornis guttuliger	corre-ramos-d'asa-ruiva
Tarphonomus harterti	trepa-montes-boliviano
Tarphonomus certhioides	trepa-montes-do-chaco
Furnarius figulus	forneiro-de-cauda-bandada
Furnarius cinnamomeus	forneiro-do-pacífico
Furnarius longirostris	forneiro-caribenho
Furnarius leucopus	forneiro-de-patas-claras
Furnarius torridus	forneiro-de-bico-pálido
Furnarius minor	forneiro-pequeno
Furnarius rufus	forneiro-ruivo
Furnarius cristatus	forneiro-de-poupa
Lochmias nematura	corre-ramos-ribeirinho
Phleocryptes melanops	trepa-juncos
Limnornis curvirostris	trepa-caniços-de-bico-curvo
Geocerthia serrana	trepa-montes-riscado
Upucerthia dumetaria	trepa-montes-escamoso
Upucerthia saturatior	trepa-montes-florestal
Upucerthia albigula	trepa-montes-de-garganta-branca
Upucerthia validirostris	trepa-montes-ocráceo
Cinclodes pabsti	cinclodes-rabilongo

Cinclodes antarcticus	cinclodes-preto
Cinclodes fuscus	cinclodes-fusco
Cinclodes comechingonus	cinclodes-de-córdoba
Cinclodes albidiventris	cinclodes-d'asa-castanha
Cinclodes albiventris	cinclodes-d'asa-creme
Cinclodes olrogi	cinclodes-de-olrog
Cinclodes oustaleti	cinclodes-de-flancos-cinzentos
Cinclodes excelsior	cinclodes-de-bico-grosso
Cinclodes aricomae	cinclodes-real
Cinclodes palliatus	cinclodes-de-peito-branco
Cinclodes atacamensis	cinclodes-d'asa-branca
Cinclodes patagonicus	cinclodes-de-peito-escuro
Cinclodes taczanowskii	cinclodes-costeiro-peruano
Cinclodes nigrofumosus	cinclodes-costeiro-chileno
Anabazenops dorsalis	limpa-folhas-do-bambu
Anabazenops fuscus	limpa-folhas-de-coleira
Megaxenops parnaguae	bico-virado-da-caatinga
Cichlocolaptes leucophrus	corre-ramos-de-sobrancelha
Cichlocolaptes mazarbarnetti	corre-ramos-nordestino
Heliobletus contaminatus	corre-ramos-de-bico-fino
Neophilydor fuscipenne	limpa-folhas-d'asa-cinzenta
Neophilydor erythrocercum	limpa-folhas-d'uropígio-ruivo
Philydor novaesi	limpa-folhas-nordestino
Philydor atricapillus	limpa-folhas-coroado
Philydor pyrrhodes	limpa-folhas-canela
Anabacerthia striaticollis	limpa-folhas-montês
Anabacerthia variegaticeps	limpa-folhas-d'óculos
Anabacerthia ruficaudata	limpa-folhas-de-cauda-ruiva
Anabacerthia amaurotis	limpa-folhas-de-sobrancelha-branca
Anabacerthia lichtensteini	limpa-folhas-ocráceo
Syndactyla rufosuperciliata	limpa-folhas-de-sobrancelha-fulva
Syndactyla dimidiata	limpa-folhas-do-planalto
Syndactyla roraimae	limpa-folhas-dos-tepuis
Syndactyla subalaris	limpa-folhas-riscado-montês
Syndactyla ruficollis	limpa-folhas-de-pescoço-ruivo
Syndactyla guttulata	limpa-folhas-goteado
Syndactyla ucayalae	bico-virado-peruano
Syndactyla striata	bico-virado-boliviano
Ancistrops strigilatus	limpa-folhas-picanço
Dendroma rufa	limpa-folhas-de-testa-fulva
Dendroma erythroptera	limpa-folhas-d'asa-ruiva
Clibanornis dendrocolaptoides	limpa-folhas-rasteiro

Clibanornis rectirostris	limpa-folhas-de-cabeça-ruiva
Clibanornis erythrocephalus	limpa-folhas-de-tumbes
Clibanornis rubiginosus	limpa-folhas-ruivo
Clibanornis rufipectus	limpa-folhas-de-santa-marta
Thripadectes ignobilis	corre-ramos-uniforme
Thripadectes flammulatus	corre-ramos-flamulado
Thripadectes scrutator	corre-ramos-de-dorso-ruivo
Thripadectes rufobrunneus	corre-ramos-de-peito-riscado
Thripadectes melanorhynchus	corre-ramos-de-bico-preto
Thripadectes holostictus	corre-ramos-listado
Thripadectes virgaticeps	corre-ramos-de-cabeça-riscada
Automolus rufipileatus	limpa-folhas-de-coroa-castanha
Automolus melanopezus	limpa-folhas-escuro
Automolus cervinigularis	limpa-folhas-de-garganta-bege
Automolus ochrolaemus	limpa-folhas-de-garganta-ocre
Automolus exsertus	limpa-folhas-de-chiriqui
Automolus subulatus	limpa-folhas-riscado-amazónico
Automolus virgatus	limpa-folhas-riscado-ocidental
Automolus infuscatus	limpa-folhas-oliváceo
Automolus paraensis	limpa-folhas-paraense
Automolus lammi	limpa-folhas-pernambucano
Automolus leucophthalmus	limpa-folhas-d'olho-branco
Premnoplex brunnescens	corre-ramos-malhado
Premnoplex tatei	corre-ramos-de-garganta-branca
Margarornis bellulus	corre-ramos-bonito
Margarornis rubiginosus	corre-ramos-corado
Margarornis stellatus	corre-ramos-estrelado
Margarornis squamiger	corre-ramos-perlado
Aphrastura spinicauda	rabudinho-de-sobrancelha-laranja
Aphrastura masafuerae	rabudinho-de-más-afuera
Sylviorthorhynchus desmurii	rabudinho-rabilongo
Sylviorthorhynchus yanacensis	rabudinho-fulvo
Leptasthenura fuliginiceps	rabudinho-de-barrete-castanho
Leptasthenura platensis	rabudinho-de-poupa
Leptasthenura aegithaloides	rabudinho-de-cauda-preta
Leptasthenura striolata	rabudinho-catarinense
Leptasthenura pileata	rabudinho-de-coroa-ruiva
Leptasthenura xenothorax	rabudinho-de-sobrancelha-branca
Leptasthenura striata	rabudinho-de-manto-riscado
Leptasthenura andicola	rabudinho-andino
Leptasthenura setaria	rabudinho-das-araucárias
Phacellodomus rufifrons	espinheiro-de-testa-ruiva

Phacellodomus inornatus	espinheiro-liso
Phacellodomus striaticeps	espinheiro-de-testa-riscada
Phacellodomus sibilatrix	espinheiro-pequeno
Phacellodomus dorsalis	espinheiro-de-dorso-castanho
Phacellodomus maculipectus	espinheiro-pintalgado
Phacellodomus striaticollis	espinheiro-sardento
Phacellodomus ruber	espinheiro-grande
Phacellodomus erythrophthalmus	espinheiro-d'olho-laranja
Phacellodomus ferrugineigula	espinheiro-de-peito-laranja
Hellmayrea gularis	rabo-espinhoso-de-sobrancelha
Anumbius annumbi	espinheiro-lenhador
Coryphistera alaudina	espinheiro-de-crista
Asthenes dorbignyi	cesteiro-creme
Asthenes arequipae	cesteiro-de-arequipa
Asthenes huancavelicae	cesteiro-de-huancavelica
Asthenes berlepschi	cesteiro-do-illampu
Asthenes baeri	cesteiro-de-bico-curto
Asthenes luizae	cesteiro-do-cipó
Asthenes hudsoni	cesteiro-das-pampas
Asthenes anthoides	cesteiro-austral
Asthenes urubambensis	cesteiro-de-testa-riscada
Asthenes flammulata	cesteiro-flamulado
Asthenes virgata	cesteiro-de-junín
Asthenes maculicauda	cesteiro-estriado
Asthenes wyatti	cesteiro-de-dorso-riscado
Asthenes humilis	cesteiro-de-garganta-riscada
Asthenes modesta	cesteiro-pálido
Asthenes moreirae	rabo-espinhoso-de-itatiaia
Asthenes pyrrholeuca	cesteiro-de-bico-pontiagudo
Asthenes harterti	rabo-espinhoso-de-garganta-preta
Asthenes helleri	rabo-espinhoso-da-puna
Asthenes vilcabambae	rabo-espinhoso-de-vilcabamba
Asthenes ayacuchensis	rabo-espinhoso-de-ayacucho
Asthenes pudibunda	cesteiro-peruano
Asthenes ottonis	cesteiro-de-testa-ruiva
Asthenes heterura	cesteiro-de-iquico
Asthenes palpebralis	rabo-espinhoso-de-junín
Asthenes coryi	rabo-espinhoso-de-mérida
Asthenes perijana	rabo-espinhoso-de-perijá
Asthenes fuliginosa	rabo-espinhoso-de-queixo-branco
Asthenes griseomurina	rabo-espinhoso-pardo
Acrobatornis fonsecai	graveteiro-acrobata

Metopothrix aurantiaca	limpa-folhas-amarelo
Xenerpestes minlosi	graveteiro-de-banda-dupla
Xenerpestes singularis	graveteiro-equatoriano
Siptornis striaticollis	rabo-espinhoso-d'óculos
Roraimia adusta	rabo-espinhoso-do-roraima
Thripophaga gutturata	rabo-espinhoso-pintalgado
Thripophaga macroura	cauda-suave-estriado
Thripophaga cherriei	cauda-suave-do-orinoco
Thripophaga amacurensis	cauda-suave-do-amacuro
Thripophaga fusciceps	cauda-suave-liso
Limnoctites rectirostris	trepa-caniços-de-bico-direito
Limnoctites sulphuriferus	rabo-espinhoso-dos-pauis
Cranioleuca berlepschi	rabo-espinhoso-de-dorso-ruivo
Cranioleuca weskei	rabo-espinhoso-de-coroa-branca
Cranioleuca marcapatae	rabo-espinhoso-de-marcapata
Cranioleuca albiceps	rabo-espinhoso-de-coroa-clara
Cranioleuca vulpina	rabo-espinhoso-vulpino
Cranioleuca dissita	rabo-espinhoso-de-coiba
Cranioleuca vulpecula	rabo-espinhoso-dos-rios
Cranioleuca subcristata	rabo-espinhoso-venezuelano
Cranioleuca pyrrhophia	rabo-espinhoso-meridional
Cranioleuca henricae	rabo-espinhoso-boliviano
Cranioleuca obsoleta	rabo-espinhoso-oliváceo
Cranioleuca pallida	rabo-espinhoso-pálido
Cranioleuca semicinerea	rabo-espinhoso-de-cabeça-cinzenta
Cranioleuca albicapilla	rabo-espinhoso-de-crista
Cranioleuca erythrops	rabo-espinhoso-de-faces-ruivas
Cranioleuca demissa	rabo-espinhoso-dos-tepuis
Cranioleuca hellmayri	rabo-espinhoso-de-coroa-riscada
Cranioleuca curtata	rabo-espinhoso-montês
Cranioleuca antisiensis	rabo-espinhoso-de-faces-riscadas
Cranioleuca muelleri	rabo-espinhoso-escamoso
Pseudasthenes humicola	cesteiro-chileno
Pseudasthenes patagonica	cesteiro-patagónico
Pseudasthenes steinbachi	cesteiro-castanho
Pseudasthenes cactorum	cesteiro-dos-cactos
Spartonoica maluroides	trepa-caniços-pequeno
Pseudoseisura cristata	cacholote-da-caatinga
Pseudoseisura unirufa	cacholote-de-crista-cinzenta
Pseudoseisura lophotes	cacholote-castanho
Pseudoseisura gutturalis	cacholote-de-garganta-branca
Certhiaxis cinnamomeus	rabo-espinhoso-de-queixo-amarelo

Certhiaxis mustelinus	rabo-espinhoso-branco-e-ruivo
Mazaria propinqua	rabo-espinhoso-de-barriga-branca
Schoeniophylax phryganophilus	rabo-espinhoso-chotoi
Synallaxis scutata	rabo-espinhoso-ocre
Synallaxis cinerascens	rabo-espinhoso-cinzento
Synallaxis gujanensis	rabo-espinhoso-de-coroa-lisa
Synallaxis simoni	rabo-espinhoso-do-araguaia
Synallaxis albilora	rabo-espinhoso-de-loros-brancos
Synallaxis maranonica	rabo-espinhoso-do-maranhão
Synallaxis hypochondriaca	rabo-espinhoso-grande
Synallaxis chinchipensis	rabo-espinhoso-do-chinchipe
Synallaxis stictothorax	rabo-espinhoso-de-colar
Synallaxis zimmeri	rabo-espinhoso-de-ancash
Synallaxis brachyura	rabo-espinhoso-ardósia
Synallaxis subpudica	rabo-espinhoso-de-cundinamarca
Synallaxis hellmayri	rabo-espinhoso-d'ombros-ruivos
Synallaxis ruficapilla	rabo-espinhoso-de-coroa-ruiva
Synallaxis cinerea	rabo-espinhoso-baiano
Synallaxis infuscata	rabo-espinhoso-nordestino
Synallaxis moesta	rabo-espinhoso-sombrio
Synallaxis macconnelli	rabo-espinhoso-de-mcconell
Synallaxis cabanisi	rabo-espinhoso-de-cabanis
Synallaxis hypospodia	rabo-espinhoso-grilo
Synallaxis spixi	rabo-espinhoso-teneném
Synallaxis albigularis	rabo-espinhoso-de-peito-escuro
Synallaxis beverlyae	rabo-espinhoso-do-orinoco
Synallaxis albescens	rabo-espinhoso-de-peito-pálido
Synallaxis frontalis	rabo-espinhoso-de-testa-cinzenta
Synallaxis azarae	rabo-espinhoso-de-azara
Synallaxis courseni	rabo-espinhoso-do-apurímac
Synallaxis candei	rabo-espinhoso-de-bigodes
Synallaxis erythrothorax	rabo-espinhoso-de-peito-ruivo
Synallaxis kollari	rabo-espinhoso-grisalho
Synallaxis tithys	rabo-espinhoso-de-cabeça-escura
Synallaxis fuscorufa	rabo-espinhoso-de-santa-marta
Synallaxis unirufa	rabo-espinhoso-ruivo
Synallaxis castanea	rabo-espinhoso-de-caracas
Synallaxis cinnamomea	rabo-espinhoso-de-peito-estriado
Synallaxis rutilans	rabo-espinhoso-ferruginoso
Synallaxis cherriei	rabo-espinhoso-de-garganta-castanha

Thamnophilidae Formigueiros, Formigueirinhos e afins

Esta diversa família inclui uma série de passeriformes insectívoros de pequena e média dimensão, que podem ser encontrados em bosques tropicais, principalmente ao nível do solo e nos estratos inferiores da vegetação. O seu nome deve-se aos hábitos de algumas espécies (na verdade uma minoria), que se especializaram em seguir grupos de formigas legionárias pela floresta, alimentando-se de insectos e pequenos vertebrados afugentados pela passagem das formigas.

Espécies: 240

Distribuição: América tropical

Euchrepomis callinota	formigueirinho-d'uropígio-ruivo
Euchrepomis humeralis	formigueirinho-d'ombros-ruivos
Euchrepomis sharpei	formigueirinho-d'uropígio-amarelo
Euchrepomis spodioptila	formigueirinho-d'asa-cinzenta
Myrmornis torquata	formigueiro-de-franjas
Pygiptila stellaris	formigueiro-estrelado
Thamnistes anabatinus	formigueiro-fulvo
Thamnistes rufescens	formigueiro-ruivo
Microrhopias quixensis	formigueirinho-de-pontas-brancas
Neoctantes niger	formigueiro-cinzel-preto
Clytoctantes alixii	formigueiro-cinzel-colombiano
Clytoctantes atrogularis	formigueiro-rondoniense
Epinecrophylla fulviventris	formigueirinho-de-barriga-fulva
Epinecrophylla gutturalis	formigueirinho-de-barriga-parda
Epinecrophylla leucophthalma	formigueirinho-d'olho-branco
Epinecrophylla haematonota	formigueirinho-de-garganta-ponteada
Epinecrophylla amazonica	formigueirinho-do-rio-madeira
Epinecrophylla spodionota	formigueirinho-das-colinas
Epinecrophylla ornata	formigueirinho-adornado
Epinecrophylla erythrura	formigueirinho-de-cauda-ruiva
Myrmorchilus strigilatus	formigueiro-de-dorso-riscado
Aprositornis disjuncta	formigueiro-do-yapacana
Ammonastes pelzelni	formigueiro-de-barriga-cinzenta
Myrmophylax atrothorax	formigueiro-de-garganta-preta
Myrmotherula ignota	formigueirinho-de-bigodes
Myrmotherula brachyura	formigueirinho-pigmeu
Myrmotherula surinamensis	formigueirinho-guianense

Myrmotherula multostriata	formigueirinho-amazónico
Myrmotherula pacifica	formigueirinho-do-pacífico
Myrmotherula cherriei	formigueirinho-de-cherrie
Myrmotherula klagesi	formigueirinho-do-tapajós
Myrmotherula longicauda	formigueirinho-estriado-andino
Myrmotherula ambigua	formigueirinho-de-garganta-amarela
Myrmotherula sclateri	formigueirinho-de-sclater
Myrmotherula axillaris	formigueirinho-de-flancos-brancos
Myrmotherula luctuosa	formigueirinho-de-flancos-prateados
Myrmotherula schisticolor	formigueirinho-ardósia
Myrmotherula sunensis	formigueirinho-do-suno
Myrmotherula minor	formigueirinho-pequeno
Myrmotherula longipennis	formigueirinho-d'asa-longa
Myrmotherula urosticta	formigueirinho-atlântico
Myrmotherula iheringi	formigueirinho-de-ihering
Myrmotherula fluminensis	formigueirinho-carioca
Myrmotherula grisea	formigueirinho-dos-yungas
Myrmotherula unicolor	formigueirinho-unicolor
Myrmotherula snowi	formigueirinho-alagoano
Myrmotherula behni	formigueirinho-de-behn
Myrmotherula menetriesii	formigueirinho-cinzento
Myrmotherula assimilis	formigueirinho-da-várzea
Terenura maculata	formigueirinho-de-cabeça-riscada
Terenura sicki	formigueirinho-de-barriga-laranja
Myrmochanes hemileucus	formigueiro-alvinegro
Formicivora iheringi	formigueirinho-de-bico-fino
Formicivora erythronotos	formigueirinho-de-capuz
Formicivora grisea	formigueirinho-de-franjas-meridional
Formicivora intermedia	formigueirinho-de-franjas-setentrional
Formicivora serrana	formigueirinho-serrano
Formicivora melanogaster	formigueirinho-de-barriga-preta
Formicivora rufa	formigueirinho-de-dorso-ruivo
Formicivora grantsaui	formigueirinho-do-sincorá
Formicivora acutirostris	formigueirinho-dos-pântanos
Dichrozona cincta	formigueiro-bandado
Rhopias gularis	formigueirinho-de-garganta-estrelada
Isleria hauxwelli	formigueirinho-de-garganta-lisa
Isleria guttata	formigueirinho-de-barriga-ruiva
Thamnomanes ardesiacus	formigueiro-sombrio
Thamnomanes saturninus	formigueiro-saturnino
Thamnomanes caesius	formigueiro-cinzento-grande
Thamnomanes schistogynus	formigueiro-azulado
Megastictus margaritatus	formigueiro-perlado
Sakesphoroides cristatus	formigueiro-nordestino
Herpsilochmus pileatus	formigueirinho-baiano
Herpsilochmus sellowi	formigueirinho-da-caatinga
Herpsilochmus atricapillus	formigueirinho-de-barrete-preto
Herpsilochmus stotzi	formigueirinho-do-aripuanã

Herpsilochmus praedictus	formigueirinho-do-purus
Herpsilochmus motacilloides	formigueirinho-de-barriga-creme
Herpsilochmus parkeri	formigueirinho-de-parker
Herpsilochmus sticturus	formigueirinho-de-cauda-ponteada
Herpsilochmus dugandi	formigueirinho-de-dugand
Herpsilochmus stictocephalus	formigueirinho-de-todd
Herpsilochmus dorsimaculatus	formigueirinho-de-dorso-manchado
Herpsilochmus roraimae	formigueirinho-do-roraima
Herpsilochmus pectoralis	formigueirinho-peitoral
Herpsilochmus longirostris	formigueirinho-de-bico-comprido
Herpsilochmus gentryi	formigueirinho-de-gentry
Herpsilochmus axillaris	formigueirinho-de-peito-amarelo
Herpsilochmus frater	formigueirinho-d'asa-ruiva
Herpsilochmus rufimarginatus	formigueirinho-d'orlas-ruivas
Dysithamnus stictothorax	formigueiro-amarelo
Dysithamnus mentalis	formigueiro-víreo
Dysithamnus striaticeps	formigueiro-de-peito-estriado
Dysithamnus puncticeps	formigueiro-do-chocó
Dysithamnus xanthopterus	formigueiro-de-dorso-ruivo
Dysithamnus occidentalis	formigueiro-ocidental
Dysithamnus plumbeus	formigueiro-de-espírito-santo
Dysithamnus leucostictus	formigueiro-de-listas-brancas
Thamnophilus bernardi	formigueiro-de-coleira
Thamnophilus shumbae	formigueiro-do-maranhão
Thamnophilus melanonotus	formigueiro-de-dorso-preto
Thamnophilus melanothorax	formigueiro-de-cauda-bandada
Thamnophilus doliatus	formigueiro-barrado
Thamnophilus zarumae	formigueiro-de-tumbes
Thamnophilus multistriatus	formigueiro-de-crista-barrada
Thamnophilus tenuepunctatus	formigueiro-vermiculado
Thamnophilus palliatus	formigueiro-de-dorso-castanho
Thamnophilus bridgesi	formigueiro-de-bridges
Thamnophilus nigriceps	formigueiro-preto-grande
Thamnophilus praecox	formigueiro-do-napo
Thamnophilus nigrocinereus	formigueiro-preto-e-cinzento
Thamnophilus cryptoleucus	formigueiro-de-castelnau
Thamnophilus aethiops	formigueiro-d'ombros-ponteados
Thamnophilus unicolor	formigueiro-unicolor
Thamnophilus schistaceus	formigueiro-d'olho-vermelho
Thamnophilus murinus	formigueiro-murino
Thamnophilus aroyae	formigueiro-montês
Thamnophilus atrinucha	formigueiro-de-barrete-preto

Thamnophilus punctatus	formigueiro-ardósia-setentrional
Thamnophilus stictocephalus	formigueiro-ardósia-de-natterer
Thamnophilus sticturus	formigueiro-ardósia-boliviano
Thamnophilus pelzelni	formigueiro-ardósia-do-planalto
Thamnophilus ambiguus	formigueiro-ardósia-de-sooretama
Thamnophilus amazonicus	formigueiro-amazónico
Thamnophilus divisorius	formigueiro-acreano
Thamnophilus insignis	formigueiro-insigne
Thamnophilus caerulescens	formigueiro-variável
Thamnophilus torquatus	formigueiro-do-cerrado
Thamnophilus ruficapillus	formigueiro-de-barrete-ruivo
Sakesphorus pulchellus	formigueiro-de-testa-riscada
Sakesphorus canadensis	formigueiro-de-crista-preta
Sakesphorus luctuosus	formigueiro-reluzente
Radinopsyche sellowi	formigueirinho-da-caatinga
Biatas nigropectus	formigueiro-de-barbas-brancas
Cymbilaimus lineatus	formigueiro-de-bico-grosso
Cymbilaimus sanctaemariae	formigueiro-do-bambu
Taraba major	formigueiro-grande
Mackenziaena leachii	formigueiro-rabilongo
Mackenziaena severa	formigueiro-de-crista-atlântico
Frederickena viridis	formigueiro-guianense
Frederickena unduliger	formigueiro-ondulado-oriental
Frederickena fulva	formigueiro-ondulado-ocidental
Hypoedaleus guttatus	formigueiro-carijó
Batara cinerea	formigueiro-gigante
Xenornis setifrons	formigueiro-panamense
Pithys albifrons	formigueiro-de-pluma
Pithys castaneus	formigueiro-mascarado
Phaenostictus mcleannani	formigueiro-ocelado
Gymnopithys bicolor	formigueiro-bicolor
Gymnopithys leucaspis	formigueiro-de-faces-brancas
Gymnopithys rufigula	formigueiro-de-garganta-ruiva
Oneillornis salvini	formigueiro-de-garganta-branca
Oneillornis lunulatus	formigueiro-lunulado
Rhegmatorhina gymnops	formigueiro-d'olho-calvo
Rhegmatorhina berlepschi	formigueiro-arlequim
Rhegmatorhina hoffmannsi	formigueiro-de-peito-branco
Rhegmatorhina cristata	formigueiro-de-crista-castanha
Rhegmatorhina melanosticta	formigueiro-cabeludo
Phlegopsis nigromaculata	formigueiro-pintalgado
Phlegopsis erythroptera	formigueiro-d'asa-ruiva

Phlegopsis borbae	formigueiro-de-faces-pálidas
Willisornis poecilinotus	formigueiro-de-dorso-escamoso
Willisornis vidua	formigueiro-do-xingu
Drymophila ferruginea	formigueiro-ferrugíneo
Drymophila rubricollis	formigueiro-de-bertoni
Drymophila genei	formigueiro-de-cauda-ruiva
Drymophila ochropyga	formigueiro-d'uropígio-ocre
Drymophila malura	formigueiro-estriado-oriental
Drymophila squamata	formigueiro-escamoso
Drymophila devillei	formigueiro-estriado-ocidental
Drymophila hellmayri	formigueiro-de-santa-marta
Drymophila klagesi	formigueiro-de-perijá
Drymophila caudata	formigueiro-de-santander
Drymophila striaticeps	formigueiro-estriado-andino
Hypocnemis cantator	formigueiro-cantor-guianense
Hypocnemis flavescens	formigueiro-cantor-sulfúreo
Hypocnemis peruviana	formigueiro-cantor-peruano
Hypocnemis subflava	formigueiro-cantor-amarelo
Hypocnemis ochrogyna	formigueiro-cantor-rondoniense
Hypocnemis striata	formigueiro-cantor-de-spix
Hypocnemis rondoni	formigueiro-cantor-do-manicoré
Hypocnemis hypoxantha	formigueiro-de-sobrancelha-amarela
Sciaphylax hemimelaena	formigueiro-de-cauda-castanha
Sciaphylax castanea	formigueiro-de-zimmer
Cercomacroides laeta	formigueiro-de-willis
Cercomacroides parkeri	formigueiro-de-parker
Cercomacroides nigrescens	formigueiro-escuro
Cercomacroides fuscicauda	formigueiro-ribeirinho
Cercomacroides tyrannina	formigueiro-tirano
Cercomacroides serva	formigueiro-preto-pequeno
Cercomacra manu	formigueiro-do-manu
Cercomacra brasiliana	formigueiro-atlântico
Cercomacra cinerascens	formigueiro-cinzento-pequeno
Cercomacra melanaria	formigueiro-do-pantanal
Cercomacra ferdinandi	formigueiro-do-bananal
Cercomacra nigricans	formigueiro-azeviche
Cercomacra carbonaria	formigueiro-do-rio-branco
Myrmoderus ferrugineus	formigueiro-de-dorso-ferrugíneo
Myrmoderus eowilsoni	formigueiro-da-cordilheira-azul
Myrmoderus ruficauda	formigueiro-de-grinaldas
Myrmoderus loricatus	formigueiro-de-bibe-setentrional
Myrmoderus squamosus	formigueiro-de-bibe-meridional

Hypocnemoides melanopogon	formigueiro-de-queixo-preto
Hypocnemoides maculicauda	formigueiro-solta-asa
Hylophylax naevioides	formigueiro-maculado
Hylophylax naevius	formigueiro-de-dorso-pintalgado
Hylophylax punctulatus	formigueiro-da-várzea
Sclateria naevia	formigueiro-prateado
Myrmelastes hyperythrus	formigueiro-plúmbeo
Myrmelastes schistaceus	formigueiro-do-alto-amazonas
Myrmelastes leucostigma	formigueiro-d'asa-ponteada
Myrmelastes humaythae	formigueiro-de-humaitá
Myrmelastes brunneiceps	formigueiro-de-cabeça-castanha
Myrmelastes rufifacies	formigueiro-do-tapajós
Myrmelastes saturatus	formigueiro-do-roraima
Myrmelastes caurensis	formigueiro-do-caura
Poliocrania exsul	formigueiro-assobiador
Ampelornis griseiceps	formigueiro-de-cabeça-cinzenta
Sipia berlepschi	formigueiro-de-cauda-curta
Sipia nigricauda	formigueiro-de-esmeraldas
Sipia palliata	formigueiro-do-magdalena
Sipia laemosticta	formigueiro-de-peito-preto
Myrmeciza longipes	formigueiro-de-barriga-branca
Myrmoborus melanurus	formigueiro-de-cauda-preta
Myrmoborus lophotes	formigueiro-de-crista-peruano
Myrmoborus myotherinus	formigueiro-de-faces-pretas
Myrmoborus leucophrys	formigueiro-de-sobrancelha-branca
Myrmoborus lugubris	formigueiro-do-rio-amazonas
Gymnocichla nudiceps	formigueiro-calvo
Pyriglena maura	olho-de-fogo-ocidental
Pyriglena similis	olho-de-fogo-do-tapajós
Pyriglena leuconota	olho-de-fogo-oriental
Pyriglena atra	olho-de-fogo-baiano
Pyriglena leucoptera	olho-de-fogo-d'asa-branca
Rhopornis ardesiacus	formigueiro-esbelto
Percnostola rufifrons	formigueiro-de-cabeça-preta
Percnostola arenarum	formigueiro-do-allpahuayo
Akletos melanoceps	formigueiro-d'ombros-brancos
Akletos goeldii	formigueiro-de-goeldi
Hafferia fortis	formigueiro-fuliginoso
Hafferia immaculata	formigueiro-imaculado
Hafferia zeledoni	formigueiro-de-zeledón

Formicariidae — Tordos-formigueiros

O nome destas aves alude às proporções corporais algo semelhantes às dos tordos, embora com uma cauda mais curta. O termo "formigueiro" indica, mais do que um hábito de seguir formigas legionárias, a proximidade taxonómica com a família anterior. Os tordos-formigueiros ocupam florestas tropicais densas, onde nidificam em cavidades nas árvores e se movimentam pelo solo em busca de invertebrados, o seu principal alimento. São difíceis de detectar sem ajuda das suas características vocalizações.

Espécies: 12

Distribuição: América tropical

Formicarius colma	tordo-formigueiro-de-barrete
Formicarius analis	tordo-formigueiro-mascarado
Formicarius moniliger	tordo-formigueiro-mexicano
Formicarius rufifrons	tordo-formigueiro-de-testa-ruiva
Formicarius nigricapillus	tordo-formigueiro-de-cabeça-preta
Formicarius rufipectus	tordo-formigueiro-de-peito-ruivo
Chamaeza campanisona	tordo-formigueiro-de-cauda-curta
Chamaeza nobilis	tordo-formigueiro-estriado
Chamaeza meruloides	tordo-formigueiro-críptico
Chamaeza ruficauda	tordo-formigueiro-de-cauda-ruiva
Chamaeza turdina	tordo-formigueiro-de-schwartz
Chamaeza mollissima	tordo-formigueiro-barrado

Grallariidae — Pitas-formigueiras

Estas aves devem o seu nome por um lado à semelhança morfológica com as pitas do Velho Mundo, por outro à sua proximidade evolutiva com os formigueiros da família Thamnophilidae. Na verdade, nenhuma destas espécies segue grupos de formigas legionárias. Habitam no solo da floresta, saltitando com as suas longas patas, cauda extremamente curta e postura erecta, em busca de invertebrados na manta morta. São muito esquivas e, por isso, mais facilmente detectadas através das suas poderosas vocalizações.

Espécies: 70

Distribuição: América tropical

Grallaria squamigera	pita-formigueira-ondulada
Grallaria gigantea	pita-formigueira-gigante
Grallaria excelsa	pita-formigueira-grande
Grallaria varia	pita-formigueira-pintada
Grallaria alleni	pita-formigueira-de-bigodes
Grallaria guatimalensis	pita-formigueira-escamosa
Grallaria chthonia	pita-formigueira-de-táchira
Grallaria haplonota	pita-formigueira-de-dorso-liso
Grallaria dignissima	pita-formigueira-do-napo
Grallaria eludens	pita-formigueira-do-ucayali
Grallaria ruficapilla	pita-formigueira-de-cabeça-ruiva
Grallaria watkinsi	pita-formigueira-de-tumbes
Grallaria bangsi	pita-formigueira-de-santa-marta
Grallaria kaestneri	pita-formigueira-de-cundinamarca
Grallaria andicolus	pita-formigueira-andina
Grallaria griseonucha	pita-formigueira-de-nuca-cinzenta
Grallaria ridgelyi	pita-formigueira-de-jocotoco
Grallaria nuchalis	pita-formigueira-de-nuca-castanha
Grallaria carrikeri	pita-formigueira-de-bico-pálido
Grallaria albigula	pita-formigueira-de-garganta-branca
Grallaria flavotincta	pita-formigueira-de-peito-amarelo
Grallaria hypoleuca	pita-formigueira-de-barriga-branca
Grallaria przewalskii	pita-formigueira-do-rio-abiseo
Grallaria capitalis	pita-formigueira-de-huánuco
Grallaria erythroleuca	pita-formigueira-de-cuzco
Grallaria spatiator	pita-formigueira-de-macotama
Grallaria saltuensis	pita-formigueira-de-perijá
Grallaria rufula	pita-formigueira-muisca

Grallaria rufocinerea	pita-formigueira-bicolor
Grallaria alvarezi	pita-formigueira-chami
Grallaria saturata	pita-formigueira-ruiva
Grallaria cajamarcae	pita-formigueira-de-cajamarca
Grallaria blakei	pita-formigueira-castanha
Grallaria gravesi	pita-formigueira-de-chachapoyas
Grallaria oneilli	pita-formigueira-de-panao
Grallaria obscura	pita-formigueira-de-junín
Grallaria centralis	pita-formigueira-de-oxapampa
Grallaria ayacuchensis	pita-formigueira-de-ayacucho
Grallaria occabambae	pita-formigueira-do-urubamba
Grallaria sinaensis	pita-formigueira-de-puno
Grallaria cochabambae	pita-formigueira-boliviana
Grallaria quitensis	pita-formigueira-do-páramo
Grallaria alticola	pita-formigueira-de-boiacá
Grallaria atuensis	pita-formigueira-de-atuén
Grallaria milleri	pita-formigueira-de-coleira-castanha
Grallaria urraoensis	pita-formigueira-de-urrao
Grallaria erythrotis	pita-formigueira-de-faces-ruivas
Cryptopezus nattereri	pita-formigueira-de-natterer
Hylopezus perspicillatus	pita-formigueira-estriada
Hylopezus macularius	pita-formigueira-pintalgada
Hylopezus paraensis	pita-formigueira-paraense
Hylopezus whittakeri	pita-formigueira-de-alta-floresta
Hylopezus auricularis	pita-formigueira-mascarada
Hylopezus ochroleucus	pita-formigueira-de-sobrancelha
Myrmothera fulviventris	pita-formigueira-de-loros-brancos
Myrmothera berlepschi	pita-formigueira-amazónica
Myrmothera dives	pita-formigueira-de-flancos-ruivos
Myrmothera simplex	pita-formigueira-dos-tepuis
Myrmothera campanisona	pita-formigueira-toca-sino
Myrmothera subcanescens	pita-formigueira-do-tapajós
Grallaricula flavirostris	pita-formigueira-ocrácea
Grallaricula loricata	pita-formigueira-lorigada
Grallaricula cucullata	pita-formigueira-de-capuz
Grallaricula peruviana	pita-formigueira-peruana
Grallaricula ochraceifrons	pita-formigueira-de-testa-ocre
Grallaricula ferrugineipectus	pita-formigueira-de-peito-ruivo
Grallaricula leymebambae	pita-formigueira-de-leymebamba
Grallaricula nana	pita-formigueira-anã
Grallaricula cumanensis	pita-formigueira-de-sucre
Grallaricula lineifrons	pita-formigueira-de-meia-lua

Conopophagidae — Papa-mosquitos e afins

Esta família compreende os papa-mosquitos e duas espécies pouco conhecidas de pitas-formigueiras que lhes são mais próximas do que às restantes pitas-formigueiras (na família Grallariidae). São aves insectívoras e habitam bosques tropicais densos. Os papa-mosquitos têm uma aparência semelhante às aves da família Grallariidae, mas em vez de saltitar pelo solo, alimentam-se nos ramos mais baixos da vegetação florestal, ocasionalmente capturando presas no chão.

Espécies: 12

Distribuição: Panamá e metade norte da América do Sul

Conopophaga lineata	papa-mosquitos-ruivo
Conopophaga aurita	papa-mosquitos-de-peito-ruivo
Conopophaga snethlageae	papa-mosquitos-de-peito-preto
Conopophaga roberti	papa-mosquitos-de-capuz
Conopophaga peruviana	papa-mosquitos-peruano
Conopophaga cearae	papa-mosquitos-cearense
Conopophaga ardesiaca	papa-mosquitos-ardósia
Conopophaga castaneiceps	papa-mosquitos-de-coroa-castanha
Conopophaga melanops	papa-mosquitos-de-mascarilha
Conopophaga melanogaster	papa-mosquitos-de-barriga-preta
Pittasoma michleri	pita-formigueira-de-barrete-preto
Pittasoma rufopileatum	pita-formigueira-de-barrete-ruivo

Rhinocryptidae — Tapaculos e afins

Estas pequenas aves insectívoras, provavelmente as mais discretas da avifauna sul-americana, movimentam-se como pequenos ratos, rente ao solo de florestas, matos ou prados, raramente voando. A sua presença faz-se notar pelos seus cantos repetitivos e de volume surpreendentemente alto. Ainda há muito para descobrir sobre as aves desta família, com várias espécies descritas recentemente, principalmente devido a diferenças nas vocalizações.

Espécies: 65

Distribuição: América do Sul

Acropternis orthonyx	tapaculo-ocelado
Pteroptochos castaneus	huet-huet-de-garganta-castanha
Pteroptochos tarnii	huet-huet-de-garganta-preta
Pteroptochos megapodius	huet-huet-de-bigodes
Scelorchilus albicollis	tapaculo-de-garganta-branca
Scelorchilus rubecula	tapaculo-de-peito-ruivo
Rhinocrypta lanceolata	tapaculo-de-crista
Teledromas fuscus	tapaculo-das-areias
Liosceles thoracicus	tapaculo-amazónico
Psilorhamphus guttatus	tapaculo-carriça
Merulaxis ater	tapaculo-entufado-comum
Merulaxis stresemanni	tapaculo-entufado-baiano
Eugralla paradoxa	tapaculo-de-flancos-ocres
Myornis senilis	tapaculo-cinza
Eleoscytalopus indigoticus	tapaculo-de-peito-branco
Eleoscytalopus psychopompus	tapaculo-baiano
Scytalopus iraiensis	tapaculo-palustre
Scytalopus diamantinensis	tapaculo-da-chapada
Scytalopus novacapitalis	tapaculo-de-brasília
Scytalopus petrophilus	tapaculo-das-rochas
Scytalopus pachecoi	tapaculo-de-pacheco
Scytalopus gonzagai	tapaculo-de-boa-nova
Scytalopus speluncae	tapaculo-preto-brasileiro
Scytalopus fuscus	tapaculo-preto-chileno
Scytalopus magellanicus	tapaculo-de-magalhães
Scytalopus affinis	tapaculo-de-ancash
Scytalopus krabbei	tapaculo-d'asa-branca
Scytalopus androstictus	tapaculo-de-loja
Scytalopus opacus	tapaculo-do-páramo
Scytalopus canus	tapaculo-de-paramillo

Scytalopus superciliaris	tapaculo-de-sobrancelha
Scytalopus zimmeri	tapaculo-de-zimmer
Scytalopus simonsi	tapaculo-da-puna
Scytalopus schulenbergi	tapaculo-diademado
Scytalopus urubambae	tapaculo-de-vilcabamba
Scytalopus whitneyi	tapaculo-de-ampay
Scytalopus frankeae	tapaculo-da-jalca
Scytalopus altirostris	tapaculo-da-neblina
Scytalopus parvirostris	tapaculo-trinador
Scytalopus bolivianus	tapaculo-boliviano
Scytalopus atratus	tapaculo-de-coroa-branca
Scytalopus sanctaemartae	tapaculo-de-santa-marta
Scytalopus micropterus	tapaculo-rabilongo
Scytalopus femoralis	tapaculo-de-coxas-ruivas
Scytalopus intermedius	tapaculo-do-utcubamba
Scytalopus macropus	tapaculo-patudo
Scytalopus gettyae	tapaculo-de-junín
Scytalopus unicolor	tapaculo-unicolor
Scytalopus acutirostris	tapaculo-de-tschudi
Scytalopus latrans	tapaculo-escuro
Scytalopus argentifrons	tapaculo-de-testa-prateada
Scytalopus vicinior	tapaculo-de-nariño
Scytalopus panamensis	tapaculo-do-tacarcuna
Scytalopus chocoensis	tapaculo-do-chocó
Scytalopus rodriguezi	tapaculo-do-alto-magdalena
Scytalopus stilesi	tapaculo-de-stiles
Scytalopus alvarezlopezi	tapaculo-de-tatamá
Scytalopus robbinsi	tapaculo-de-el-oro
Scytalopus caracae	tapaculo-de-caracas
Scytalopus griseicollis	tapaculo-de-barriga-pálida
Scytalopus latebricola	tapaculo-de-flancos-castanhos
Scytalopus perijanus	tapaculo-de-perijá
Scytalopus meridanus	tapaculo-de-mérida
Scytalopus parkeri	tapaculo-do-bambu
Scytalopus spillmanni	tapaculo-de-spillmann

Melanopareiidae — Peitos-de-lua

Esta família reúne um grupo de espécies relativamente pouco conhecidas, cujo nome deriva da marca preta em forma de crescente lunar no seu peito. São aves principalmente insectívoras, aparentadas taxonomicamente aos tapaculos mas com caudas mais compridas. O seu habitat preferencial são bosques tropicais secos ou zonas de matos, como os que ocorrem no interior do Brasil ou em vales isolados da cordilheira dos Andes.

Espécies: 4

Distribuição: América do Sul

Melanopareia torquata	peito-de-lua-brasileiro
Melanopareia maximiliani	peito-de-lua-do-chaco
Melanopareia maranonica	peito-de-lua-do-maranhão
Melanopareia elegans	peito-de-lua-elegante

Tyrannidae Caça-moscas, Tiranos e afins

Os tiranídeos são a maior família de aves do mundo. Frequentemente difíceis de identificar, estas aves insectívoras podem ser vistas e ouvidas em praticamente qualquer tipo de habitat das Américas. Embora haja espaço nesta família para uma grande variedade de aparências e comportamentos, os tiranídeos tendem a ter uma cabeça grande, tons amarelos ou esverdeados e uma postura erecta. Muitos deles capturam insectos em curtos voos a partir de um poiso, de forma semelhante aos papa-moscas do Velho Mundo.

Espécies: 445

Distribuição: Américas

Piprites griseiceps	piprites-de-cabeça-cinzenta
Piprites chloris	piprites-verde
Piprites pileata	piprites-de-barrete
Phyllomyias virescens	tiraninho-esverdeado-meridional
Phyllomyias reiseri	tiraninho-de-reiser
Phyllomyias urichi	tiraninho-de-sucre
Phyllomyias sclateri	tiraninho-de-sclater
Phyllomyias weedeni	tiraninho-dos-yungas
Phyllomyias fasciatus	tiraninho-do-planalto
Phyllomyias griseiceps	tiraninho-de-cabeça-fuliginosa
Phyllomyias plumbeiceps	tiraninho-de-coroa-plúmbea
Phyllomyias griseocapilla	tiraninho-de-coroa-cinzenta
Acrochordopus burmeisteri	tiraninho-de-burmeister
Acrochordopus zeledoni	tiraninho-de-testa-branca
Tyranniscus nigrocapillus	tiraninho-de-barrete-preto
Tyranniscus cinereiceps	tiraninho-de-cabeça-cinzenta
Tyranniscus uropygialis	tiraninho-d'uropígio-ruivo
Tyrannulus elatus	tiraninho-coroado
Myiopagis gaimardii	elénia-florestal
Myiopagis parambae	elénia-do-chocó
Myiopagis cinerea	elénia-amazónica
Myiopagis caniceps	elénia-de-cabeça-cinzenta
Myiopagis olallai	elénia-das-colinas
Myiopagis subplacens	elénia-do-pacífico
Myiopagis flavivertex	elénia-de-crista-amarela
Myiopagis viridicata	elénia-esverdeada
Myiopagis cotta	elénia-jamaicana
Elaenia flavogaster	elénia-de-barriga-amarela
Elaenia martinica	elénia-das-caraíbas
Elaenia spectabilis	elénia-grande
Elaenia ridleyana	elénia-de-noronha
Elaenia albiceps	elénia-de-crista-branca

Elaenia chilensis	elénia-chilena
Elaenia parvirostris	elénia-de-bico-curto
Elaenia mesoleuca	elénia-olivácea
Elaenia strepera	elénia-ardósia
Elaenia gigas	elénia-de-cornichos
Elaenia pelzelni	elénia-parda
Elaenia cristata	elénia-de-crista-uniforme
Elaenia chiriquensis	elénia-pequena
Elaenia brachyptera	elénia-d'asa-curta
Elaenia ruficeps	elénia-de-crista-ruiva
Elaenia frantzii	elénia-serrana
Elaenia obscura	elénia-escura
Elaenia sordida	elénia-de-cabeça-pequena
Elaenia dayi	elénia-gigante
Elaenia pallatangae	elénia-andina
Elaenia olivina	elénia-dos-tepuis
Elaenia fallax	elénia-da-montanha-azul
Elaenia cherriei	elénia-dominicana
Ornithion semiflavum	tiraninho-de-barriga-amarela
Ornithion brunneicapillus	tiraninho-de-barrete-castanho
Ornithion inerme	tiraninho-de-loros-brancos
Camptostoma imberbe	tiraninho-imberbe-setentrional
Camptostoma obsoletum	tiraninho-imberbe-meridional
Suiriri suiriri	caça-moscas-suiriri
Mecocerculus leucophrys	tiraninho-de-garganta-branca
Mecocerculus poecilocercus	tiraninho-de-cauda-branca
Mecocerculus hellmayri	tiraninho-de-bandas-fulvas
Mecocerculus calopterus	tiraninho-d'asa-ruiva
Mecocerculus minor	tiraninho-sulfuroso
Mecocerculus stictopterus	tiraninho-de-bandas-brancas
Anairetes nigrocristatus	tourinho-de-crista-preta
Anairetes reguloides	tourinho-de-crista-bicolor
Anairetes alpinus	tourinho-fuliginoso
Anairetes flavirostris	tourinho-de-bico-amarelo
Anairetes parulus	tourinho-de-bico-preto
Anairetes fernandezianus	tourinho-de-joão-fernandes
Uromyias agilis	tourinho-ágil
Uromyias agraphia	tourinho-liso
Serpophaga cinerea	tiraninho-guarda-rios
Serpophaga hypoleuca	tiraninho-ribeirinho
Serpophaga nigricans	tiraninho-fuliginoso
Serpophaga subcristata	tiraninho-de-crista-branca
Serpophaga griseicapilla	tiraninho-de-straneck
Nesotriccus ridgwayi	tiraninho-do-coco
Nesotriccus murinus	tiraninho-pardo
Nesotriccus tumbezanus	tiraninho-de-tumbes
Nesotriccus maranonicus	tiraninho-do-maranhão
Capsiempis flaveola	tiraninho-amarelo

Polystictus pectoralis	tachuri-barbudo
Polystictus superciliaris	tachuri-cinzento
Pseudocolopteryx dinelliana	amarelinho-de-dinelli
Pseudocolopteryx sclateri	amarelinho-de-poupa
Pseudocolopteryx acutipennis	amarelinho-andino
Pseudocolopteryx flaviventris	amarelinho-rioplatense
Pseudocolopteryx citreola	amarelinho-chileno
Pseudotriccus pelzelni	tiraninho-bronzeado
Pseudotriccus simplex	tiraninho-de-testa-avelã
Pseudotriccus ruficeps	tiraninho-de-cabeça-ruiva
Corythopis torquatus	estalador-do-norte
Corythopis delalandi	estalador-do-sul
Euscarthmus meloryphus	tiraninho-barulhento
Euscarthmus fulviceps	tiraninho-de-faces-fulvas
Euscarthmus rufomarginatus	tiraninho-de-flancos-ruivos
Pseudelaenia leucospodia	tiraninho-branco-e-cinzento
Stigmatura napensis	tiraninho-rabilongo-pequeno
Stigmatura bahiae	tiraninho-rabilongo-baiano
Stigmatura budytoides	tiraninho-rabilongo-grande
Zimmerius vilissimus	tiraninho-guatemalteco
Zimmerius parvus	tiraninho-do-visco
Zimmerius improbus	tiraninho-de-lunetas
Zimmerius petersi	tiraninho-venezuelano
Zimmerius bolivianus	tiraninho-boliviano
Zimmerius cinereicapilla	tiraninho-de-bico-vermelho
Zimmerius villarejoi	tiraninho-de-mishana
Zimmerius chicomendesi	tiraninho-de-chico-mendes
Zimmerius gracilipes	tiraninho-de-patas-finas
Zimmerius acer	tiraninho-guianense
Zimmerius chrysops	tiraninho-de-faces-douradas
Zimmerius albigularis	tiraninho-do-chocó
Zimmerius viridiflavus	tiraninho-peruano
Pogonotriccus poecilotis	tiraninho-barbudo-variegado
Pogonotriccus chapmani	tiraninho-barbudo-dos-tepuis
Pogonotriccus ophthalmicus	tiraninho-barbudo-marmoreado
Pogonotriccus orbitalis	tiraninho-barbudo-d'óculos
Pogonotriccus venezuelanus	tiraninho-barbudo-venezuelano
Pogonotriccus lanyoni	tiraninho-barbudo-de-antioquia
Pogonotriccus eximius	tiraninho-barbudo-meridional
Pogonotriccus paulista	tiraninho-paulista
Pogonotriccus difficilis	tiraninho-da-serra-do-mar
Phylloscartes ventralis	tiraninho-de-sardas
Phylloscartes ceciliae	tiraninho-alagoano
Phylloscartes kronei	tiraninho-da-restinga
Phylloscartes beckeri	tiraninho-baiano
Phylloscartes flavovirens	tiraninho-panamense
Phylloscartes virescens	tiraninho-esverdeado-guianense
Phylloscartes gualaquizae	tiraninho-equatoriano

Phylloscartes nigrifrons	tiraninho-de-testa-preta
Phylloscartes superciliaris	tiraninho-de-sobrancelha-ruiva
Phylloscartes flaviventris	tiraninho-de-loros-ruivos
Phylloscartes parkeri	tiraninho-de-parker
Phylloscartes roquettei	tiraninho-mineiro
Phylloscartes oustaleti	tiraninho-d'olheiras
Phylloscartes sylviolus	tiraninho-de-máscara-fulva
Mionectes striaticollis	abre-asa-de-pescoço-estriado
Mionectes olivaceus	abre-asa-oliváceo
Mionectes galbinus	abre-asa-de-listas-oliváceas
Mionectes oleagineus	abre-asa-de-barriga-ocre
Mionectes macconnelli	abre-asa-amazónico
Mionectes roraimae	abre-asa-da-serra-de-lema
Mionectes rufiventris	abre-asa-de-capuz-cinzento
Leptopogon amaurocephalus	orelheiro-de-coroa-sépia
Leptopogon superciliaris	orelheiro-de-coroa-cinzenta
Leptopogon rufipectus	orelheiro-de-peito-ruivo
Leptopogon taczanowskii	orelheiro-inca
Guyramemua affine	caça-moscas-da-chapada
Sublegatus arenarum	caça-moscas-dos-mangais
Sublegatus obscurior	caça-moscas-amazónico
Sublegatus modestus	caça-moscas-do-cerrado
Inezia tenuirostris	tiraninho-de-bico-fino
Inezia inornata	tiraninho-liso
Inezia subflava	tiraninho-amazónico
Inezia caudata	tiraninho-de-pontas-pálidas
Myiophobus flavicans	caça-moscas-amarelo
Myiophobus phoenicomitra	caça-moscas-de-crista-laranja
Myiophobus inornatus	caça-moscas-liso
Myiophobus roraimae	caça-moscas-do-roraima
Myiophobus cryptoxanthus	caça-moscas-de-peito-oliváceo
Myiophobus fasciatus	caça-moscas-castanho
Myiophobus crypterythrus	caça-moscas-murino
Myiophobus rufescens	caça-moscas-de-barriga-laranja
Nephelomyias pulcher	caça-moscas-formoso
Nephelomyias lintoni	caça-moscas-de-banda-laranja
Nephelomyias ochraceiventris	caça-moscas-de-peito-ocre
Myiotriccus ornatus	caça-moscas-adornado
Tachuris rubrigastra	sete-cores-dos-juncos
Culicivora caudacuta	tachuri-de-cauda-fina
Hemitriccus diops	falso-tódi-de-peito-cinzento
Hemitriccus obsoletus	falso-tódi-de-peito-castanho
Hemitriccus flammulatus	falso-tódi-do-bambu
Hemitriccus minor	falso-tódi-de-snethlage
Hemitriccus spodiops	falso-tódi-dos-yungas
Hemitriccus cohnhafti	falso-tódi-acreano
Hemitriccus josephinae	falso-tódi-de-bico-largo
Hemitriccus zosterops	falso-tódi-d'olho-branco

Hemitriccus griseipectus	falso-tódi-de-barriga-branca
Hemitriccus minimus	falso-tódi-de-zimmer
Hemitriccus orbitatus	falso-tódi-d'óculos
Hemitriccus iohannis	falso-tódi-de-joão
Hemitriccus striaticollis	falso-tódi-de-pescoço-estriado
Hemitriccus nidipendulus	falso-tódi-de-ninho-suspenso
Hemitriccus margaritaceiventer	falso-tódi-d'olho-dourado
Hemitriccus inornatus	falso-tódi-da-campina
Hemitriccus granadensis	falso-tódi-de-garganta-preta
Hemitriccus mirandae	falso-tódi-nordestino
Hemitriccus cinnamomeipectus	falso-tódi-de-peito-canela
Hemitriccus kaempferi	falso-tódi-catarinense
Hemitriccus rufigularis	falso-tódi-de-garganta-fulva
Hemitriccus furcatus	falso-tódi-tesoura
Myiornis auricularis	tiraninho-pigmeu-d'orelhas
Myiornis albiventris	tiraninho-pigmeu-de-barriga-branca
Myiornis atricapillus	tiraninho-pigmeu-de-barrete
Myiornis ecaudatus	tiraninho-pigmeu-de-cauda-curta
Oncostoma cinereigulare	bico-curvo-nortenho
Oncostoma olivaceum	bico-curvo-meridional
Lophotriccus pileatus	tiraninho-pigmeu-de-escamas
Lophotriccus eulophotes	tiraninho-pigmeu-de-crista
Lophotriccus vitiosus	tiraninho-pigmeu-bilistado
Lophotriccus galeatus	tiraninho-pigmeu-de-capacete
Atalotriccus pilaris	tiraninho-pigmeu-d'olho-claro
Poecilotriccus ruficeps	falso-tódi-de-coroa-ruiva
Poecilotriccus luluae	falso-tódi-de-lulu
Poecilotriccus albifacies	falso-tódi-de-faces-brancas
Poecilotriccus capitalis	falso-tódi-alvinegro
Poecilotriccus senex	falso-tódi-do-rio-madeira
Poecilotriccus russatus	falso-tódi-ferruginoso
Poecilotriccus plumbeiceps	falso-tódi-de-faces-canela
Poecilotriccus fumifrons	falso-tódi-de-testa-parda
Poecilotriccus latirostris	falso-tódi-de-testa-fulva
Poecilotriccus sylvia	falso-tódi-de-cabeça-cinzenta
Poecilotriccus calopterus	falso-tódi-d'asa-dourada
Poecilotriccus pulchellus	falso-tódi-de-dorso-preto
Taeniotriccus andrei	falso-tódi-de-peito-preto
Todirostrum maculatum	falso-tódi-maculado
Todirostrum poliocephalum	falso-tódi-de-loros-dourados
Todirostrum cinereum	falso-tódi-comum
Todirostrum viridanum	falso-tódi-de-maracaibo
Todirostrum pictum	falso-tódi-pintado
Todirostrum chrysocrotaphum	falso-tódi-de-sobrancelha
Todirostrum nigriceps	falso-tódi-de-cabeça-preta
Cnipodectes subbrunneus	caça-moscas-pardo
Cnipodectes superrufus	caça-moscas-do-manu
Rhynchocyclus brevirostris	bico-chato-d'óculos

Rhynchocyclus aequinoctialis	bico-chato-ocidental
Rhynchocyclus olivaceus	bico-chato-oliváceo
Rhynchocyclus pacificus	bico-chato-do-pacífico
Rhynchocyclus fulvipectus	bico-chato-de-peito-fulvo
Tolmomyias sulphurescens	bico-chato-sulfuroso
Tolmomyias traylori	bico-chato-d'olho-laranja
Tolmomyias assimilis	bico-chato-de-orlas-amarelas
Tolmomyias flavotectus	bico-chato-d'asa-amarela
Tolmomyias poliocephalus	bico-chato-de-coroa-cinzenta
Tolmomyias flaviventris	bico-chato-amarelo
Tolmomyias viridiceps	bico-chato-de-cabeça-verde
Calyptura cristata	tietê-de-coroa
Platyrinchus saturatus	bico-chato-de-crista-canela
Platyrinchus cancrominus	bico-chato-de-cauda-curta
Platyrinchus mystaceus	bico-chato-de-garganta-branca
Platyrinchus coronatus	bico-chato-de-coroa-dourada
Platyrinchus flavigularis	bico-chato-de-garganta-amarela
Platyrinchus platyrhynchos	bico-chato-de-crista-branca
Platyrinchus leucoryphus	bico-chato-d'asa-ruiva
Neopipo cinnamomea	caça-moscas-dançarino
Pyrrhomyias cinnamomeus	caça-moscas-canela
Hirundinea ferruginea	caça-moscas-das-rochas
Lathrotriccus euleri	caça-moscas-de-euler
Lathrotriccus griseipectus	caça-moscas-de-peito-cinzento
Aphanotriccus capitalis	caça-moscas-de-peito-pardo
Aphanotriccus audax	caça-moscas-de-bico-preto
Cnemotriccus fuscatus	caça-moscas-fusco
Xenotriccus callizonus	caça-moscas-cintado
Xenotriccus mexicanus	caça-moscas-mexicano
Sayornis phoebe	caça-moscas-fibi
Sayornis nigricans	caça-moscas-ribeirinho
Sayornis saya	caça-moscas-de-say
Mitrephanes phaeocercus	caça-moscas-de-poupa-comum
Mitrephanes olivaceus	caça-moscas-de-poupa-peruano
Contopus cooperi	piuí-boreal
Contopus pertinax	piuí-grande
Contopus lugubris	piuí-escuro
Contopus fumigatus	piuí-fuliginoso
Contopus ochraceus	piuí-ocre
Contopus sordidulus	piuí-ocidental
Contopus virens	piuí-oriental
Contopus bogotensis	piuí-tropical-do-norte
Contopus punensis	piuí-de-tumbes
Contopus cinereus	piuí-tropical
Contopus albogularis	piuí-de-garganta-branca
Contopus nigrescens	piuí-preto
Contopus caribaeus	piuí-cubano
Contopus hispaniolensis	piuí-dominicano

Contopus pallidus	piuí-jamaicano
Contopus latirostris	piuí-porto-riquenho
Empidonax flaviventris	caça-moscas-de-barriga-amarela
Empidonax virescens	caça-moscas-acadiano
Empidonax traillii	caça-moscas-dos-salgueiros
Empidonax alnorum	caça-moscas-dos-amieiros
Empidonax albigularis	caça-moscas-de-garganta-branca
Empidonax minimus	caça-moscas-pequeno
Empidonax hammondii	caça-moscas-de-hammond
Empidonax oberholseri	caça-moscas-sombrio
Empidonax wrightii	caça-moscas-cinzento
Empidonax affinis	caça-moscas-dos-pinheiros
Empidonax difficilis	caça-moscas-ocidental
Empidonax flavescens	caça-moscas-amarelado
Empidonax fulvifrons	caça-moscas-de-peito-canela
Empidonax atriceps	caça-moscas-de-barrete-preto
Pyrocephalus rubinus	caça-moscas-cardeal
Pyrocephalus nanus	caça-moscas-de-darwin
Ochthornis littoralis	caça-moscas-aquático
Satrapa icterophrys	caça-moscas-de-sobrancelha-amarela
Syrtidicola fluviatilis	gaúcha-d'água
Muscisaxicola maculirostris	gaúcha-pequena
Muscisaxicola albifrons	gaúcha-de-testa-branca
Muscisaxicola flavinucha	gaúcha-de-nuca-ocre
Muscisaxicola alpinus	gaúcha-do-páramo
Muscisaxicola griseus	gaúcha-de-taczanowski
Muscisaxicola cinereus	gaúcha-cinzenta
Muscisaxicola rufivertex	gaúcha-de-nuca-ruiva
Muscisaxicola maclovianus	gaúcha-de-faces-escuras
Muscisaxicola albilora	gaúcha-de-sobrancelha
Muscisaxicola capistratus	gaúcha-de-barriga-canela
Muscisaxicola juninensis	gaúcha-da-puna
Muscisaxicola frontalis	gaúcha-de-testa-preta
Lessonia oreas	negrito-andino
Lessonia rufa	negrito-austral
Hymenops perspicillatus	caça-moscas-d'óculos
Knipolegus cyanirostris	caça-moscas-de-bico-celeste
Knipolegus signatus	caça-moscas-de-jelski
Knipolegus cabanisi	caça-moscas-preto-andino
Knipolegus striaticeps	caça-moscas-do-chaco
Knipolegus aterrimus	caça-moscas-d'asa-branca
Knipolegus hudsoni	caça-moscas-patagónico
Knipolegus poecilurus	caça-moscas-montês
Knipolegus orenocensis	caça-moscas-preto-do-orinoco
Knipolegus poecilocercus	caça-moscas-preto-amazónico
Knipolegus lophotes	caça-moscas-preto-de-poupa
Knipolegus nigerrimus	caça-moscas-de-veludo
Knipolegus franciscanus	caça-moscas-preto-nordestino

Cnemarchus erythropygius	gaúcho-d'uropígio-vermelho
Cnemarchus rufipennis	gaúcho-d'asa-ruiva
Xolmis velatus	noivinha-d'uropígio-branco
Xolmis irupero	noivinha-branca
Pyrope pyrope	gaúcho-d'olho-vermelho
Nengetus cinereus	noivinha-cinzenta
Neoxolmis coronatus	noivinha-coroada
Neoxolmis rubetra	noivinha-castanha
Neoxolmis salinarum	noivinha-das-salinas
Neoxolmis rufiventris	gaúcho-chocolate
Myiotheretes striaticollis	gaúcho-de-garganta-riscada
Myiotheretes fuscorufus	gaúcho-de-peito-ruivo
Myiotheretes pernix	gaúcho-de-santa-marta
Myiotheretes fumigatus	gaúcho-fuliginoso
Agriornis montanus	gaúcho-de-bico-preto
Agriornis murinus	gaúcho-pequeno
Agriornis albicauda	gaúcho-de-cauda-branca
Agriornis micropterus	gaúcho-cinzento
Agriornis lividus	gaúcho-grande
Gubernetes yetapa	caça-moscas-viuvinha
Muscipipra vetula	caça-moscas-rabilongo
Fluvicola pica	caça-moscas-alvinegro
Fluvicola albiventer	caça-moscas-palustre
Fluvicola nengeta	caça-moscas-de-mascarilha
Arundinicola leucocephala	caça-moscas-de-cabeça-branca
Heteroxolmis dominicana	noivinha-rabilonga
Alectrurus tricolor	caça-moscas-galo
Alectrurus risora	caça-moscas-de-plumas
Tumbezia salvini	falso-chasco-de-tumbes
Silvicultrix frontalis	falso-chasco-coroado
Silvicultrix spodionota	falso-chasco-de-kalinowski
Silvicultrix pulchella	falso-chasco-de-sobrancelha-dourada
Silvicultrix diadema	falso-chasco-de-barriga-amarela
Silvicultrix jelskii	falso-chasco-de-jelski
Ochthoeca cinnamomeiventris	falso-chasco-de-dorso-cinzento
Ochthoeca nigrita	falso-chasco-preto
Ochthoeca thoracica	falso-chasco-de-peito-castanho
Ochthoeca rufipectoralis	falso-chasco-de-peito-ruivo
Ochthoeca fumicolor	falso-chasco-de-dorso-castanho
Ochthoeca superciliosa	falso-chasco-de-sobrancelha-ruiva
Ochthoeca oenanthoides	falso-chasco-canela
Ochthoeca leucophrys	falso-chasco-de-sobrancelha-branca
Ochthoeca piurae	falso-chasco-de-piura
Colorhamphus parvirostris	falso-chasco-patagónico
Colonia colonus	caça-moscas-de-filamentos
Muscigralla brevicauda	gaúcha-de-cauda-curta
Machetornis rixosa	caça-moscas-cavaleiro
Legatus leucophaius	caça-moscas-pirata

Phelpsia inornata	caça-moscas-de-barba-branca
Myiozetetes cayanensis	caça-moscas-d'asa-ruiva
Myiozetetes similis	caça-moscas-sociável
Myiozetetes granadensis	caça-moscas-de-cabeça-cinzenta
Myiozetetes luteiventris	caça-moscas-barulhento
Pitangus sulphuratus	bem-te-vi-comum
Philohydor lictor	bem-te-vi-pequeno
Conopias albovittatus	caça-moscas-do-chocó
Conopias parvus	caça-moscas-de-garganta-amarela
Conopias trivirgatus	caça-moscas-trilistado
Conopias cinchoneti	caça-moscas-limão
Myiodynastes hemichrysus	caça-moscas-de-barriga-dourada
Myiodynastes chrysocephalus	caça-moscas-de-coroa-dourada
Myiodynastes bairdii	caça-moscas-de-baird
Myiodynastes luteiventris	caça-moscas-de-barriga-sulfúrea
Myiodynastes maculatus	caça-moscas-listado
Megarynchus pitangua	caça-moscas-bicudo
Tyrannopsis sulphurea	tirano-das-palmeiras
Empidonomus varius	tirano-variegado
Griseotyrannus aurantioatrocristatus	tirano-de-barrete
Tyrannus niveigularis	tirano-de-peito-branco
Tyrannus albogularis	tirano-de-garganta-branca
Tyrannus melancholicus	tirano-melancólico
Tyrannus couchii	tirano-assobiadeiro
Tyrannus vociferans	tirano-gritador
Tyrannus crassirostris	tirano-de-bico-grosso
Tyrannus verticalis	tirano-ocidental
Tyrannus forficatus	tirano-cauda-de-tesoura
Tyrannus savana	tirano-das-savanas
Tyrannus tyrannus	tirano-oriental
Tyrannus dominicensis	tirano-dominicano
Tyrannus cubensis	tirano-cubano
Tyrannus caudifasciatus	tirano-cabeçudo
Rhytipterna simplex	carpideira-cinzenta
Rhytipterna immunda	carpideira-pálida
Rhytipterna holerythra	carpideira-ruiva
Sirystes sibilator	gritador-oriental
Sirystes albocinereus	gritador-ocidental
Sirystes subcanescens	gritador-guianense
Sirystes albogriseus	gritador-do-chocó
Casiornis rufus	caça-moscas-laranja-meridional
Casiornis fuscus	caça-moscas-laranja-setentrional
Myiarchus semirufus	caça-moscas-ruivo
Myiarchus yucatanensis	caça-moscas-do-iucatão
Myiarchus barbirostris	caça-moscas-jamaicano
Myiarchus tuberculifer	caça-moscas-de-coroa-cinzenta
Myiarchus swainsoni	caça-moscas-de-swainson
Myiarchus venezuelensis	caça-moscas-venezuelano

Myiarchus panamensis	caça-moscas-panamense
Myiarchus ferox	caça-moscas-de-crista-curta
Myiarchus apicalis	caça-moscas-de-pontas-brancas
Myiarchus cephalotes	caça-moscas-d'orlas-brancas
Myiarchus phaeocephalus	caça-moscas-equatoriano
Myiarchus cinerascens	caça-moscas-de-garganta-cinzenta
Myiarchus nuttingi	caça-moscas-de-nutting
Myiarchus flavidior	caça-moscas-salvadorenho
Myiarchus crinitus	caça-moscas-grande-de-crista
Myiarchus tyrannulus	caça-moscas-de-coroa-castanha
Myiarchus magnirostris	caça-moscas-das-galápagos
Myiarchus nugator	caça-moscas-granadino
Myiarchus validus	caça-moscas-de-cauda-ruiva
Myiarchus sagrae	caça-moscas-de-sagra
Myiarchus stolidus	caça-moscas-estólido
Myiarchus antillarum	caça-moscas-porto-riquenho
Myiarchus oberi	caça-moscas-das-antilhas
Ramphotrigon megacephalum	bico-chato-cabeçudo
Ramphotrigon flammulatum	caça-moscas-flamulado
Ramphotrigon ruficauda	bico-chato-de-cauda-ruiva
Ramphotrigon fuscicauda	bico-chato-de-cauda-escura
Attila phoenicurus	átila-de-cauda-ruiva
Attila cinnamomeus	átila-canela
Attila torridus	átila-ocre
Attila citriniventris	átila-citrino
Attila bolivianus	átila-d'olho-branco
Attila rufus	átila-de-capuz
Attila spadiceus	átila-variável

Cotingidae Cotingas, Galos-das-rochas e afins

A família das cotingas contribui em muito para a cor das florestas tropicais das Américas. De dimensão muito variável, coloração viva, comportamentos extravagantes e vocalizações únicas, estas aves dificilmente passam despercebidas. São principalmente frugívoras e muitas vezes avistadas apenas na copa das árvores. Os machos de várias espécies, como os galos-das-rochas, reúnem-se num terreno de exibição na floresta, onde competem entre si para chamar a atenção das fêmeas.

Espécies: 66

Distribuição: América do Sul e Central

Ampelioides tschudii	fruteiro-escamoso
Pipreola chlorolepidota	fruteiro-de-garganta-flamejante
Pipreola frontalis	fruteiro-de-peito-vermelho
Pipreola formosa	fruteiro-formoso
Pipreola whitelyi	fruteiro-de-colar-vermelho
Pipreola lubomirskii	fruteiro-de-peito-preto
Pipreola jucunda	fruteiro-de-peito-laranja
Pipreola pulchra	fruteiro-mascarado
Pipreola aureopectus	fruteiro-de-peito-dourado
Pipreola arcuata	fruteiro-barrado
Pipreola intermedia	fruteiro-de-cauda-bandada
Pipreola riefferii	fruteiro-verde-e-preto
Snowornis subalaris	guarda-bosques-de-cauda-cinzenta
Snowornis cryptolophus	guarda-bosques-oliváceo
Carpornis cucullata	cotinga-de-capuz
Carpornis melanocephala	cotinga-de-cabeça-preta
Rupicola peruvianus	galo-das-rochas-andino
Rupicola rupicola	galo-das-rochas-guianense
Phoenicircus carnifex	cotinga-vermelha-guianense
Phoenicircus nigricollis	cotinga-vermelha-amazónica
Zaratornis stresemanni	cotinga-de-faces-brancas
Phytotoma rara	corta-ramos-austral
Phytotoma raimondii	corta-ramos-peruano
Phytotoma rutila	corta-ramos-argentino
Phibalura flavirostris	cotinga-cauda-de-andorinha
Phibalura boliviana	cotinga-boliviana
Doliornis sclateri	cotinga-de-barriga-castanha
Doliornis remseni	cotinga-de-barriga-ruiva
Ampelion rubrocristatus	cotinga-de-crista-vermelha

Ampelion rufaxilla	cotinga-de-crista-castanha
Haematoderus militaris	cotinga-militar
Querula purpurata	cotinga-de-barba-púrpura
Pyroderus scutatus	cotinga-de-barba-vermelha
Cephalopterus glabricollis	cotinga-de-gravata-nua
Cephalopterus penduliger	cotinga-de-gravata-ocidental
Cephalopterus ornatus	cotinga-de-gravata-oriental
Perissocephalus tricolor	ave-monge
Lipaugus unirufus	guarda-bosques-ruivo
Lipaugus streptophorus	guarda-bosques-de-colar-rosa
Lipaugus vociferans	guarda-bosques-cricrió
Lipaugus lanioides	guarda-bosques-carioca
Lipaugus ater	cotinga-d'asa-amarela
Lipaugus conditus	cotinga-d'asa-cinzenta
Lipaugus weberi	guarda-bosques-de-antioquia
Lipaugus fuscocinereus	guarda-bosques-escuro
Lipaugus uropygialis	guarda-bosques-d'asa-curva
Procnias albus	ave-sino-branca
Procnias tricarunculatus	ave-sino-de-três-barbilhos
Procnias nudicollis	ave-sino-meridional
Procnias averano	ave-sino-barbuda
Cotinga maynana	cotinga-azul-amazónica
Cotinga cayana	cotinga-de-lantejoulas
Cotinga amabilis	cotinga-celeste
Cotinga nattererii	cotinga-azul-do-chocó
Cotinga ridgwayi	cotinga-turquesa
Cotinga maculata	cotinga-de-colar-azul
Cotinga cotinga	cotinga-de-peito-púrpura
Porphyrolaema porphyrolaema	cotinga-de-garganta-violeta
Conioptilon mcilhennyi	cotinga-de-faces-pretas
Gymnoderus foetidus	cotinga-de-pescoço-nu
Xipholena punicea	cotinga-pompadour
Xipholena lamellipennis	cotinga-de-cauda-branca
Xipholena atropurpurea	cotinga-d'asa-branca
Carpodectes hopkei	cotinga-de-pontas-pretas
Carpodectes antoniae	cotinga-de-bico-amarelo
Carpodectes nitidus	cotinga-branca

Os manaquins são pequenas aves frugívoras, de cauda e bico curtos, e com um dimorfismo sexual marcado - enquanto as fêmeas são esverdeadas, os machos têm cores vivas e contrastantes. Ocorrem em florestas tropicais a diversas altitudes. Estas aves são famosas pelos seus coloridos rituais de acasalamento, nos quais vários machos executam complexas danças cooperativas à frente de uma potencial parceira. Estas exibições incluem por vezes sons mecânicos produzidos pelas penas das asas.

Espécies: 55

Distribuição: América do Sul e Central

Tyranneutes stolzmanni	manaquim-anão
Tyranneutes virescens	manaquim-guianense
Neopelma chrysocephalum	manaquim-da-campina
Neopelma sulphureiventer	manaquim-de-barriga-amarela
Neopelma pallescens	manaquim-do-cerradão
Neopelma aurifrons	manaquim-de-wied
Neopelma chrysolophum	manaquim-da-serra-do-mar
Chloropipo flavicapilla	manaquim-amarelo
Chloropipo unicolor	manaquim-azeviche
Chiroxiphia boliviana	manaquim-dos-yungas
Chiroxiphia pareola	manaquim-de-dorso-azul
Chiroxiphia linearis	manaquim-rabilongo
Chiroxiphia lanceolata	manaquim-cauda-de-lança
Chiroxiphia caudata	manaquim-azul
Chiroxiphia bokermanni	manaquim-do-araripe
Chiroxiphia galeata	manaquim-soldadinho
Ilicura militaris	manaquim-militar
Masius chrysopterus	manaquim-d'asa-dourada
Corapipo gutturalis	manaquim-de-garganta-branca
Corapipo altera	manaquim-de-rufo-branco
Corapipo leucorrhoa	manaquim-de-bibe-branco
Xenopipo uniformis	manaquim-oliváceo
Xenopipo atronitens	manaquim-preto
Cryptopipo litae	manaquim-do-chocó
Cryptopipo holochlora	manaquim-verde
Lepidothrix velutina	manaquim-aveludado
Lepidothrix coronata	manaquim-de-coroa-azul
Lepidothrix nattereri	manaquim-de-coroa-nívea
Lepidothrix vilasboasi	manaquim-de-coroa-dourada

Lepidothrix iris	manaquim-de-coroa-opala
Lepidothrix suavissima	manaquim-de-barriga-laranja
Lepidothrix serena	manaquim-estrela
Lepidothrix isidorei	manaquim-d'uropígio-azul
Lepidothrix coeruleocapilla	manaquim-de-coroa-celeste
Heterocercus aurantiivertex	manaquim-de-coroa-laranja
Heterocercus flavivertex	manaquim-de-coroa-amarela
Heterocercus linteatus	manaquim-de-coroa-vermelha
Manacus manacus	manaquim-de-barbas-brancas
Manacus candei	manaquim-de-colar-branco
Manacus vitellinus	manaquim-de-pescoço-dourado
Manacus aurantiacus	manaquim-de-colar-laranja
Pipra aureola	manaquim-vermelho
Pipra filicauda	manaquim-rabo-d'arame
Pipra fasciicauda	manaquim-laranja
Machaeropterus deliciosus	manaquim-d'asa-torcida
Machaeropterus regulus	manaquim-estrelinha
Machaeropterus striolatus	manaquim-raiado
Machaeropterus eckelberryi	manaquim-da-cordilheira-azul
Machaeropterus pyrocephalus	manaquim-de-coroa-flamejante
Pseudopipra pipra	manaquim-de-coroa-branca
Ceratopipra cornuta	manaquim-de-cornichos
Ceratopipra mentalis	manaquim-de-barrete-vermelho
Ceratopipra chloromeros	manaquim-de-cauda-redonda
Ceratopipra erythrocephala	manaquim-de-cabeça-dourada
Ceratopipra rubrocapilla	manaquim-de-cabeça-vermelha

Tityridae — Titiras, Caneleiros e afins

Este grupo de espécies é tão heterogéneo que dificilmente se adivinharia que pertencem à mesma família. Algumas das espécies lembram mais tiranídeos, outras parecem cotingas, outras ainda manaquins. Todas elas podem ser encontradas em florestas tropicais das Américas e a maioria tem uma alimentação omnívora, abrangendo tanto frutos como invertebrados.

Espécies: 36

Distribuição: América do Sul e Central

Tityra inquisitor	titira-de-bico-preto
Tityra cayana	titira-de-cauda-preta
Tityra semifasciata	titira-mascarada
Tityra leucura	titira-de-cauda-branca
Schiffornis major	flautim-da-várzea
Schiffornis olivacea	flautim-oliváceo
Schiffornis veraepacis	flautim-nortenho
Schiffornis aenea	flautim-das-colinas
Schiffornis stenorhyncha	flautim-d'asa-ruiva
Schiffornis turdina	flautim-d'asa-castanha
Schiffornis virescens	flautim-esverdeado
Laniocera rufescens	carpideira-pintalgada
Laniocera hypopyrra	carpideira-de-flancos-ruivos
Iodopleura pipra	cotinguinha-de-garganta-fulva
Iodopleura fusca	cotinguinha-fusca
Iodopleura isabellae	cotinguinha-de-sobrancelha
Laniisoma elegans	lanisoma-brasileira
Laniisoma buckleyi	lanisoma-andina
Xenopsaris albinucha	caneleiro-branco
Pachyramphus viridis	caneleiro-de-dorso-verde
Pachyramphus versicolor	caneleiro-barrado
Pachyramphus spodiurus	caneleiro-ardósia
Pachyramphus rufus	caneleiro-cinzento
Pachyramphus castaneus	caneleiro-castanho
Pachyramphus cinnamomeus	caneleiro-ruivo
Pachyramphus salvini	caneleiro-críptico
Pachyramphus polychopterus	caneleiro-d'asa-branca
Pachyramphus marginatus	caneleiro-de-barrete
Pachyramphus albogriseus	caneleiro-alvinegro
Pachyramphus major	caneleiro-de-colar-cinzento
Pachyramphus surinamus	caneleiro-de-dorso-reluzente

Pachyramphus homochrous	caneleiro-unicolor
Pachyramphus minor	caneleiro-pequeno
Pachyramphus validus	caneleiro-de-poupa
Pachyramphus aglaiae	caneleiro-de-garganta-rosada
Pachyramphus niger	caneleiro-jamaicano

Oxyruncidae Bico-aguçado

O bico-aguçado é uma ave enigmática e a sua taxonomia não é muito clara. Recentemente foi recolocado na sua própria família mono-específica. Trata-se de uma espécie florestal, que habita zonas montanhosas nas Américas Central e do Sul, desde a Costa Rica até ao sul do Brasil e da Bolívia. A sua alimentação é composta por frutas, mas também usa o seu bico particular para sondar musgo e epífitas em busca de invertebrados.

Espécies: 1

Distribuição: América Central e do Sul

Oxyruncus cristatus bico-aguçado

Onychorhynchidae Caça-moscas

Os sete caça-moscas que integram esta família estavam anteriormente colocados na família Tityridae. A família agrega várias aves de aspecto curioso, como os belos caça-moscas-reais, com as suas coroas de penas, até aos caça-moscas do género Myiobius. O grupo distribui-se pelas Américas Central e do Sul, ocorrendo em diversos tipos de floresta, tanto em planície como em montanha.

Espécies: 7

Distribuição: América do Sul

Onychorhynchus swainsoni	caça-moscas-real-atlântico
Onychorhynchus coronatus	caça-moscas-real-tropical
Myiobius villosus	caça-moscas-de-peito-fulvo
Myiobius sulphureipygius	caça-moscas-d'uropígio-amarelo
Myiobius barbatus	caça-moscas-de-bigodes
Myiobius atricaudus	caça-moscas-de-cauda-preta
Terenotriccus erythrurus	caça-moscas-de-cauda-laranja

Menuridae — Aves-lira

Esta pequena família contém apenas duas espécies: as aves-lira. Apesar do seu grande tamanho, estas aves pertencem à ordem dos passeriformes, sendo das maiores deste grupo. Vivem sobretudo no solo e notabilizam-se pela sua capacidade de imitar sons naturais ou artificiais dos ambientes que as rodeiam. Adicionalmente, merece referência a extraordinária beleza da longa cauda do macho, em especial quando é aberta durante a parada nupcial.

Espécies: 2

Distribuição: Austrália

Menura alberti	ave-lira-de-albert
Menura novaehollandiae	ave-lira-soberba

Atrichornithidae — Aves-do-matagal

As aves-do-matagal são endémicas da Austrália. Do tamanho de estorninhos, e com uma plumagem castanha, são aves de hábitos furtivos, que habitam em zonas arbustivas densas, com uma boa camada de manta morta. São muito difíceis de ver, porém fazem-se notar pelas suas vocalizações ruidosas. A família compreende duas espécies e ambas são bastante raras, tendo actualmente um estatuto de conservação desfavorável ("em perigo").

Espécies: 2

Distribuição: Austrália

Atrichornis rufescens	ave-do-matagal-ruiva
Atrichornis clamosus	ave-do-matagal-ruidosa

Ptilonorhynchidae Jardineiros e Miadores australianos

A principal particularidade destas aves reside no comportamento dos machos durante a parada nupcial: constroem uma estrutura e decoram-na o melhor que podem, com flores, frutos e até pedaços de plástico, na expectativa de atrair uma parceira. São estruturas complexas que requerem um grande esforço de construção e manutenção. Estas aves vivem em zonas florestadas e têm uma alimentação variada, composta sobretudo por frutos.

Espécies: 24

Distribuição: Australásia

Ailuroedus stonii	miador-de-peito-ocre
Ailuroedus buccoides	miador-d'orelhas-brancas
Ailuroedus geislerorum	miador-de-barrete-castanho
Ailuroedus crassirostris	miador-verde
Ailuroedus maculosus	miador-pintalgado
Ailuroedus melanotis	miador-d'orelhas-pretas
Scenopoeetes dentirostris	jardineiro-dentado
Archboldia papuensis	jardineiro-de-archbold
Amblyornis inornata	jardineiro-de-doberai
Amblyornis macgregoriae	jardineiro-de-macgregor
Amblyornis germanus	jardineiro-de-huon
Amblyornis subalaris	jardineiro-estriado
Amblyornis flavifrons	jardineiro-de-testa-dourada
Prionodura newtoniana	jardineiro-dourado
Sericulus aureus	jardineiro-mascarado
Sericulus ardens	jardineiro-flamejante
Sericulus bakeri	jardineiro-das-adelbert
Sericulus chrysocephalus	jardineiro-governador
Ptilonorhynchus violaceus	jardineiro-acetinado
Chlamydera guttata	jardineiro-malhado-ocidental
Chlamydera nuchalis	jardineiro-grande
Chlamydera maculata	jardineiro-malhado-oriental
Chlamydera lauterbachi	jardineiro-de-peito-amarelo
Chlamydera cerviniventris	jardineiro-de-peito-castanho

Estas são aves relativamente pequenas, de plumagem dominada por tons castanhos. Tal como o seu nome sugere, agarram-se aos troncos das árvores e perscrutam as cascas, em busca dos pequenos insectos de que se alimentam. Embora apresentem semelhanças morfológicas com as trepadeiras europeias, não lhes são aparentadas e, ao contrário destas, não usam a cauda como apoio.

Espécies: 7

Distribuição: Australásia e Papua

Cormobates leucophaea	trepadeira-de-garganta-branca
Cormobates placens	trepadeira-amável
Climacteris erythrops	trepadeira-de-sobrancelha-ruiva
Climacteris affinis	trepadeira-de-sobrancelha-branca
Climacteris rufus	trepadeira-ruiva
Climacteris picumnus	trepadeira-castanha
Climacteris melanurus	trepadeira-de-cauda-preta

Maluridae Fadinhas

As fadinhas são pequenas aves insectívoras de cauda comprida e frequentemente erguida. Podem ser encontradas em diversos habitats, desde florestas tropicais a matos áridos. Os tons ruivos e acastanhados predominam nesta família, mas os machos de algumas espécies têm um padrão de cores brilhante dominado por azuis e lilás. Têm um complexo sistema de reprodução cooperativa, onde cada ninhada pode conter crias de vários machos e esses machos contribuem para o cuidado das crias.

Espécies: 33

Distribuição: Austrália e Papua

Sipodotus wallacii	fadinha-de-wallace
Chenorhamphus grayi	fadinha-de-bico-largo
Chenorhamphus campbelli	fadinha-de-campbell
Malurus cyanocephalus	fadinha-imperatriz
Malurus amabilis	fadinha-amável
Malurus assimilis	fadinha-de-dorso-púrpura
Malurus lamberti	fadinha-variegada
Malurus pulcherrimus	fadinha-de-peito-azul
Malurus elegans	fadinha-d'asa-ruiva
Malurus cyaneus	fadinha-soberba
Malurus splendens	fadinha-esplêndida
Malurus coronatus	fadinha-de-coroa-lilás
Malurus alboscapulatus	fadinha-d'ombros-brancos
Malurus melanocephalus	fadinha-de-dorso-vermelho
Malurus leucopterus	fadinha-d'asa-branca
Clytomyias insignis	fadinha-de-coroa-laranja
Stipiturus malachurus	fadinha-rabilonga
Stipiturus mallee	fadinha-do-mallee
Stipiturus ruficeps	fadinha-de-coroa-ruiva
Amytornis barbatus	fadinha-cinzenta
Amytornis housei	fadinha-preta
Amytornis woodwardi	fadinha-de-garganta-branca
Amytornis dorotheae	fadinha-de-carpentária
Amytornis merrotsyi	fadinha-de-cauda-curta
Amytornis whitei	fadinha-de-pilbara
Amytornis oweni	fadinha-de-owen
Amytornis rowleyi	fadinha-de-opalton
Amytornis striatus	fadinha-estriada
Amytornis goyderi	fadinha-do-eyre

Amytornis textilis	fadinha-ocidental
Amytornis modestus	fadinha-de-bico-grosso
Amytornis purnelli	fadinha-sombria
Amytornis ballarae	fadinha-kalkadoon

Meliphagidae Papa-méis, Eptianuros e Filemons

Os papa-méis e os seus parentes próximos alimentam-se de pólen e néctar de flores, ocupando na Australásia um nicho ecológico semelhante aos dos beija-flores da África e da Ásia ou dos colibris nas Américas. Para além de pólen, também consomem invertebrados e a melada produzida por pulgões e outros insectos. A família é muito diversa, mas estas aves tendem a ter um bico relativamente longo e curvo e tufos de penas ou áreas de pele nua com cores intensas na cabeça ou no pescoço.

Espécies: 197

Distribuição: Australásia e algumas ilhas do Pacífico

Myza celebensis	papa-mel-pequeno-de-celebes
Myza sarasinorum	papa-mel-grande-de-celebes
Acanthorhynchus tenuirostris	papa-mel-oriental
Acanthorhynchus superciliosus	papa-mel-ocidental
Glycichaera fallax	papa-mel-de-dorso-verde
Melionyx fuscus	papa-mel-fuliginoso
Melionyx princeps	papa-mel-de-barba-longa
Melionyx nouhuysi	papa-mel-de-barba-curta
Ptiloprora plumbea	papa-mel-plúmbeo
Ptiloprora meekiana	papa-mel-de-meek
Ptiloprora erythropleura	papa-mel-de-flancos-ruivos
Ptiloprora guisei	papa-mel-de-dorso-ruivo
Ptiloprora mayri	papa-mel-de-mayr
Ptiloprora perstriata	papa-mel-estriado
Ashbyia lovensis	eptianuro-de-ashby
Epthianura tricolor	eptianuro-tricolor
Epthianura aurifrons	eptianuro-laranja
Epthianura crocea	eptianuro-amarelo
Epthianura albifrons	eptianuro-de-faces-brancas
Stresemannia bougainvillei	papa-mel-de-bougainville
Conopophila albogularis	papa-mel-de-peito-ruivo
Conopophila rufogularis	papa-mel-de-garganta-ruiva
Conopophila whitei	papa-mel-cinzento
Ramsayornis fasciatus	papa-mel-de-peito-barrado
Ramsayornis modestus	papa-mel-modesto
Melilestes megarhynchus	papa-mel-de-bico-comprido
Timeliopsis fulvigula	papa-mel-oliváceo
Timeliopsis griseigula	papa-mel-fulvo
Melipotes gymnops	papa-mel-das-arfak
Melipotes fumigatus	papa-mel-defumado
Melipotes carolae	papa-mel-das-foja
Melipotes ater	papa-mel-picado

Macgregoria pulchra	papa-mel-de-palas
Gliciphila undulata	papa-mel-barrado
Gliciphila notabilis	papa-mel-de-barriga-branca
Gliciphila melanops	papa-mel-coroado
Pycnopygius ixoides	papa-mel-liso
Pycnopygius cinereus	papa-mel-marmoreado
Pycnopygius stictocephalus	papa-mel-de-cabeça-riscada
Certhionyx variegatus	papa-mel-alvinegro
Prosthemadera novaeseelandiae	papa-mel-tui
Anthornis melanura	papa-mel-maori
Anthornis melanocephala	papa-mel-das-chatham
Sugomel lombokium	papa-mel-de-lombok
Sugomel nigrum	papa-mel-enlutado
Melitograis gilolensis	filemon-de-halmaera
Vosea whitemanensis	papa-mel-das-bismarck
Myzomela blasii	papa-mel-apagado
Myzomela albigula	papa-mel-de-barba-branca
Myzomela cineracea	papa-mel-escuro
Myzomela eques	papa-mel-de-garganta-vermelha
Myzomela simplex	papa-mel-das-molucas
Myzomela rubrotincta	papa-mel-tingido
Myzomela rubrobrunnea	papa-mel-de-biak
Myzomela obscura	papa-mel-sombrio
Myzomela cruentata	papa-mel-vermelho
Myzomela erythrina	papa-mel-avermelhado
Myzomela nigrita	papa-mel-preto
Myzomela pulchella	papa-mel-da-nova-irlanda
Myzomela kuehni	papa-mel-de-wetar
Myzomela prawiradilagae	papa-mel-de-alor
Myzomela erythrocephala	papa-mel-de-cabeça-vermelha
Myzomela dammermani	papa-mel-de-sumba
Myzomela irianawidodoae	papa-mel-de-rote
Myzomela adolphinae	papa-mel-duende
Myzomela boiei	papa-mel-das-banda
Myzomela wahe	papa-mel-de-taliabu
Myzomela chloroptera	papa-mel-de-celebes
Myzomela batjanensis	papa-mel-de-bachão
Myzomela wakoloensis	papa-mel-do-wakolo
Myzomela sanguinolenta	papa-mel-escarlate
Myzomela caledonica	papa-mel-da-nova-caledónia
Myzomela cardinalis	papa-mel-cardeal
Myzomela nigriventris	papa-mel-samoano
Myzomela chermesina	papa-mel-de-rotuma
Myzomela rubratra	papa-mel-micronésio
Myzomela sclateri	papa-mel-de-sclater
Myzomela pammelaena	papa-mel-de-ébano
Myzomela lafargei	papa-mel-de-nuca-vermelha
Myzomela eichhorni	papa-mel-de-eichhorn

Myzomela malaitae	papa-mel-de-malaita
Myzomela melanocephala	papa-mel-das-salomão
Myzomela tristrami	papa-mel-de-tristram
Myzomela jugularis	papa-mel-de-peito-laranja
Myzomela erythromelas	papa-mel-de-barriga-preta
Myzomela vulnerata	papa-mel-de-peito-preto
Myzomela rosenbergii	papa-mel-de-colar-vermelho
Myzomela longirostris	papa-mel-de-goodenough
Philemon meyeri	filemon-de-meyer
Philemon brassi	filemon-do-mamberamo
Philemon citreogularis	filemon-pequeno
Philemon kisserensis	filemon-cinzento
Philemon inornatus	filemon-timorense
Philemon fuscicapillus	filemon-de-morotai
Philemon subcorniculatus	filemon-de-seram
Philemon moluccensis	filemon-de-buru
Philemon plumigenis	filemon-das-tanimbar
Philemon buceroides	filemon-de-elmo
Philemon cockerelli	filemon-da-nova-bretanha
Philemon eichhorni	filemon-da-nova-irlanda
Philemon albitorques	filemon-de-manus
Philemon argenticeps	filemon-coroado
Philemon corniculatus	filemon-barulhento
Philemon diemenensis	filemon-da-nova-caledónia
Xanthotis polygrammus	papa-mel-malhado
Xanthotis macleayanus	papa-mel-de-macleay
Xanthotis flaviventer	papa-mel-de-barriga-fulva
Plectorhyncha lanceolata	papa-mel-listado
Grantiella picta	papa-mel-pintado
Trichodere cockerelli	papa-mel-de-cockerell
Phylidonyris pyrrhopterus	papa-mel-d'asa-amarela
Phylidonyris novaehollandiae	papa-mel-d'olho-branco
Phylidonyris niger	papa-mel-de-faces-brancas
Lichmera lombokia	papa-mel-de-lombok
Lichmera argentauris	papa-mel-argênteo
Lichmera limbata	papa-mel-indonésio
Lichmera indistincta	papa-mel-castanho
Lichmera incana	papa-mel-d'orelhas-cinzentas
Lichmera alboauricularis	papa-mel-de-peito-malhado
Lichmera squamata	papa-mel-escamado
Lichmera deningeri	papa-mel-de-buru
Lichmera monticola	papa-mel-de-ceram
Lichmera flavicans	papa-mel-timorense
Lichmera notabilis	papa-mel-de-colar-preto
Cissomela pectoralis	papa-mel-de-bandas
Guadalcanaria inexpectata	papa-mel-de-guadalcanal
Meliarchus sclateri	papa-mel-de-makira
Gymnomyza viridis	papa-mel-de-bico-amarelo

Gymnomyza brunneirostris	papa-mel-gigante
Gymnomyza samoensis	papa-mel-mao
Gymnomyza aubryana	papa-mel-corvo
Foulehaio carunculatus	papa-mel-polinésio
Foulehaio taviunensis	papa-mel-das-fiji
Foulehaio procerior	papa-mel-de-viti-levu
Meliphacator provocator	papa-mel-de-kadavu
Nesoptilotis leucotis	papa-mel-d'orelhas-brancas
Nesoptilotis flavicollis	papa-mel-de-garganta-amarela
Entomyzon cyanotis	papa-mel-de-faces-azuis
Melithreptus gularis	papa-mel-de-queixo-preto
Melithreptus validirostris	papa-mel-de-bico-grosso
Melithreptus brevirostris	papa-mel-de-cabeça-castanha
Melithreptus albogularis	papa-mel-de-garganta-branca
Melithreptus lunatus	papa-mel-de-nuca-branca-oriental
Melithreptus chloropsis	papa-mel-de-nuca-branca-ocidental
Melithreptus affinis	papa-mel-de-cabeça-preta
Stomiopera unicolor	papa-mel-unicolor
Stomiopera flava	papa-mel-amarelo
Meliphaga aruensis	papa-mel-das-aru
Meliphaga notata	papa-mel-marcado
Meliphaga lewinii	papa-mel-de-lewin
Purnella albifrons	papa-mel-de-testa-branca
Lichenostomus melanops	papa-mel-d'orelhas-amarelas
Lichenostomus cratitius	papa-mel-de-bridão
Microptilotis mimikae	papa-mel-do-mimika
Microptilotis montanus	papa-mel-dos-bosques
Microptilotis orientalis	papa-mel-montês
Microptilotis albonotatus	papa-mel-do-mato
Microptilotis analogus	papa-mel-imitador
Microptilotis vicina	papa-mel-de-tagula
Microptilotis gracilis	papa-mel-gracioso
Microptilotis imitatrix	papa-mel-críptico
Microptilotis cinereifrons	papa-mel-elegante
Microptilotis flavirictus	papa-mel-risonho
Territornis albilineata	papa-mel-de-bigodes
Territornis fordiana	papa-mel-de-kimberley
Territornis reticulata	papa-mel-reticulado
Gavicalis versicolor	papa-mel-versicolor
Gavicalis fasciogularis	papa-mel-do-mangal
Gavicalis virescens	papa-mel-cantor
Oreornis chrysogenys	papa-mel-de-faces-douradas
Ptilotula flavescens	papa-mel-flavescente
Ptilotula fusca	papa-mel-fusco
Ptilotula keartlandi	papa-mel-de-cabeça-cinzenta
Ptilotula plumula	papa-mel-de-testa-cinzenta
Ptilotula ornata	papa-mel-adornado
Ptilotula penicillata	papa-mel-de-colar-branco

Caligavis chrysops	papa-mel-de-faces-amarelas
Caligavis subfrenata	papa-mel-de-garganta-preta
Caligavis obscura	papa-mel-obscuro
Anthochaera chrysoptera	papa-mel-d'asa-ruiva
Anthochaera lunulata	papa-mel-lunulado
Anthochaera carunculata	papa-mel-carunculado
Anthochaera paradoxa	papa-mel-de-barriga-amarela
Anthochaera phrygia	papa-mel-governador
Acanthagenys rufogularis	papa-mel-de-faces-espinhosas
Bolemoreus frenatus	papa-mel-de-freio
Bolemoreus hindwoodi	papa-mel-de-hindwood
Melidectes ochromelas	papa-mel-de-sobrancelha-ruiva
Melidectes leucostephes	papa-mel-de-doberai
Melidectes rufocrissalis	papa-mel-de-sobrancelha-amarela
Melidectes foersteri	papa-mel-de-foerster
Melidectes belfordi	papa-mel-de-belford
Melidectes torquatus	papa-mel-maquilhado
Manorina melanophrys	papa-mel-sino
Manorina melanocephala	papa-mel-de-barrete-preto
Manorina flavigula	papa-mel-de-gola-amarela
Manorina melanotis	papa-mel-de-faces-pretas

Dasyornithidae Bicos-de-cerdas

Esta família inclui três espécies de aves esquivas e de difícil detecção, com áreas de distribuição muito restritas. Têm tons castanhos ou ruivos, asas curtas, cauda comprida e dois pares de cerdas entre o bico e os olhos, que são a razão do seu nome. São espécies insectívoras, que habitam vegetação arbustiva densa, em matos e bosques do litoral australiano. Duas delas encontram-se ameaçadas devido à fragmentação do habitat e aos incêndios florestais.

Espécies: 3

Distribuição: Litoral australiano

Dasyornis brachypterus	bico-de-cerdas-oriental
Dasyornis longirostris	bico-de-cerdas-ocidental
Dasyornis broadbenti	bico-de-cerdas-ruivo

Pardalotidae Pardalotes

Os pardalotes são pequenas aves de aspecto compacto, com uma cauda curta e uma plumagem que inclui cores vivas. Passam a maior parte do seu tempo nas árvores, procurando insectos, aranhas e, sobretudo, restos de seiva, que constituem uma parte importante da sua alimentação. A família é endémica da Austrália, sendo que uma das espécies só ocorre na ilha da Tasmânia e se encontra ameaçada.

Espécies: 4

Distribuição: Austrália

Pardalotus punctatus	pardalote-ponteado
Pardalotus quadragintus	pardalote-da-tasmânia
Pardalotus rubricatus	pardalote-de-sobrancelha-vermelha
Pardalotus striatus	pardalote-estriado

Acanthizidae — Acantizas, Gerígonos e afins

Estas pequenas aves de tons castanhos, cinzentos ou esverdeados fazem lembrar as felosas que conhecemos da Europa. Movimentam-se agilmente pela vegetação em busca de pequenos insectos e podem ser encontradas desde florestas tropicais da Malásia a matos áridos do interior australiano. Como muitas outras aves da região, nidificam de forma cooperativa. Os ninhos são por vezes construídos nas proximidades de colónias de aranhas ou vespas, ou até perto de ninhos de rapinas, como uma forma de protecção contra outros predadores.

Espécies: 66

Distribuição: Arquipélago indo-malaio, Filipinas e Australásia

Pachycare flavogriseum	face-dourada
Oreoscopus gutturalis	feteiro
Pycnoptilus floccosus	acantiza-piloto
Pyrrholaemus brunneus	acantiza-de-garganta-vermelha
Pyrrholaemus sagittatus	acantiza-malhada
Hylacola cauta	acantiza-tímida
Hylacola pyrrhopygia	acantiza-d'uropígio-ruivo
Calamanthus fuliginosus	acantiza-campestre-estriada
Calamanthus campestris	acantiza-campestre-ruiva
Calamanthus montanellus	acantiza-campestre-ocidental
Smicrornis brevirostris	gerígono-de-bico-curto
Neosericornis citreogularis	acantiza-de-garganta-amarela
Origma robusta	origma-robusta
Origma murina	origma-ferrugínea
Origma solitaria	origma-das-rochas
Sericornis humilis	acantiza-parda
Sericornis frontalis	acantiza-de-sobrancelha-branca
Sericornis maculatus	acantiza-maculada
Sericornis keri	acantiza-de-atherton
Sericornis beccarii	acantiza-de-beccari
Sericornis magnirostra	acantiza-bicuda
Sericornis nouhuysi	acantiza-grande
Aethomyias spilodera	acantiza-de-bico-pálido
Aethomyias nigrorufus	acantiza-bicolor
Aethomyias rufescens	acantiza-de-doberai
Aethomyias perspicillatus	acantiza-de-faces-canela
Aethomyias arfakianus	acantiza-esverdeada
Aethomyias papuensis	acantiza-da-papua

Acanthornis magna	arbusteiro-da-tasmânia
Aphelocephala leucopsis	cara-branca-do-sul
Aphelocephala nigricincta	cara-branca-de-colar
Aphelocephala pectoralis	cara-branca-de-peito-castanho
Acanthiza chrysorrhoa	acantiza-d'uropígio-amarelo
Acanthiza cinerea	acantiza-cinzenta
Acanthiza murina	acantiza-murina
Acanthiza nana	acantiza-amarela
Acanthiza lineata	acantiza-estriada
Acanthiza apicalis	acantiza-de-cauda-castanha
Acanthiza ewingii	acantiza-da-tasmânia
Acanthiza katherina	acantiza-das-montanhas
Acanthiza pusilla	acantiza-pequena
Acanthiza robustirostris	acantiza-ardósia
Acanthiza iredalei	acantiza-de-bico-fino
Acanthiza uropygialis	acantiza-d'uropígio-castanho
Acanthiza inornata	acantiza-ocidental
Acanthiza reguloides	acantiza-d'uropígio-creme
Gerygone chrysogaster	gerígono-de-barriga-amarela
Gerygone mouki	gerígono-castanho
Gerygone chloronota	gerígono-de-dorso-verde
Gerygone palpebrosa	gerígono-duende
Gerygone magnirostris	gerígono-de-bico-grande
Gerygone hypoxantha	gerígono-de-biak
Gerygone inornata	gerígono-timorense
Gerygone dorsalis	gerígono-de-flancos-ruivos
Gerygone olivacea	gerígono-de-garganta-branca
Gerygone sulphurea	gerígono-sulfúreo
Gerygone tenebrosa	gerígono-sombrio
Gerygone flavolateralis	gerígono-melanésio
Gerygone citrina	gerígono-de-rennell
Gerygone levigaster	gerígono-dos-mangais
Gerygone fusca	gerígono-ocidental
Gerygone ruficollis	gerígono-de-peito-castanho
Gerygone insularis	gerígono-de-lord-howe
Gerygone modesta	gerígono-de-norfolk
Gerygone igata	gerígono-maori
Gerygone albofrontata	gerígono-das-chatham

Pomatostomidae — Zaragateiros australianos

Do tamanho de tordos, estas aves têm uma plumagem dominada por tons castanhos e brancos e um bico longo e curvo. Vivem em grupos familiares e passam muito tempo no solo, em busca de alimento. A maioria das espécies encontra-se adaptada a locais bastante áridos. Embora façam lembrar os timalis e cimitarras asiáticos (Timaliidae), a cuja família já pertenceram, estes zaragateiros não lhes são próximos e estão hoje classificados numa família distinta.

Espécies: 5

Distribuição: Austrália e Papua

Garritornis isidorei	zaragateiro-da-papua
Pomatostomus temporalis	zaragateiro-de-coroa-cinzenta
Pomatostomus halli	zaragateiro-de-hall
Pomatostomus superciliosus	zaragateiro-de-sobrancelha-branca
Pomatostomus ruficeps	zaragateiro-de-coroa-castanha

Orthonychidae Corre-troncos

Encontramos aqui três espécies do tamanho de tordos e plumagem acastanhada – são os corre-troncos. Estas são aves que vivem em florestas húmidas da costa leste australiana e da Papua. Passam a maior parte do tempo no solo, à procura de invertebrados por entre a manta morta. Para isso, movimentam as suas patas lateralmente, de modo a conseguir remover melhor as folhas secas, e este comportamento reflecte-se na sua anatomia.

Espécies: 3

Distribuição: Austrália e Papua

Orthonyx novaeguineae	corre-troncos-da-papua
Orthonyx temminckii	corre-toncos-australiano
Orthonyx spaldingii	corre-troncos-de-spalding

Cnemophilidae — Aves-de-cetim

As três espécies de aves-de-cetim podem ser encontradas nas florestas tropicais densas e inacessíveis das montanhas da ilha da Papua, onde se alimentam principalmente de frutos. Ainda hoje em dia se sabe muito pouco sobre elas. Durante muito tempo eram consideradas parte da família das aves-do-paraíso, mas análises pormenorizadas da morfologia destas aves e da sua genética revelaram que têm uma origem bastante distinta.

Espécies: 3

Distribuição: Papua

Cnemophilus loriae	ave-de-cetim-de-loria
Cnemophilus macgregorii	ave-de-cetim-de-crista
Loboparadisea sericea	ave-de-cetim-carunculada

Melanocharitidae Pica-bagas e Bicudos

Esta pequena família, endémica das florestas tropicais da Papua, inclui dois conjuntos de espécies que partilham o habitat e uma plumagem verde-escura sem grandes contrastes, mas que diferem bastante na forma dos seus bicos e na sua alimentação. Os pica-bagas, como o nome indica, usam o seu bico curto para colher bagas, frutos e, por vezes, também insectos. Os bicudos usam o seu bico longo e curvo, semelhante ao dos beija-flores e papa-méis, para obter néctar e pólen, mas também capturam muitos insectos.

Espécies: 12

Distribuição: Papua

Melanocharis arfakiana	pica-bagas-obscuro
Melanocharis longicauda	pica-bagas-rabilongo
Melanocharis nigra	pica-bagas-preto
Melanocharis versteri	pica-bagas-de-leque
Melanocharis striativentris	pica-bagas-estriado
Melanocharis citreola	pica-bagas-de-cetim
Melanocharis crassirostris	pica-bagas-de-bico-grosso
Melanocharis piperata	pica-bagas-pintalgado
Oedistoma iliolophus	bicudo-anão
Oedistoma pygmaeum	bicudo-pigmeu
Toxorhamphus novaeguineae	bicudo-de-barriga-amarela
Toxorhamphus poliopterus	bicudo-de-cabeça-cinzenta

Paramythiidae — Pica-bagas coloridos

Uma de várias famílias endémicas da Papua, aqui se incluem três espécies que partilham o nome com os pica-bagas da família Melanocharitidae, graças aos seus hábitos e dieta semelhantes. No entanto, são de cores muito mais vivas e contrastantes que estes últimos. Ocorrem em florestas tropicais de montanha e alimentam-se predominantemente de bagas, frutos e flores. À parte isso, como em muitas outras aves da Papua, pouco se conhece sobre eles, e as suas relações taxonómicas com outras famílias são ainda pouco claras.

Espécies: 3

Distribuição: Papua

Oreocharis arfaki	pica-bagas-das-arfak
Paramythia olivacea	pica-bagas-de-crista-ocidental
Paramythia montium	pica-bagas-de-crista-oriental

Callaeidae Kokakos, Tieques e Huia

A família Callaeidae abrange um pequeno conjunto de passeriformes de média dimensão, todos endémicos da Nova Zelândia. São aves florestais, que têm patas fortes e carúnculas junto ao bico. As suas asas são muito fracas, pelo que a sua capacidade de voo é limitada. A família é composta por cinco espécies, mas uma delas já se extinguiu no início do século XX e outra encontra-se em perigo crítico e poderá estar igualmente extinta.

Espécies: 5

Distribuição: Nova Zelândia

Callaeas wilsoni	kokako-da-ilha-norte
Callaeas cinereus	kokako-da-ilha-sul
Philesturnus rufusater	tieque-da-ilha-norte
Philesturnus carunculatus	tieque-da-ilha-sul
Heteralocha acutirostris	huia

Notiomystidae — Hihi

Hihi é o nome maori dado a este pequeno passeriforme endémico da Nova Zelândia, que habita zonas florestais. Esta espécie, que já foi muito mais comum no passado, encontra-se actualmente ameaçada com o estatuto de 'vulnerável'. Chegou a ser muito rara, tendo desaparecido de quase todo o lado excepto da ilha Little Barrier (Hauturu). Em anos recentes foi reintroduzida em diversos locais, incluindo na ilha norte.

Espécies: 1

Distribuição: Nova Zelândia

Notiomystis cincta	hihi

Psophodidae Pássaros-chicote e Bicos-de-cunha

Os membros desta pequena família são passeriformes de média dimensão, de cores subtis e muitos deles com cristas. Alimentam-se de insectos ao nível do solo e em vegetação de baixa estatura, tanto em matos como em florestas. Ao contrário do que é comum nos passeriformes australianos, não se reproduzem cooperativamente e são antes monógamos. A designação de pássaro-chicote para parte das espécies refere-se ao som que produzem.

Espécies: 5

Distribuição: Austrália e Papua

Androphobus viridis	pássaro-chicote-da-papua
Psophodes olivaceus	pássaro-chicote-oriental
Psophodes nigrogularis	pássaro-chicote-ocidental
Psophodes cristatus	bico-de-cunha-oriental
Psophodes occidentalis	bico-de-cunha-ocidental

Cinclosomatidae Tordos-codornizes e Joalheiros

O nome dos tordos-codornizes fornece pistas sobre a sua aparência, que faz lembrar um tordo particularmente possante e com pernas curtas. São aves de hábitos terrestres, que constroem um ninho muito simples no solo e se alimentam de invertebrados e sementes, mas que sobem aos ramos para cantar. Os tordos-codornizes têm tons acastanhados e habitam zonas áridas da Austrália, ao passo que os joalheiros são predominantemente azuis e ocorrem nas selvas tropicais húmidas da Papua.

Espécies: 12

Distribuição: Austrália e Papua

Ptilorrhoa leucosticta	joalheiro-malhado
Ptilorrhoa caerulescens	joalheiro-azul
Ptilorrhoa geislerorum	joalheiro-dimorfo
Ptilorrhoa castanonota	joalheiro-de-dorso-castanho
Cinclosoma punctatum	tordo-codorniz-malhado
Cinclosoma castanotum	tordo-codorniz-castanho
Cinclosoma clarum	tordo-codorniz-cobreado
Cinclosoma cinnamomeum	tordo-codorniz-canela
Cinclosoma alisteri	tordo-codorniz-de-nullarbor
Cinclosoma castaneothorax	tordo-codorniz-de-peito-castanho
Cinclosoma marginatum	tordo-codorniz-ocidental
Cinclosoma ajax	tordo-codorniz-pintado

Encontramos aqui um conjunto de pequenas aves insectívoras: os bátis. Estas são aves arborícolas, que frequentam bosques de diversos tipos. A maioria das espécies tem uma plumagem dominada por tons de preto, cinzento e branco, sendo que os bátis-carunculados (género *Platysteira*) apresentam, adicionalmente, uma carúncula colorida na zona ocular. Dentro desta família, a diversidade é maior na faixa equatorial.

Espécies: 32

Distribuição: África subsariana

Batis diops	bátis-das-ruwenzori
Batis margaritae	bátis-de-margaret
Batis mixta	bátis-de-cauda-curta
Batis crypta	bátis-de-iringa
Batis dimorpha	bátis-malauiano
Batis capensis	bátis-do-cabo
Batis fratrum	bátis-dos-irmãos
Batis molitor	bátis-comum
Batis senegalensis	bátis-senegalês
Batis orientalis	bátis-de-coroa-cinzenta
Batis soror	bátis-moçambicano
Batis pririt	bátis-pririt
Batis minor	bátis-de-cabeça-preta
Batis erlangeri	bátis-de-erlanger
Batis perkeo	bátis-pigmeu
Batis minulla	bátis-angolano
Batis minima	bátis-gabonês
Batis ituriensis	bátis-do-ituri
Batis occulta	bátis-oculto
Batis poensis	bátis-de-fernando-pó
Lanioturdus torquatus	bátis-terrestre
Dyaphorophyia hormophora	bátis-carunculado-de-colar
Dyaphorophyia castanea	bátis-carunculado-castanho
Dyaphorophyia tonsa	bátis-carunculado-de-pintas-brancas
Platysteira laticincta	bátis-carunculado-de-bamenda
Platysteira peltata	bátis-carunculado-de-garganta-preta
Platysteira albifrons	bátis-carunculado-de-testa-branca
Platysteira cyanea	bátis-carunculado-de-garganta-castanha
Platysteira concreta	bátis-carunculado-de-barriga-ruiva
Platysteira blissetti	bátis-carunculado-de-blissett

Platysteira chalybea	bátis-carunculado-de-pescoço-preto
Platysteira jamesoni	bátis-carunculado-de-jameson

Malaconotidae — Gladiadores, Bubus e afins

As aves desta família concentram-se quase totalmente na África subsariana, havendo uma espécie que também ocorre a norte do Sara e no sul da Península Arábica. Frequentam savanas e outras áreas arborizadas e alimentam-se principalmente de insectos. Pelo seu aspecto podem fazer lembrar os picanços (Laniidae), em especial devido ao bico em forma de gancho, contudo a análise molecular permitiu confirmar que não são aparentados a estes.

Espécies: 50

Distribuição: África e Península Arábica

Malaconotus cruentus	gladiador-sangrento
Malaconotus monteiri	gladiador-de-monteiro
Malaconotus blanchoti	gladiador-de-cabeça-cinzenta
Malaconotus lagdeni	gladiador-de-lagden
Malaconotus gladiator	gladiador-de-peito-verde
Malaconotus alius	gladiador-das-uluguru
Chlorophoneus kupeensis	bubu-do-kupé
Chlorophoneus multicolor	bubu-multicolor
Chlorophoneus nigrifrons	bubu-de-testa-preta
Chlorophoneus olivaceus	bubu-esverdeado
Chlorophoneus bocagei	bubu-de-bocage
Chlorophoneus sulfureopectus	bubu-enxofrado
Telophorus viridis	bubu-quadricolor
Telophorus dohertyi	bubu-de-doherty
Telophorus zeylonus	boquemaquire
Rhodophoneus cruentus	bubu-de-peito-rosado
Bocagia minuta	tchagra-dos-pauis
Tchagra australis	tchagra-de-coroa-castanha
Tchagra jamesi	tchagra-somali
Tchagra tchagra	tchagra-austral
Tchagra senegalus	tchagra-de-coroa-preta
Dryoscopus sabini	cubla-de-sabine
Dryoscopus angolensis	cubla-de-patas-rosadas
Dryoscopus senegalensis	cubla-d'ombros-pretos
Dryoscopus cubla	cubla-de-almofadinha
Dryoscopus gambensis	cubla-da-gâmbia
Dryoscopus pringlii	cubla-de-pringle
Laniarius leucorhynchus	bubu-sombrio
Laniarius poensis	bubu-montês
Laniarius holomelas	bubu-albertino

Laniarius willardi	bubu-de-willard
Laniarius fuelleborni	bubu-de-fülleborn
Laniarius funebris	bubu-fúnebre
Laniarius luehderi	bubu-de-lühder
Laniarius brauni	bubu-de-braun
Laniarius amboimensis	bubu-da-gabela
Laniarius ruficeps	bubu-de-nuca-ruiva
Laniarius nigerrimus	bubu-de-reichenow
Laniarius aethiopicus	bubu-abissínio
Laniarius major	bubu-tropical
Laniarius sublacteus	bubu-de-cassin
Laniarius ferrugineus	bubu-ferrugíneo
Laniarius bicolor	bubu-bicolor
Laniarius turatii	bubu-de-turati
Laniarius barbarus	bubu-de-coroa-amarela
Laniarius mufumbiri	bubu-dos-papiros
Laniarius erythrogaster	bubu-de-cabeça-preta
Laniarius atrococcineus	bubu-de-peito-vermelho
Laniarius atroflavus	bubu-de-peito-amarelo
Nilaus afer	brubru

Machaerirhynchidae Bicos-largos

Esta pequena família compreende apenas duas espécies, sendo uma delas endémica da Papua e a outra da Austrália. São aves pequenas, com a plumagem preta e amarela, com asas curtas e uma cauda longa. A sua característica mais diferenciadora reside no bico, que tem um aspecto espalmado. Os bicos-largos vivem em zonas florestais e alimentam-se de insectos e outros invertebrados.

Espécies: 2

Distribuição: Australásia

Machaerirhynchus flaviventer	bico-largo-de-peito-amarelo
Machaerirhynchus nigripectus	bico-largo-de-peito-preto

Vangidae Vangas, Atacadores e afins

Os vangas são um grupo fascinante pela diversidade de formas de bico e constituem um excelente exemplo de radiação adaptativa, em que os descendentes de um antepassado comum evoluem para formas diferentes, adaptando-se aos recursos disponíveis. No passado esta família incluía apenas os vangas e estava restrita a Madagáscar e às Comores. Todavia, em resultado das recentes revisões taxonómicas passou a incluir outras espécies, como os atacadores africanos e asiáticos.

Espécies: 40

Distribuição: África subsariana, Ásia meridional e Madagáscar e Comores

Calicalicus madagascariensis	vanga-de-cauda-vermelha
Calicalicus rufocarpalis	vanga-d'ombros-vermelhos
Vanga curvirostris	vanga-de-bico-em-gancho
Oriolia bernieri	vanga-preto
Xenopirostris xenopirostris	vanga-de-lafresnaye
Xenopirostris damii	vanga-de-van-dam
Xenopirostris polleni	vanga-de-pollen
Falculea palliata	vanga-de-bico-curvo
Artamella viridis	vanga-de-cabeça-branca
Leptopterus chabert	vanga-chabert
Cyanolanius comorensis	vanga-comorense
Cyanolanius madagascarinus	vanga-azul
Schetba rufa	vanga-ruivo
Euryceros prevostii	vanga-de-capacete
Tylas eduardi	vanga-de-cabeça-preta
Hypositta corallirostris	vanga-trepador
Newtonia amphichroa	newtonia-escura
Newtonia brunneicauda	newtonia-comum
Newtonia archboldi	newtonia-de-archbold
Newtonia fanovanae	newtonia-de-cauda-ruiva
Pseudobias wardi	vanga-de-ward
Mystacornis crossleyi	vanga-de-bigode
Prionops plumatus	atacador-de-poupa-branca
Prionops poliolophus	atacador-de-poupa-cinzenta
Prionops alberti	atacador-de-poupa-amarela
Prionops caniceps	atacador-de-bico-vermelho
Prionops rufiventris	atacador-de-barriga-ruiva
Prionops retzii	atacador-de-retz

Prionops gabela	atacador-da-gabela
Prionops scopifrons	atacador-de-testa-ruiva
Hemipus picatus	atacador-d'asa-barrada
Hemipus hirundinaceus	atacador-d'asa-preta
Tephrodornis virgatus	atacador-do-mato-grande
Tephrodornis sylvicola	atacador-do-mato-malabar
Tephrodornis pondicerianus	atacador-do-mato-pequeno
Tephrodornis affinis	atacador-do-mato-cingalês
Philentoma pyrhoptera	filentoma-d'asa-castanha
Philentoma velata	filentoma-de-peito-castanho
Megabyas flammulatus	bias-flamejante
Bias musicus	bias-músico

Pityriasidae Gimnocéfalo-do-bornéu

Com um aspecto invulgar, o gimnocéfalo é uma espécie pouco comum e algo enigmática que habita nas copas das florestas do Bornéu. É uma ave de tamanho médio, cuja plumagem é preta, excepto na zona do pescoço, onde é vermelha; a parte superior da cabeça encontra-se desprovida de penas, mas está coberta de cerdas. Tal como sucede com outras espécies das florestas tropicais, o principal factor de ameaça reside na destruição de habitat.

Espécies: 1

Distribuição: Ilha do Bornéu

Pityriasis gymnocephala	gimnocéfalo-do-bornéu

Artamidae — Andorinhas-do-bosque, Verdugos e afins

A família Artamidae reúne um conjunto de aves de tamanhos e aspectos muito variados: as andorinhas-do-bosque, que são voadoras ágeis e são dos poucos passeriformes capazes de planar; os currawongs, cuja morfologia faz lembrar os corvídeos; os verdugos, com o seu bico em forma de gancho, que têm semelhanças com os picanços da Europa e da Ásia; e os peltopos, um pouco mais pequenos que estes e que são endémicos da Papua.

Espécies: 24

Distribuição: Sul da Ásia e Austrália

Artamus fuscus	andorinha-do-bosque-cinzenta
Artamus leucorynchus	andorinha-do-bosque-de-barriga-branca
Artamus mentalis	andorinha-do-bosque-das-fiji
Artamus monachus	andorinha-do-bosque-de-celebes
Artamus maximus	andorinha-do-bosque-grande
Artamus insignis	andorinha-do-bosque-das-bismarck
Artamus personatus	andorinha-do-bosque-mascarada
Artamus superciliosus	andorinha-do-bosque-de-sobrancelha-branca
Artamus cinereus	andorinha-do-bosque-de-faces-pretas
Artamus cyanopterus	andorinha-do-bosque-sombria
Artamus minor	andorinha-do-bosque-pequena
Peltops blainvillii	peltopo-das-planícies
Peltops montanus	peltopo-montês
Melloria quoyi	verdugo-preto
Gymnorhina tibicen	verdugo-flautista
Cracticus torquatus	verdugo-de-colar
Cracticus argenteus	verdugo-prateado
Cracticus mentalis	verdugo-de-dorso-preto
Cracticus nigrogularis	verdugo-de-peito-preto
Cracticus cassicus	verdugo-de-cabeça-preta
Cracticus louisiadensis	verdugo-de-tagula
Strepera graculina	currawong-malhado
Strepera fuliginosa	currawong-preto
Strepera versicolor	currawong-cinzento

Rhagologidae Sibilante-malhado

Esta é uma família mono-específica, que compreende unicamente o sibilante-malhado. Esta ave, endémica das florestas montanhosas da Papua, é relativamente mal conhecida, pois é tímida e mostra-se pouco. Muitos dos contactos com esta espécie acontecem através de capturas em sessões de anilhagem e não da observação directa no terreno. A sua dieta é mal conhecida, mas pensa-se que se alimenta de bagas e insectos.

Espécies: 1

Distribuição: Papua

Rhagologus leucostigma	sibilante-malhado

Aegithinidae — Ioras

As ioras são aves insectívoras que habitam nas florestas, matos e jardins do sul da Ásia. Têm uma plumagem dominada por tons amarelos ou verdes. Os machos realizam uma parada nupcial impressionante, que nalgumas espécies se caracteriza por uma subida a pique, seguida de uma descida em pára-quedas, com as penas amarelas frontais e traseiras estendidas para fora, fazendo a ave parecer uma bola amarela em queda.

Espécies: 4

Distribuição: Ásia meridional

Aegithina tiphia	iora-d'asa-escura
Aegithina nigrolutea	iora-de-cauda-branca
Aegithina viridissima	iora-verde
Aegithina lafresnayei	iora-grande

Campephagidae — Lagarteiros e Minivetes

Esta é uma família relativamente numerosa, que reúne 79 espécies de lagarteiros e 15 espécies de minivetes. São aves de tamanho pequeno a médio, com uma cauda longa e uma plumagem dominada por tons de branco, preto e cinzento (lagarteiros) ou também com vermelho vivo (minivetes). Vivem em zonas arborizadas e alimentam-se essencialmente de invertebrados, capturando muitas vezes lagartas peludas, que são evitadas por outras aves.

Espécies: 108

Distribuição: África subsariana, Ásia, Austrália e diversas ilhas

Pericrocotus erythropygius	minivete-de-barriga-branca
Pericrocotus albifrons	minivete-de-testa-branca
Pericrocotus igneus	minivete-flamejante
Pericrocotus cinnamomeus	minivete-pequeno
Pericrocotus solaris	minivete-mandarim
Pericrocotus miniatus	minivete-das-sundas
Pericrocotus brevirostris	minivete-de-bico-curto
Pericrocotus lansbergei	minivete-das-flores
Pericrocotus ethologus	minivete-rabilongo
Pericrocotus flammeus	minivete-citrino
Pericrocotus speciosus	minivete-escarlate
Pericrocotus divaricatus	minivete-cinzento
Pericrocotus tegimae	minivete-das-ryukyu
Pericrocotus cantonensis	minivete-cantonês
Pericrocotus roseus	minivete-rosado
Ceblepyris cinereus	lagarteiro-malgaxe
Ceblepyris cucullatus	lagarteiro-das-comores
Ceblepyris graueri	lagarteiro-de-grauer
Ceblepyris pectoralis	lagarteiro-de-peito-branco
Ceblepyris caesius	lagarteiro-cinzento
Coracina caeruleogrisea	lagarteiro-de-bico-grosso
Coracina longicauda	lagarteiro-de-capuz
Coracina temminckii	lagarteiro-cerúleo
Coracina bicolor	lagarteiro-bicolor
Coracina maxima	lagarteiro-terrestre
Coracina lineata	lagarteiro-barrado
Coracina novaehollandiae	lagarteiro-de-faces-pretas
Coracina boyeri	lagarteiro-de-boyer
Coracina fortis	lagarteiro-de-buru
Coracina personata	lagarteiro-da-wallacea
Coracina welchmani	lagarteiro-de-welchman

Coracina caledonica	lagarteiro-melanésio
Coracina striata	lagarteiro-estriado
Coracina mindorensis	lagarteiro-de-mindoro
Coracina panayensis	lagarteiro-das-vissaias
Coracina kochii	lagarteiro-de-mindanau
Coracina guillemardi	lagarteiro-de-sulu
Coracina macei	lagarteiro-grande
Coracina javensis	lagarteiro-oriental
Coracina larutensis	lagarteiro-malaio
Coracina dobsoni	lagarteiro-das-andamão
Coracina schistacea	lagarteiro-ardósio
Coracina leucopygia	lagarteiro-d'uropígio-branco
Coracina larvata	lagarteiro-das-sundas
Coracina papuensis	lagarteiro-de-barriga-branca
Coracina atriceps	lagarteiro-das-molucas
Coracina parvula	lagarteiro-de-halmaera
Campephaga flava	lagarteiro-preto
Campephaga phoenicea	lagarteiro-d'ombros-vermelhos
Campephaga petiti	lagarteiro-de-petit
Campephaga quiscalina	lagarteiro-de-garganta-púrpura
Lobotos lobatus	lagarteiro-ganês
Lobotos oriolinus	lagarteiro-oriolino
Campochaera sloetii	lagarteiro-dourado
Malindangia mcgregori	lagarteiro-de-mindanau
Edolisoma anale	lagarteiro-da-nova-caledónia
Edolisoma ostentum	lagarteiro-d'asa-branca
Edolisoma coerulescens	lagarteiro-escuro
Edolisoma montanum	lagarteiro-de-barriga-preta
Edolisoma dohertyi	lagarteiro-de-sumba
Edolisoma dispar	lagarteiro-das-kai
Edolisoma schisticeps	lagarteiro-de-cabeça-cinzenta
Edolisoma ceramense	lagarteiro-pálido
Edolisoma mindanense	lagarteiro-filipino
Edolisoma salomonis	lagarteiro-de-makira
Edolisoma holopolium	lagarteiro-das-salomão
Edolisoma tricolor	lagarteiro-de-malaita
Edolisoma morio	lagarteiro-de-celebes
Edolisoma salvadorii	lagarteiro-de-sangihe
Edolisoma incertum	lagarteiro-incerto
Edolisoma remotum	lagarteiro-remoto
Edolisoma erythropygium	lagarteiro-das-salomão
Edolisoma sula	lagarteiro-das-sula
Edolisoma tenuirostre	lagarteiro-de-bico-fino
Edolisoma rostratum	lagarteiro-da-rossel
Edolisoma meyerii	lagarteiro-de-biak

Edolisoma pelingi	lagarteiro-de-banggai
Edolisoma obiense	lagarteiro-de-obi
Edolisoma grayi	lagarteiro-de-gray
Edolisoma amboinense	lagarteiro-de-amboíno
Edolisoma timoriense	lagarteiro-timorense
Edolisoma admiralitatis	lagarteiro-do-almirantado
Edolisoma monacha	lagarteiro-de-palau
Edolisoma nesiotis	lagarteiro-de-yap
Edolisoma insperatum	lagarteiro-de-ponapé
Edolisoma melas	lagarteiro-índigo
Celebesica abbotti	lagarteiro-pigmeu
Cyanograucalus azureus	lagarteiro-azul
Lalage maculosa	lagarteiro-polinésio
Lalage sharpei	lagarteiro-de-samoa
Lalage sueurii	lagarteiro-d'ombros-brancos
Lalage leucopyga	lagarteiro-rabilongo
Lalage tricolor	lagarteiro-tricolor
Lalage aurea	lagarteiro-de-barriga-ruiva
Lalage atrovirens	lagarteiro-de-sobrancelha-preta
Lalage leucoptera	lagarteiro-de-biak
Lalage moesta	lagarteiro-das-tanimbar
Lalage leucomela	lagarteiro-variado
Lalage conjuncta	lagarteiro-de-são-matias
Lalage melanoleuca	lagarteiro-alvinegro
Lalage nigra	lagarteiro-malhado
Lalage leucopygialis	lagarteiro-de-walden
Lalage melaschistos	lagarteiro-d'asa-preta
Lalage melanoptera	lagarteiro-de-cabeça-preta
Lalage polioptera	lagarteiro-indochinês
Lalage fimbriata	lagarteiro-pequeno
Lalage typica	lagarteiro-das-maurícias
Lalage newtoni	lagarteiro-da-reunião

O nome genérico *Mohoua* que abrange as três espécies desta família tem origem no termo maori ‘mohua’, que se refere à espécie mohoua-de-cabeça-amarela. São aves gregárias, que se alimentam em grupo e duas das espécies praticam reprodução cooperativa. Vivem sobretudo em zonas florestadas ou com matagal. Todas elas são vítimas de parasitismo por parte do koel-rabilongo, um cuco migrador que visita a Nova Zelândia durante a primavera austral.

Espécies: 3

Distribuição: Nova Zelândia

Mohoua ochrocephala	mohoua-de-cabeça-amarela
Mohoua albicilla	mohoua-de-cabeça-branca
Mohoua novaeseelandiae	mohoua-pipipi

Neosittidae — Trepadeira-variável e afins

As trepadeiras desta família são aves florestais, com o bico relativamente fino, que usam para extrair insectos da casca das árvores. Assemelham-se à trepadeira-azul e a outras aves do género *Sitta* e já integraram a família destas no passado, mas entretanto foram separadas. Entre as várias diferenças, salienta-se o facto de serem mais sociáveis, vivendo em pequenos grupos, e de construírem um ninho em forma de taça, em vez de nidificarem em cavidades.

Espécies: 3

Distribuição: Australásia

Daphoenositta chrysoptera	trepadeira-variável
Daphoenositta papuensis	trepadeira-da-papua
Daphoenositta miranda	trepadeira-preta

Eulacestomatidae — Descascador-carunculado

O descascador-carunculado é um pequeno passeriforme endémico da Papua, sendo o único membro da sua família. A plumagem é castanha-esverdeada e o estranho bico, em forma de cunha, parece comprimido lateralmente. O macho tem as partes inferiores pretas e duas carúnculas rosadas na face. Esta espécie vive em zonas florestais montanhosas com subcoberto denso e, apesar de não se encontrar ameaçada, sabe-se muito pouco acerca da sua biologia reprodutiva.

Espécies: 1

Distribuição: Papua

Eulacestoma nigropectus	descascador-carunculado

O nome sineiros está relacionado com o seu canto sibilante que faz lembrar campainhas (*bellbird* em inglês). Duas das espécies são endémicas da Papua e vivem em florestas, ao passo que a terceira é australiana e prefere zonas mais áridas. Tal como acontece com outras espécies da região, no passado estas aves foram classificadas em diferentes famílias; todavia, com base em análises genéticas recentes, concluiu-se que deveriam ter a sua própria família.

Espécies: 3

Distribuição: Austrália e Papua

Aleadryas rufinucha	sineiro-de-nuca-ruiva
Ornorectes cristatus	sineiro-de-crista
Oreoica gutturalis	sineiro-de-garganta-branca

Falcunculidae Picanço-chapim

O nome picanço-chapim vem do facto de estas aves terem aspecto de picanço com coloração de chapim, tendo a espécie-tipo sido descrita inicialmente como um picanço e até colocada no género *Lanius*. A família é endémica da Austrália e compreende três espécies com distribuições disjuntas: uma a norte, outra a leste e outra a oeste - no passado foram consideradas conspecíficas. Estas aves habitam bosques de eucaliptos e outras matas e alimentam-se sobretudo de invertebrados, que capturam depois de levantar as cascas com o seu bico grosso.

Espécies: 3

Distribuição: Austrália

Falcunculus whitei	picanço-chapim-nortenho
Falcunculus leucogaster	picanço-chapim-ocidental
Falcunculus frontatus	picanço-chapim-oriental

Pachycephalidae Sibilantes, Picanços australianos e afins

Aqui se inclui uma série de aves de cabeça grande e bico relativamente robusto. A maior parte delas ocorre em zonas arborizadas da Australásia, mas um pequeno número de espécies pode ser encontrado na Ásia, para lá da linha de Wallace. Os sibilantes são assim denominados devido aos seus belíssimos cantos assobiados. Os picanços australianos partilham o nome com os membros da família Laniidae devido aos seus hábitos parcialmente predatórios, capturando tanto invertebrados como pequenos vertebrados.

Espécies: 63

Distribuição: Austrália, Papua, arquipélago indo-malaio e sudeste asiático

Coracornis raveni	sibilante-de-dorso-castanho
Coracornis sanghirensis	sibilante-de-sangihe
Melanorectes nigrescens	sibilante-preto
Pachycephala olivacea	sibilante-oliváceo
Pachycephala rufogularis	sibilante-de-garganta-ruiva
Pachycephala inornata	sibilante-de-gilbert
Pachycephala cinerea	sibilante-dos-mangais
Pachycephala albiventris	sibilante-de-dorso-verde
Pachycephala homeyeri	sibilante-de-crisso-branco
Pachycephala phaionota	sibilante-das-molucas
Pachycephala melanorhyncha	sibilante-de-biak
Pachycephala hyperythra	sibilante-ferrugíneo
Pachycephala modesta	sibilante-modesto
Pachycephala philippinensis	sibilante-filipino
Pachycephala sulfuriventer	sibilante-sulfúreo
Pachycephala hypoxantha	sibilante-do-bornéu
Pachycephala meyeri	sibilante-de-doberai
Pachycephala simplex	sibilante-cinzento
Pachycephala orpheus	sibilante-timorense
Pachycephala soror	sibilante-de-sclater
Pachycephala calliope	sibilante-de-peito-ruivo
Pachycephala teysmanni	sibilante-das-selaiar
Pachycephala macrorhyncha	sibilante-de-garganta-amarela
Pachycephala balim	sibilante-do-baliem
Pachycephala mentalis	sibilante-de-queixo-preto
Pachycephala pectoralis	sibilante-dourado
Pachycephala fuliginosa	sibilante-ocidental
Pachycephala citreogaster	sibilante-das-bismarck
Pachycephala orioloides	sibilante-papa-figos
Pachycephala collaris	sibilante-das-luisíadas
Pachycephala feminina	sibilante-de-rennell

Pachycephala chlorura	sibilante-melanésio
Pachycephala caledonica	sibilante-da-nova-caledónia
Pachycephala vitiensis	sibilante-das-fiji
Pachycephala graeffii	sibilante-de-garganta-amarela
Pachycephala ornata	sibilante-de-nendö
Pachycephala utupuae	sibilante-de-utupua
Pachycephala vanikorensis	sibilante-de-temotu
Pachycephala jacquinoti	sibilante-de-tonga
Pachycephala melanura	sibilante-de-cauda-preta
Pachycephala flavifrons	sibilante-de-samoa
Pachycephala implicata	sibilante-de-guadalcanal
Pachycephala richardsi	sibilante-de-bougainville
Pachycephala nudigula	sibilante-das-flores
Pachycephala lorentzi	sibilante-de-lorentz
Pachycephala schlegelii	sibilante-de-schlegel
Pachycephala aurea	sibilante-áureo
Pachycephala rufiventris	sibilante-ruivo
Pachycephala monacha	sibilante-monge
Pachycephala leucogastra	sibilante-de-peito-preto
Pachycephala sharpei	sibilante-das-babar
Pachycephala arctitorquis	sibilante-da-wallacea
Pachycephala griseonota	sibilante-monótono
Pachycephala johni	sibilante-de-peito-canela
Pachycephala lanioides	sibilante-de-peito-branco
Pachycephala tenebrosa	sibilante-de-palau
Pseudorectes incertus	pitouí-de-barriga-branca
Pseudorectes ferrugineus	pitouí-ferrugíneo
Colluricincla boweri	picanço-de-bower
Colluricincla tenebrosa	picanço-fuliginoso
Colluricincla megarhyncha	picanço-de-arafura
Colluricincla harmonica	picanço-musical
Colluricincla woodwardi	picanço-das-rochas

Vireonidae Víreos, Vite-vites e Assobiadores

A família dos víreos inclui maioritariamente pequenas aves com bicos relativamente fortes e que frequentam vegetação arbórea. A sua alimentação é diversificada, incluindo insectos, bagas e frutos. No passado, a aparente inconsistência entre a sua distribuição restrita ao Novo Mundo e a proximidade genética a várias famílias do Velho Mundo (como os papa-figos) gerou alguma confusão. Entretanto, foi descoberto que várias espécies asiáticas são geneticamente muito afins dos víreos, sendo incluídas nesta família e resolvendo em parte esse mistério.

Espécies: 65

Distribuição: Américas (excepto extremo norte e sul), sudeste asiático e arquipélago indo-malaio

Pteruthius xanthochlorus	víreo-verde
Pteruthius melanotis	víreo-orelhudo
Pteruthius rufiventer	víreo-de-barriga-ruiva
Pteruthius aeralatus	víreo-de-blyth
Pteruthius flaviscapis	víreo-javanês
Pteruthius intermedius	víreo-de-hume
Pteruthius aenobarbus	víreo-de-queixo-ruivo
Erpornis zantholeuca	víreo-de-poupa
Cyclarhis gujanensis	assobiador-de-sobrancelha-ruiva
Cyclarhis nigrirostris	assobiador-de-bico-preto
Vireolanius melitophrys	assobiador-de-flancos-castanhos
Vireolanius pulchellus	assobiador-esmeralda
Vireolanius eximius	assobiador-de-sobrancelha-amarela
Vireolanius leucotis	assobiador-de-coroa-cinzenta
Hylophilus amaurocephalus	vite-vite-d'olho-cinzento
Hylophilus poicilotis	vite-vite-coroado
Hylophilus olivaceus	vite-vite-oliváceo
Hylophilus pectoralis	vite-vite-de-cabeça-cinzenta
Hylophilus brunneiceps	vite-vite-de-cabeça-castanha
Hylophilus thoracicus	vite-vite-de-peito-amarelo
Hylophilus flavipes	vite-vite-dos-arbustos
Hylophilus semicinereus	vite-vite-da-várzea
Tunchiornis ochraceiceps	vite-vite-de-coroa-castanha
Tunchiornis ferrugineifrons	vite-vite-de-testa-ruiva
Tunchiornis luteifrons	vite-vite-guianense
Tunchiornis rubrifrons	vite-vite-do-pará
Pachysylvia decurtata	vite-vite-pequeno
Pachysylvia hypoxantha	vite-vite-de-coroa-parda
Pachysylvia muscicapina	vite-vite-de-faces-fulvas

Pachysylvia aurantiifrons	vite-vite-de-testa-dourada
Pachysylvia semibrunnea	vite-vite-de-nuca-ruiva
Vireo hypochryseus	víreo-dourado
Vireo flavoviridis	víreo-verde-amarelado
Vireo olivaceus	víreo-d'olho-vermelho
Vireo magister	víreo-do-iucatão
Vireo altiloquus	víreo-de-bigodes
Vireo chivi	víreo-chivi
Vireo gracilirostris	víreo-de-noronha
Vireo sclateri	víreo-dos-tepuis
Vireo philadelphicus	víreo-de-filadélfia
Vireo swainsoni	víreo-de-swainson
Vireo gilvus	víreo-gorjeador
Vireo leucophrys	víreo-de-coroa-castanha
Vireo huttoni	víreo-de-hutton
Vireo vicinior	víreo-cinzento
Vireo flavifrons	víreo-de-garganta-amarela
Vireo carmioli	víreo-d'asa-amarela
Vireo masteri	víreo-do-chocó
Vireo solitarius	víreo-de-cabeça-azul
Vireo cassinii	víreo-de-cabeça-cinzenta
Vireo plumbeus	víreo-plúmbeo
Vireo osburni	víreo-montês
Vireo nanus	víreo-dominicano
Vireo pallens	víreo-dos-mangais
Vireo bairdi	víreo-de-cozumel
Vireo caribaeus	víreo-de-santo-andré
Vireo griseus	víreo-d'olho-branco
Vireo crassirostris	víreo-de-bico-grosso
Vireo modestus	víreo-jamaicano
Vireo gundlachii	víreo-cubano
Vireo bellii	víreo-de-coroa-cinzenta
Vireo latimeri	víreo-porto-riquenho
Vireo atricapilla	víreo-de-cabeça-preta
Vireo nelsoni	víreo-anão
Vireo brevipennis	víreo-ardósia

Oriolidae — Papa-figos e afins

Muitas vezes coloridos, mas nem sempre fáceis de ver, os papa-figos são aves arborícolas, que têm tendência a frequentar as copas. Têm uma dieta bastante oportunista, que inclui frutas, bagas, néctar e invertebrados. O seu ninho situa-se geralmente na bifurcação de um ramo, muitas vezes perto do ninho de espécies mais agressivas, como drongos ou picanços, a fim de obter protecção adicional contra predadores. Muitas espécies têm um canto melodioso.

Espécies: 41

Distribuição: Eurásia, África e Austrália

Turnagra tanagra	piopio-da-ilha-norte
Turnagra capensis	piopio-da-ilha-sul
Sphecotheres viridis	papa-figos-timorense
Sphecotheres hypoleucus	papa-figos-de-wetar
Sphecotheres vieilloti	papa-figos-de-vieillot
Pitohui kirhocephalus	pitouí-variável-do-norte
Pitohui cerviniventris	pitouí-de-waigeo
Pitohui uropygialis	pitouí-variável-do-sul
Pitohui dichrous	pitouí-de-capuz
Oriolus isabellae	papa-figos-de-isabela
Oriolus forsteni	papa-figos-de-ceram
Oriolus bouroensis	papa-figos-de-buru
Oriolus phaeochromus	papa-figos-de-halmaera
Oriolus sagittatus	papa-figos-estriado
Oriolus melanotis	papa-figos-de-faces-escuras
Oriolus finschi	papa-figos-de-finsch
Oriolus decipiens	papa-figos-das-tanimbar
Oriolus szalayi	papa-figos-castanho
Oriolus flavocinctus	papa-figos-verde
Oriolus cruentus	papa-figos-sangrento
Oriolus consanguineus	papa-figos-de-samatra
Oriolus hosii	papa-figos-preto
Oriolus traillii	papa-figos-escarlate
Oriolus mellianus	papa-figos-prateado
Oriolus xanthornus	papa-figos-de-capuz
Oriolus xanthonotus	papa-figos-de-garganta-preta
Oriolus consobrinus	papa-figos-ventríloquo
Oriolus steerii	papa-figos-filipino
Oriolus albiloris	papa-figos-de-lução
Oriolus chlorocephalus	papa-figos-de-cabeça-verde
Oriolus brachyrynchus	papa-figos-de-cabeça-preta

Oriolus crassirostris	papa-figos-de-são-tomé
Oriolus larvatus	papa-figos-mascarado
Oriolus monacha	papa-figos-monge
Oriolus percivali	papa-figos-montês
Oriolus nigripennis	papa-figos-d'asa-preta
Oriolus auratus	papa-figos-africano
Oriolus kundoo	papa-figos-indiano
Oriolus oriolus	papa-figos-europeu
Oriolus chinensis	papa-figos-de-nuca-preta
Oriolus tenuirostris	papa-figos-de-bico-fino

Os drongos são passeriformes insectívoros, com uma plumagem preta ou cinzenta escura, que pode ser mate ou metalizada, e uma cauda longa, em geral bifurcada e por vezes com formas elaboradas. Adoptam uma postura vertical, podendo manter-se no mesmo poiso por longos períodos. Vivem em zonas arborizadas, incluindo florestas densas, savanas e jardins. São muito vocais, imitam outras aves e frequentemente alertam para a presença de predadores.

Espécies: 28

Distribuição: África, Sul da Ásia, Austrália e diversas ilhas

Dicrurus aeneus	drongo-bronzeado
Dicrurus remifer	drongo-pequeno-de-raquetes
Dicrurus annectens	drongo-de-bico-grosso
Dicrurus paradiseus	drongo-grande-de-raquetes
Dicrurus lophorinus	drongo-cingalês
Dicrurus andamanensis	drongo-das-andamão
Dicrurus sumatranus	drongo-de-samatra
Dicrurus montanus	drongo-de-celebes
Dicrurus bracteatus	drongo-escamoso
Dicrurus megarhynchus	drongo-do-paraíso
Dicrurus hottentottus	drongo-de-crista
Dicrurus menagei	drongo-de-tablas
Dicrurus palawanensis	drongo-de-palawan
Dicrurus balicassius	drongo-filipino
Dicrurus striatus	drongo-de-cauda-curta
Dicrurus densus	drongo-da-wallacea
Dicrurus leucophaeus	drongo-cinzento
Dicrurus caerulescens	drongo-de-barriga-branca
Dicrurus waldenii	drongo-de-maiote
Dicrurus forficatus	drongo-malgaxe
Dicrurus aldabranus	drongo-de-aldabra
Dicrurus fuscipennis	drongo-das-comores
Dicrurus modestus	drongo-modesto
Dicrurus adsimilis	drongo-de-cauda-forcada
Dicrurus macrocercus	drongo-real
Dicrurus ludwigii	drongo-de-cauda-quadrada
Dicrurus atripennis	drongo-resplandecente
Dicrurus sharpei	drongo-de-sharpe

Rhipiduridae — Abanicos e afins

Os abanicos são, na sua maioria, pequenas aves de tons escuros e cauda comprida, cujo nome resulta do facto de abrirem frequentemente a sua cauda como um leque. Pensa-se que as manchas brancas expostas na cauda aberta alertam os insectos e levam-nos a mover-se, sendo assim mais facilmente capturados pela ave. São aves de hábitos florestais, mas algumas espécies frequentam zonas mais abertas e áreas urbanas.

Espécies: 65

Distribuição: Ásia meridional e Australásia

Rhipidura superciliaris	abanico-de-mindanau
Rhipidura samarensis	abanico-de-samar
Rhipidura cyaniceps	abanico-de-lução
Rhipidura sauli	abanico-de-tablas
Rhipidura albiventris	abanico-das-vissaias
Rhipidura albicollis	abanico-de-garganta-branca
Rhipidura albogularis	abanico-indiano
Rhipidura euryura	abanico-javanês
Rhipidura aureola	abanico-aureolado
Rhipidura javanica	abanico-bicolor
Rhipidura nigritorquis	abanico-filipino
Rhipidura perlata	abanico-perlado
Rhipidura leucophrys	abanico-de-garganta-preta
Rhipidura diluta	abanico-de-cabeça-castanha
Rhipidura fuscorufa	abanico-de-cauda-canela
Rhipidura rufiventris	abanico-timorense
Rhipidura kordensis	abanico-de-biak
Rhipidura cockerelli	abanico-de-cockerell
Rhipidura coultasi	abanico-de-coultas
Rhipidura threnothorax	abanico-do-mato
Rhipidura maculipectus	abanico-de-peito-malhado
Rhipidura leucothorax	abanico-de-barriga-branca
Rhipidura atra	abanico-preto
Rhipidura hyperythra	abanico-de-barriga-ruiva
Rhipidura albolimbata	abanico-amistoso
Rhipidura albiscapa	abanico-cinzento
Rhipidura fuliginosa	abanico-maori
Rhipidura phasiana	abanico-dos-mangais
Rhipidura drownei	abanico-de-bougainville
Rhipidura ocularis	abanico-de-guadalcanal
Rhipidura tenebrosa	abanico-sombrio
Rhipidura rennelliana	abanico-de-rennell

Rhipidura verreauxi	abanico-malhado
Rhipidura spilodera	abanico-de-vanuatu
Rhipidura layardi	abanico-das-fiji
Rhipidura personata	abanico-de-kadavu
Rhipidura nebulosa	abanico-de-samoa
Rhipidura phoenicura	abanico-de-cauda-ruiva
Rhipidura nigrocinnamomea	abanico-canela
Rhipidura brachyrhyncha	abanico-dimorfo
Rhipidura lepida	abanico-de-palau
Rhipidura dedemi	abanico-de-ceram
Rhipidura superflua	abanico-supérfluo
Rhipidura teysmanni	abanico-de-celebes
Rhipidura habibiei	abanico-de-peleng
Rhipidura sulaensis	abanico-de-taliabu
Rhipidura opistherythra	abanico-das-tanimbar
Rhipidura rufidorsa	abanico-de-dorso-ruivo
Rhipidura dahli	abanico-das-bismarck
Rhipidura matthiae	abanico-de-mussau
Rhipidura malaitae	abanico-de-malaita
Rhipidura semirubra	abanico-de-manus
Rhipidura dryas	abanico-de-arafura
Rhipidura semicollaris	abanico-de-meio-colar
Rhipidura torrida	abanico-das-molucas
Rhipidura rufifrons	abanico-de-testa-ruiva
Rhipidura kubaryi	abanico-de-ponapé
Rhipidura louisiadensis	abanico-das-luisíadas
Rhipidura melanolaema	abanico-das-santa-cruz
Rhipidura versicolor	abanico-da-micronésia
Rhipidura rufofronta	abanico-das-salomão
Chaetorhynchus papuensis	abanico-da-papua
Eutrichomyias rowleyi	abanico-celeste
Lamprolia klinesmithi	rabo-de-seda-de-natewa
Lamprolia victoriae	rabo-de-seda-de-taveuni

Monarchidae Monarcas e Gralhinas

Esta família é composta por uma grande variedade de pequenas aves de cores vistosas e comportamento semelhante aos papa-moscas (família Muscicapidae), capturando insectos em voo a partir de poisos na vegetação. Porém, a sua cauda mais longa e o bico maior com um tom azulado denunciam a pertença a uma família própria. A maioria dos monarcas são aves de carácter florestal. Muitas espécies são endémicas de ilhas e, por essa razão, aliada à pressão sobre os seus habitats, quase 40% delas têm um estatuto de conservação desfavorável.

Espécies: 105

Distribuição: África subsariana, Madagáscar, Ásia meridional e oriental, Australásia e ilhas do Pacífico (incluindo Havai)

Hypothymis azurea	monarca-azul
Hypothymis puella	monarca-de-celebes
Hypothymis helenae	monarca-de-helena
Hypothymis coelestis	monarca-celestial
Trochocercus cyanomelas	monarca-do-cabo
Trochocercus nitens	monarca-brilhante
Terpsiphone bedfordi	monarca-de-bedford
Terpsiphone rufocinerea	monarca-congolês
Terpsiphone rufiventer	monarca-de-barriga-vermelha
Terpsiphone batesi	monarca-de-bates
Terpsiphone viridis	monarca-africano
Terpsiphone paradisi	monarca-indiano
Terpsiphone affinis	monarca-oriental
Terpsiphone floris	monarca-das-pequenas-sundas
Terpsiphone incei	monarca-chinês
Terpsiphone atrocaudata	monarca-japonês
Terpsiphone cyanescens	monarca-de-palawan
Terpsiphone cinnamomea	monarca-canela
Terpsiphone atrochalybeia	monarca-de-são-tomé
Terpsiphone mutata	monarca-malgaxe
Terpsiphone corvina	monarca-das-seicheles
Terpsiphone bourbonnensis	monarca-das-mascarenhas
Chasiempis sclateri	monarca-de-kauai
Chasiempis ibidis	monarca-de-oahu
Chasiempis sandwichensis	monarca-do-havai
Pomarea dimidiata	monarca-de-rarotonga
Pomarea nigra	monarca-do-taiti
Pomarea maupitiensis	monarca-de-maupiti
Pomarea mendozae	monarca-das-marquesas

Pomarea mira	monarca-de-ua-pou
Pomarea nukuhivae	monarca-de-nuku-hiva
Pomarea iphis	monarca-de-ua-huka
Pomarea fluxa	monarca-de-eiao
Pomarea whitneyi	monarca-de-fatu-hiva
Mayrornis schistaceus	monarca-de-vanikoro
Mayrornis versicolor	monarca-versicolor
Mayrornis lessoni	monarca-de-lesson
Neolalage banksiana	monarca-das-banks
Clytorhynchus pachycephaloides	monarca-pardo
Clytorhynchus vitiensis	monarca-das-fiji
Clytorhynchus nigrogularis	monarca-de-garganta-preta
Clytorhynchus sanctaecrucis	monarca-de-santa-cruz
Clytorhynchus hamlini	monarca-de-rennell
Metabolus rugensis	monarca-de-truk
Symposiachrus axillaris	monarca-preto
Symposiachrus guttula	monarca-d'asa-malhada
Symposiachrus mundus	monarca-de-bibe-preto
Symposiachrus sacerdotum	monarca-das-flores
Symposiachrus boanensis	monarca-de-boano
Symposiachrus melanopterus	monarca-das-luisíadas
Symposiachrus trivirgatus	monarca-de-lunetas
Symposiachrus bimaculatus	monarca-bimaculado
Symposiachrus leucurus	monarca-das-kai
Symposiachrus everetti	monarca-de-jampea
Symposiachrus loricatus	monarca-de-buru
Symposiachrus julianae	monarca-de-kofiau
Symposiachrus brehmii	monarca-de-brehm
Symposiachrus manadensis	monarca-de-capuz
Symposiachrus infelix	monarca-triste
Symposiachrus menckei	monarca-de-são-matias
Symposiachrus verticalis	monarca-das-bismarck
Symposiachrus barbatus	monarca-das-salomão
Symposiachrus malaitae	monarca-de-malaita
Symposiachrus vidua	monarca-de-colar-branco
Symposiachrus nigrotectus	monarca-de-vella-lavella
Symposiachrus browni	monarca-de-brown
Symposiachrus rubiensis	monarca-ruivo
Monarcha cinerascens	monarca-insular
Monarcha melanopsis	monarca-de-faces-pretas
Monarcha frater	monarca-d'asa-preta
Monarcha castaneiventris	monarca-de-barriga-castanha
Monarcha richardsii	monarca-de-richards
Monarcha godeffroyi	monarca-de-yap
Monarcha takatsukasae	monarca-de-tinian

Carterornis leucotis	monarca-de-faces-brancas
Carterornis pileatus	monarca-de-nuca-branca
Carterornis castus	monarca-das-tanimbar
Carterornis chrysomela	monarca-dourado
Arses insularis	monarca-de-colar-ruivo
Arses telescopthalmus	monarca-franzido
Arses lorealis	monarca-do-cabo-york
Arses kaupi	monarca-alvinegro
Grallina cyanoleuca	gralhina-australiana
Grallina bruijnii	gralhina-da-papua
Myiagra oceanica	monarca-oceânico
Myiagra erythrops	monarca-de-palau
Myiagra freycineti	monarca-de-guam
Myiagra pluto	monarca-de-ponapé
Myiagra galeata	monarca-das-molucas
Myiagra atra	monarca-de-biak
Myiagra rubecula	monarca-plúmbeo
Myiagra ferrocyanea	monarca-azul-metálico
Myiagra cervinicauda	monarca-de-makira
Myiagra caledonica	monarca-melanésio
Myiagra vanikorensis	monarca-de-barriga-ruiva
Myiagra albiventris	monarca-de-samoa
Myiagra azureocapilla	monarca-de-crista-azul
Myiagra castaneigularis	monarca-de-garganta-castanha
Myiagra ruficollis	monarca-de-bico-largo
Myiagra cyanoleuca	monarca-acetinado
Myiagra alecto	monarca-reluzente
Myiagra hebetior	monarca-de-mussau
Myiagra eichhorni	monarca-de-veludo
Myiagra nana	monarca-pequeno
Myiagra inquieta	monarca-inquieto

Platylophidae — Gaio-de-crista

Esta família foi descrita pela primeira vez em 2021 e nasceu por cisão da família Corvidae. Compreende uma única espécie, o gaio-de-crista, cuja taxonomia era e continua a ser bastante controversa, pelo que é possível que haja alterações no futuro. Esta espécie frequenta florestas húmidas ou de montanha, encontrando-se um pouco ameaçada devido à destruição do seu habitat. Alimenta-se de grandes insectos e de outros invertebrados. Não tem receio dos humanos, podendo mesmo atacá-los quando se aproximam dos seus ninhos.

Espécies: 1

Distribuição: Sueste asiático

Platylophus galericulatus	gaio-de-crista

Laniidae Picanços

Com as suas patas fortes e o seu bico em forma de gancho, os picanços quase parecem aves de rapina em miniatura. Tal como estas, praticam caça à espera a partir de um ponto alto. A sua dieta inclui insectos grandes e, nalguns casos, aves e anfíbios. O nome genérico *Lanius*, atribuído à maioria das espécies, vem do latim e significa 'carniceiro' – uma referência à forma de alimentação destas aves, que consiste em empalar as presas em espinhos para depois as consumir.

Espécies: 34

Distribuição: Europa, África, Ásia e América do Norte

Eurocephalus ruppelli	picanço-de-rüppell
Eurocephalus anguitimens	picanço-de-coroa-branca
Corvinella corvina	picanço-de-bico-amarelo
Urolestes melanoleucus	picanço-bicolor
Lanius cabanisi	picanço-rabilongo
Lanius excubitoroides	picanço-de-dorso-cinzento
Lanius dorsalis	picanço-dos-taita
Lanius excubitor	picanço-nortenho
Lanius somalicus	picanço-somali
Lanius ludovicianus	picanço-americano
Lanius giganteus	picanço-gigante
Lanius sphenocercus	picanço-chinês
Lanius meridionalis	picanço-real
Lanius borealis	picanço-boreal
Lanius nubicus	picanço-núbio
Lanius newtoni	picanço-de-são-tomé
Lanius humeralis	picanço-de-dorso-preto
Lanius gubernator	picanço-de-emin
Lanius mackinnoni	picanço-de-mackinnon
Lanius souzae	picanço-de-souza
Lanius collaris	picanço-fiscal
Lanius minor	picanço-pequeno
Lanius senator	picanço-barreteiro
Lanius collurioides	picanço-birmanês
Lanius tigrinus	picanço-tigrino
Lanius vittatus	picanço-de-dorso-castanho
Lanius isabellinus	picanço-isabel
Lanius collurio	picanço-de-dorso-ruivo
Lanius phoenicuroides	picanço-de-cauda-vermelha
Lanius validirostris	picanço-filipino
Lanius cristatus	picanço-castanho

Lanius bucephalus	picanço-taurino
Lanius schach	picanço-schach
Lanius tephronotus	picanço-do-tibete

Corvidae Gaios, Pegas, Gralhas e Corvos

A família dos corvídeos é bastante vasta e congrega os passeriformes de maior dimensão, incluindo corvos, gralhas, gaios, pegas e quebra-nozes, entre outros. Muitas espécies têm uma alimentação omnívora e oportunista, que pode incluir invertebrados, crias de outras aves, frutas, bagas ou cadáveres de animais. Os corvídeos são animais muito inteligentes, havendo espécies que são capazes de usar ferramentas ou reconhecer a sua imagem ao espelho.

Espécies: 138

Distribuição: Cosmopolita excepto extremo meridional da América do Sul e Antárctida

Platysmurus leucopterus	pega-preta-malaia
Platysmurus aterrimus	pega-preta-do-bornéu
Perisoreus infaustus	gaio-siberiano
Perisoreus internigrans	gaio-do-sujuão
Perisoreus canadensis	gaio-canadiano
Cyanolyca armillata	gaio-de-colar-preto
Cyanolyca viridicyanus	gaio-de-colar-branco
Cyanolyca turcosa	gaio-turquesa
Cyanolyca pulchra	gaio-formoso
Cyanolyca cucullata	gaio-de-coroa-azul
Cyanolyca pumilo	gaio-de-garganta-preta
Cyanolyca nanus	gaio-anão
Cyanolyca mirabilis	gaio-de-garganta-branca
Cyanolyca argentigula	gaio-de-garganta-prateada
Cyanocorax colliei	pega-de-garganta-preta
Cyanocorax formosus	pega-de-garganta-branca
Cyanocorax morio	gaio-castanho
Cyanocorax coeruleus	gaio-celeste
Cyanocorax violaceus	gaio-violáceo
Cyanocorax cyanomelas	gaio-do-pantanal
Cyanocorax cristatellus	gaio-de-poupa-revirada
Cyanocorax yncas	gaio-verde
Cyanocorax mystacalis	gaio-de-cauda-branca
Cyanocorax melanocyaneus	gaio-hondurenho
Cyanocorax yucatanicus	gaio-do-iucatão
Cyanocorax beecheii	gaio-de-dorso-púrpura
Cyanocorax sanblasianus	gaio-de-san-blas
Cyanocorax dickeyi	gaio-de-penacho
Cyanocorax affinis	gaio-de-peito-preto
Cyanocorax heilprini	gaio-de-nuca-azul

Cyanocorax cayanus	gaio-de-caiena
Cyanocorax chrysops	gaio-de-veludo
Cyanocorax cyanopogon	gaio-de-nuca-branca
Cyanocitta cristata	gaio-azul
Cyanocitta stelleri	gaio-de-steller
Aphelocoma wollweberi	gaio-mexicano
Aphelocoma ultramarina	gaio-dos-vulcões
Aphelocoma unicolor	gaio-unicolor
Aphelocoma californica	gaio-da-califórnia
Aphelocoma woodhouseii	gaio-de-woodhouse
Aphelocoma insularis	gaio-de-santa-cruz
Aphelocoma coerulescens	gaio-floridense
Gymnorhinus cyanocephalus	gaio-dos-pinheiros
Garrulus glandarius	gaio-eurasiático
Garrulus lanceolatus	gaio-de-cabeça-preta
Garrulus lidthi	gaio-de-lidth
Cyanopica cyanus	pega-azul-asiática
Cyanopica cooki	pega-azul-ibérica
Urocissa ornata	pega-cingalesa
Urocissa caerulea	pega-da-formosa
Urocissa flavirostris	pega-de-bico-dourado
Urocissa erythroryncha	pega-de-bico-vermelho
Urocissa whiteheadi	pega-d'asa-branca
Cissa chinensis	pega-verde-asiática
Cissa hypoleuca	pega-verde-indochinesa
Cissa thalassina	pega-verde-javanesa
Cissa jefferyi	pega-verde-do-bornéu
Dendrocitta vagabunda	pega-vagabunda
Dendrocitta occipitalis	pega-de-samatra
Dendrocitta cinerascens	pega-do-bornéu
Dendrocitta formosae	pega-cinzenta
Dendrocitta leucogastra	pega-de-barriga-branca
Dendrocitta frontalis	pega-de-colar
Dendrocitta bayleii	pega-das-andamão
Crypsirina temia	pega-bronzeada
Crypsirina cucullata	pega-de-capuz
Temnurus temnurus	pega-cauda-de-raquete
Pica pica	pega-rabuda
Pica mauritanica	pega-magrebina
Pica asirensis	pega-árabe
Pica bottanensis	pega-dos-himalaias
Pica serica	pega-oriental
Pica hudsonia	pega-americana
Pica nuttallii	pega-de-bico-amarelo
Zavattariornis stresemanni	gaio-etíope

Podoces hendersoni	gaio-terrestre-mongol
Podoces biddulphi	gaio-terrestre-de-xinjiang
Podoces panderi	gaio-terrestre-do-turquestão
Podoces pleskei	gaio-terrestre-iraniano
Nucifraga columbiana	quebra-nozes-americano
Nucifraga caryocatactes	quebra-nozes-malhado
Nucifraga hemispila	quebra-nozes-meridional
Nucifraga multipunctata	quebra-nozes-dos-himalaias
Pyrrhocorax pyrrhocorax	gralha-de-bico-vermelho
Pyrrhocorax graculus	gralha-de-bico-amarelo
Ptilostomus afer	pega-africana
Coloeus monedula	gralha-de-nuca-cinzenta
Coloeus dauuricus	gralha-dáurica
Corvus splendens	gralha-indiana
Corvus moneduloides	gralha-da-nova-caledónia
Corvus unicolor	gralha-das-banggai
Corvus enca	gralha-de-bico-fino
Corvus celebensis	gralha-de-celebes
Corvus samarensis	gralha-de-samar
Corvus sierramadrensis	gralha-da-sierra-madre
Corvus pusillus	gralha-de-palawan
Corvus violaceus	gralha-violeta
Corvus typicus	gralha-flautista
Corvus florensis	gralha-das-flores
Corvus kubaryi	gralha-das-marianas
Corvus validus	gralha-de-bico-comprido
Corvus woodfordi	gralha-de-bico-branco
Corvus meeki	gralha-de-bougainville
Corvus fuscicapillus	gralha-de-cabeça-castanha
Corvus tristis	gralha-da-papua
Corvus capensis	gralha-do-cabo
Corvus frugilegus	gralha-calva
Corvus brachyrhynchos	gralha-americana
Corvus imparatus	gralha-de-tamaulipas
Corvus sinaloae	gralha-sinaloense
Corvus ossifragus	gralha-pesqueira
Corvus palmarum	gralha-das-palmeiras-dominicana
Corvus minutus	gralha-das-palmeiras-cubana
Corvus jamaicensis	gralha-jamaicana
Corvus nasicus	gralha-cubana
Corvus leucognaphalus	gralha-dominicana
Corvus hawaiiensis	gralha-havaiana
Corvus corone	gralha-preta
Corvus cornix	gralha-cinzenta
Corvus torquatus	gralha-de-colar

Corvus macrorhynchos	corvo-bicudo
Corvus levaillantii	corvo-de-levaillant
Corvus culminatus	corvo-indiano
Corvus philippinus	corvo-filipino
Corvus orru	gralha-de-torres
Corvus insularis	gralha-das-bismarck
Corvus bennetti	gralha-de-bennett
Corvus tasmanicus	corvo-da-tasmânia
Corvus mellori	corvo-pequeno
Corvus coronoides	corvo-australiano
Corvus albus	gralha-seminarista
Corvus ruficollis	corvo-do-deserto
Corvus edithae	corvo-somali
Corvus corax	corvo-comum
Corvus cryptoleucus	corvo-das-pradarias
Corvus rhipidurus	corvo-de-cauda-curta
Corvus albicollis	corvo-de-nuca-branca
Corvus crassirostris	corvo-de-bico-grosso

Corcoracidae — Corvinos

Os corvinos são duas espécies de passeriformes relativamente grandes, de aparências bastante diferentes, mas ambos fazendo lembrar membros da família dos corvídeos. Ocorrem sobretudo em bosques abertos de eucaliptal. Os seus ninhos são grandes taças de barro, onde nidificam cooperativamente, com os juvenis de anos anteriores a permanecerem no território dos pais para ajudar no cuidado às crias da época seguinte.

Espécies: 2

Distribuição: metade oriental da Austrália

Corcorax melanorhamphos	corvino-preto
Struthidea cinerea	corvino-apóstolo

Melampittidae Melampitas

Nesta família encontramos duas espécies enigmáticas e mal conhecidas: as melampitas. São aves pequenas, com a plumagem preta, patas fortes e asas curtas, que vivem no solo de florestas montanhosas da Papua e se alimentam de insectos. Tal como sucede com vários outros grupos da Australásia, as afinidades taxonómicas destas aves deram origem a diversas confusões no passado, mas depois de análises genéticas recentes foi decidido colocá-las numa família distinta.

Espécies: 2

Distribuição: Papua

Melampitta lugubris	melampita-pequena
Megalampitta gigantea	melampita-grande

Ifritidae **Ifrita**

A ifrita é um pequeno passeriforme arborícola e insectívoro, com uma plumagem essencialmente castanha, destacando-se a coroa azul e preta. Esta é uma das pouquíssimas espécies de aves venenosas, graças a uma toxina que tem nas penas, a batracotoxina, que as aves usam para se defenderem de predadores. É actualmente o único membro da sua família, embora no passado já tenha sido colocada noutras, como a dos monarcas ou a dos joalheiros.

Espécies: 1

Distribuição: Papua

Ifrita kowaldi	ifrita

Paradisaeidae — Aves-do-paraíso

Com a sua plumagem exuberante e os seus elaborados rituais de acasalamento, os machos das aves-do-paraíso constituem, sem dúvida, um dos expoentes máximos da beleza avifaunística. Estas aves, que se alimentam de frutas e artrópodes, vivem sobretudo em florestas tropicais densas, sendo na Papua que se encontra a maior diversidade de espécies. Os principais factores de ameaça que enfrentam são a destruição de habitat e a perseguição com vista à obtenção de plumas para fins ornamentais.

Espécies: 45

Distribuição: Papua, Nordeste da Austrália e mais algumas ilhas da região

Lycocorax pyrrhopterus	ave-do-paraíso-corvina
Lycocorax obiensis	ave-do-paraíso-de-obi
Manucodia ater	ave-do-paraíso-preta
Manucodia alter	ave-do-paraíso-de-tagula
Manucodia jobiensis	ave-do-paraíso-de-jobi
Manucodia chalybatus	ave-do-paraíso-metálica
Manucodia comrii	ave-do-paraíso-de-comrie
Phonygammus keraudrenii	ave-do-paraíso-trombeteira
Paradigalla carunculata	ave-do-paraíso-rabilonga
Paradigalla brevicauda	ave-do-paraíso-de-cauda-curta
Astrapia nigra	ave-do-paraíso-das-arfak
Astrapia splendidissima	ave-do-paraíso-esplêndida
Astrapia mayeri	ave-do-paraíso-de-fitas
Astrapia stephaniae	ave-do-paraíso-de-stephanie
Astrapia rothschildi	ave-do-paraíso-de-rothschild
Parotia sefilata	ave-do-paraíso-de-pennant
Parotia carolae	ave-do-paraíso-de-carola
Parotia berlepschi	ave-do-paraíso-de-berlepsch
Parotia lawesii	ave-do-paraíso-de-lawes
Parotia helenae	ave-do-paraíso-de-helena
Parotia wahnesi	ave-do-paraíso-de-whanes
Pteridophora alberti	ave-do-paraíso-de-alberto
Lophorina superba	ave-do-paraíso-de-doberai
Lophorina latipennis	ave-do-paraíso-soberba-grande
Lophorina minor	ave-do-paraíso-soberba-pequena
Ptiloris paradiseus	ave-do-paraíso-aperaltada
Ptiloris victoriae	ave-do-paraíso-de-vitória
Ptiloris magnificus	ave-do-paraíso-de-garganta-azul
Ptiloris intercedens	ave-do-paraíso-grunhidora
Epimachus fastosus	ave-do-paraíso-fastuosa

Epimachus meyeri	ave-do-paraíso-de-meyer
Drepanornis albertisi	ave-do-paraíso-de-albertis
Drepanornis bruijnii	ave-do-paraíso-de-bico-pálido
Diphyllodes magnificus	ave-do-paraíso-magnífica
Diphyllodes respublica	ave-do-paraíso-de-wilson
Cicinnurus regius	ave-do-paraíso-real
Semioptera wallacii	ave-do-paraíso-de-wallace
Seleucidis melanoleucus	ave-do-paraíso-filamentosa
Paradisaea apoda	ave-do-paraíso-grande
Paradisaea raggiana	ave-do-paraíso-de-raggi
Paradisaea minor	ave-do-paraíso-pequena
Paradisaea decora	ave-do-paraíso-de-goldie
Paradisaea rubra	ave-do-paraíso-vermelha
Paradisaea guilielmi	ave-do-paraíso-imperial
Paradisornis rudolphi	ave-do-paraíso-azul

Se virmos um pequeno passeriforme na região da Australásia, de cabeça grande e arredondada, fazendo lembrar um pisco, é provável que se trate de uma petróica. Estas são aves insectívoras, comuns em florestas e nas suas orlas, onde capturam as suas presas no solo, muitas vezes a partir de um poiso na vegetação. O seu dorso é escuro, mas muitas espécies têm tons brilhantes de amarelo, vermelho ou até rosa nas partes inferiores.

Espécies: 51

Distribuição: Australásia

Amalocichla incerta	petróica-terrestre-pequena
Amalocichla sclateriana	petróica-terrestre-grande
Pachycephalopsis hattamensis	petróica-de-dorso-verde
Pachycephalopsis poliosoma	petróica-d'olho-branco
Eugerygone rubra	petróica-granate
Petroica macrocephala	petróica-carvoeira
Petroica traversi	petróica-preta
Petroica longipes	petróica-da-ilha-norte
Petroica australis	petróica-da-ilha-sul
Petroica bivittata	petróica-montesa
Petroica archboldi	petróica-das-rochas
Petroica multicolor	petróica-de-norfolk
Petroica goodenovii	petróica-de-testa-vermelha
Petroica polymorpha	petróica-das-salomão
Petroica pusilla	petróica-do-pacífico
Petroica rosea	petróica-de-peito-rosado
Petroica rodinogaster	petróica-rosada
Petroica phoenicea	petróica-flamejante
Petroica boodang	petróica-escarlate
Devioeca papuana	petróica-da-papua
Kempiella flavovirescens	petróica-olivácea
Kempiella griseoceps	petróica-de-patas-amarelas
Cryptomicroeca flaviventris	petróica-de-barriga-amarela
Monachella muelleriana	petróica-das-torrentes
Microeca hemixantha	petróica-das-tanimbar
Microeca flavigaster	petróica-limão
Microeca fascinans	petróica-fascinante
Drymodes beccarii	petróica-mateira-da-papua
Drymodes superciliaris	petróica-mateira-do-norte
Drymodes brunneopygia	petróica-mateira-do-sul
Heteromyias albispecularis	petróica-cinzenta
Heteromyias armiti	petróica-de-barrete-preto
Heteromyias cinereifrons	petróica-de-cabeça-cinzenta
Plesiodryas albonotata	petróica-de-garganta-preta

Leucophantes brachyurus	petróica-de-queixo-preto
Poecilodryas hypoleuca	petróica-de-flancos-pretos
Poecilodryas superciliosa	petróica-de-sobrancelhas
Poecilodryas cerviniventris	petróica-de-barriga-canela
Melanodryas cucullata	petróica-de-capuz
Melanodryas vittata	petróica-da-tasmânia
Melanodryas sigillata	petróica-d'asa-branca
Melanodryas cryptoleuca	petróica-sombria
Melanodryas cyanus	petróica-ardósia
Melanodryas bimaculata	petróica-d'uropígio-branco
Melanodryas pulverulenta	petróica-dos-mangais
Eopsaltria placens	petróica-cintada
Eopsaltria australis	petróica-amarela
Eopsaltria griseogularis	petróica-de-peito-cinzento
Eopsaltria georgiana	petróica-de-peito-branco
Eopsaltria capito	petróica-amarelada
Eopsaltria leucops	petróica-de-faces-brancas

Picathartidae — Picatartes

Com um aspecto muito invulgar entre os passeriformes, essencialmente por terem a cabeça desprovida de penas, os picatartes são aves florestais que dependem de um tipo de habitat muito especializado: zonas rochosas húmidas no meio da selva, onde se alimentam de invertebrados. O nome genérico *Picathartes* significa "pega-abutre", pois é uma aglutinação de *Pica* (pega) e *Cathartes* (abutre). Ambas as espécies têm actualmente o estatuto de vulnerável.

Espécies: 2

Distribuição: África ocidental e central

Picathartes gymnocephalus	picatartes-de-pescoço-branco
Picathartes oreas	picatartes-de-pescoço-cinzento

Chaetopidae — Salta-rochas

Os salta-rochas são passeriformes do tamanho de tordos, com plumagem branca, preta e vermelha e uma cauda longa. Como o seu nome sugere, passam grande parte do seu tempo correndo ou saltando por entre as rochas, enquanto procuram os insectos de que se alimentam. No passado chegaram a ser classificados nos turdídeos ou nos timalídeos, mas hoje sabe-se que geneticamente são mais próximos dos picatartes, apesar de muito diferentes.

Espécies: 2

Distribuição: África austral

Chaetops frenatus	salta-rochas-do-cabo
Chaetops aurantius	salta-rochas-das-drakensberg

Eupetidae — Flautista-rabilongo

O flautista-rabilongo é um habitante enigmático de florestas tropicais bem preservadas no sudeste asiático. Esta ave elegante, de pernas compridas, cauda longa e cabeça pequena, pode ser avistada a caminhar pelo solo da floresta, à procura dos artrópodes de que se alimenta. Contudo, é através do seu som, um assobio semelhante ao das pitas, que é mais frequentemente detectado. É classificado como quase ameaçado, devido à baixa densidade das suas populações e à intensa pressão humana sobre o seu habitat.

Espécies: 1

Distribuição: península malaia, ilhas de Samatra, Bornéu e ilhas circundantes

Eupetes macrocerus	flautista-rabilongo

Bombycillidae Tagarelas

Os tagarelas são belas aves de plumagem sedosa, com uma poupa e pequenas marcas coloridas nas asas. Têm a particularidade de ser as únicas aves em zonas boreais e temperadas do hemisfério norte que se alimentam quase exclusivamente de frutos e bagas. Nidificam em florestas a latitudes elevadas, mas, quando o inverno é duro e o alimento é escasso, migram para sul, por vezes em grandes bandos.

Espécies: 3

Distribuição: Holárctico

Bombycilla garrulus	tagarela-boreal
Bombycilla japonica	tagarela-japonês
Bombycilla cedrorum	tagarela-americano

Ptiliogonatidae — Capulineiros

Os capulineiros são aves esguias e de plumagem sedosa, vários deles com poupas. Podem ser encontrados em florestas tropicais de altitude, mas o capulineiro-preto ocorre mais a norte em desertos, matagais e galerias ripícolas. A sua dieta é variada, mas inclui sempre uma importante componente de frutos e bagas e outra de invertebrados, principalmente na época de nidificação. O capulineiro-preto tem até um sistema digestivo especialmente adaptado para se alimentar de viscos.

Espécies: 4

Distribuição: América Central, México e sudoeste dos E.U.A.

Phainoptila melanoxantha	capulineiro-preto-e-amarelo
Ptiliogonys cinereus	capulineiro-cinzento
Ptiliogonys caudatus	capulineiro-rabilongo
Phainopepla nitens	capulineiro-preto

Hypocoliidae Hipocólio

Esta ave esguia, com plumagem cinzenta e máscara preta, é frugívora, alimentando-se de bagas da árvore da mostarda, tâmaras e outras frutas. Habita zonas relativamente áridas, sendo uma das espécies características do Médio Oriente: nidifica no Afeganistão, no Irão e no Iraque e inverna na Península Arábica e no Paquistão. Por ocorrer sobretudo em países politicamente instáveis, tem sido difícil aos investigadores estrangeiros descobrir mais sobre esta curiosa espécie.

Espécies: 1

Distribuição: Sudoeste da Ásia

Hypocolius ampelinus	hipocólio

Dulidae — Cígua-das-palmeiras

A cígua-das-palmeiras, único membro desta família, é uma ave frugívora bastante comum nas terras baixas da Ilha Espanhola, de onde é endémica. Convive bem com os humanos, e pode ser encontrada onde quer que ocorram as palmeiras nas quais constrói os seus ninhos comunitários. Os ninhos são grandes estruturas feitas de ramos, dentro das quais podem habitar até 50 casais reprodutores.

Espécies: 1

Distribuição: Ilha Espanhola (República Dominicana e Haiti)

Dulus dominicus	cígua-das-palmeiras

As cinco espécies que integravam esta família extinguiram-se nos séculos XIX e XX, fazendo desta a única família de aves que desapareceu totalmente na época moderna (segundo a taxonomia actual). Os seus nomes comuns são onomatopeicos. Alimentavam-se de néctar, mas de resto sabe-se muito pouco, pois muitas delas extinguiram-se antes de poderem ser estudadas em detalhe. Na ausência de fotos destas aves, apresentamos uma ilustração.

Espécies: 5 (todas extintas)

Distribuição: Havai (E.U.A.)

Chaetoptila angustipluma	kioea
Moho braccatus	oo-de-kauai
Moho apicalis	oo-de-oahu
Moho bishopi	oo-de-molokai
Moho nobilis	oo-do-havai

Hylocitreidae — Sibilante-de-bone

Esta pequena ave florestal, endémica da ilha de Celebes, faz lembrar um sibilante da família Pachycephalidae e durante muito tempo foi considerada parte dessa família, embora as suas vocalizações sejam muito menos melodiosas. Estudos genéticos recentes vieram mostrar que merece a classificação numa família própria, sendo mais próximo dos tagarelas e do hipocólio do que dos restantes sibilantes.

Espécies: 1

Distribuição: ilha de Celebes (Indonésia)

Hylocitrea bonensis	sibilante-de-bone

Stenostiridae — Azulinhos e afins

Esta família reúne um pequeno conjunto de aves insectívoras, com bico curto e cauda longa e que vivem sobretudo em ambientes florestais. São espécies de vários géneros e bastante diferentes entre si, que no passado se encontravam dispersas por várias famílias, em particular de papa-moscas, o que justifica que alguns deles ainda mantenham essa designação. Porém, sabe-se agora que, em termos taxonómicos, se encontram mais próximas dos chapins.

Espécies: 9

Distribuição: África subsariana e Ásia meridional

Chelidorhynx hypoxanthus	papa-moscas-de-barriga-amarela
Stenostira scita	papa-moscas-duende
Culicicapa ceylonensis	papa-moscas-de-cabeça-cinzenta
Culicicapa helianthea	papa-moscas-citrino
Elminia longicauda	azulinho-rabilongo
Elminia albicauda	azulinho-de-poupa
Elminia nigromitrata	azulinho-escuro
Elminia albiventris	azulinho-de-barriga-branca
Elminia albonotata	azulinho-de-cauda-branca

Os chapins são aves de pequena dimensão e aspecto compacto, com um bico curto mas forte. Apresentam uma grande diversidade de plumagens e algumas espécies ostentam uma poupa. De hábitos florestais, têm uma dieta variada, que inclui insectos e sementes. Muitas espécies frequentam zonas urbanizadas e visitam regularmente os comedouros. Os chapins nidificam em cavidades e também apreciam caixas-ninho, o que permite que estas aves sejam bem estudadas.

Espécies: 62

Distribuição: Eurásia, África e América do Norte

Cephalopyrus flammiceps	chapim-flamejante
Sylviparus modestus	chapim-modesto
Melanochlora sultanea	chapim-sultão
Periparus rufonuchalis	chapim-de-nuca-ruiva
Periparus rubidiventris	chapim-de-crisso-ruivo
Periparus ater	chapim-carvoeiro
Periparus venustulus	chapim-de-barriga-amarela
Periparus elegans	chapim-filipino
Periparus amabilis	chapim-de-palawan
Lophophanes cristatus	chapim-de-poupa
Lophophanes dichrous	chapim-de-crista-cinzenta
Baeolophus wollweberi	chapim-freado
Baeolophus inornatus	chapim-unicolor
Baeolophus ridgwayi	chapim-dos-zimbros
Baeolophus bicolor	chapim-bicolor
Baeolophus atricristatus	chapim-de-crista-preta
Sittiparus varius	chapim-variado
Sittiparus owstoni	chapim-das-izu
Sittiparus olivaceus	chapim-de-iriomote
Sittiparus castaneoventris	chapim-de-barriga-castanha
Sittiparus semilarvatus	chapim-de-testa-branca
Poecile superciliosus	chapim-de-sobrancelha-branca
Poecile lugubris	chapim-lúgubre
Poecile cinctus	chapim-da-lapónia
Poecile rufescens	chapim-de-dorso-castanho
Poecile hudsonicus	chapim-boreal
Poecile sclateri	chapim-mexicano
Poecile carolinensis	chapim-da-carolina
Poecile atricapillus	chapim-de-barrete-preto
Poecile gambeli	chapim-serrano
Poecile davidi	chapim-de-david

Poecile hypermelaenus	chapim-de-babete-preto
Poecile palustris	chapim-palustre
Poecile weigoldicus	chapim-do-sujuão
Poecile hyrcanus	chapim-do-cáspio
Poecile montanus	chapim-montês
Cyanistes teneriffae	chapim-magrebino
Cyanistes caeruleus	chapim-azul
Cyanistes cyanus	chapim-de-cabeça-branca
Pseudopodoces humilis	chapim-terrestre
Parus major	chapim-real
Parus cinereus	chapim-oriental
Parus monticolus	chapim-de-dorso-verde
Machlolophus nuchalis	chapim-de-nuca-branca
Machlolophus holsti	chapim-da-formosa
Machlolophus xanthogenys	chapim-dos-himalaias
Machlolophus aplonotus	chapim-indiano
Machlolophus spilonotus	chapim-de-faces-amarelas
Melaniparus guineensis	chapim-guineense
Melaniparus leucomelas	chapim-d'asa-branca
Melaniparus niger	chapim-preto
Melaniparus carpi	chapim-de-carp
Melaniparus albiventris	chapim-de-barriga-branca
Melaniparus leuconotus	chapim-de-dorso-branco
Melaniparus funereus	chapim-sombrio
Melaniparus rufiventris	chapim-de-barriga-ruiva
Melaniparus fringillinus	chapim-de-garganta-ruiva
Melaniparus fasciiventer	chapim-das-ruwenzori
Melaniparus thruppi	chapim-somali
Melaniparus griseiventris	chapim-do-miombo
Melaniparus cinerascens	chapim-cinzento
Melaniparus afer	chapim-do-cabo

Remizidae — Chapim-de-mascarilha, Chapins-do-algodão e afins

Embora não sendo verdadeiros chapins, estas minúsculas aves insectívoras são-lhes taxonomicamente bastante próximas, assemelhando-se também no comportamento, por exemplo quando se alimentam de barriga para cima. Algumas espécies da família constroem ninhos concebidos para iludir os predadores, na medida em que a abertura que parece a entrada conduz a uma câmara vazia, ao passo que a entrada verdadeira está bem disfarçada.

Espécies: 11

Distribuição: Eurásia, África e América do Norte

Remiz pendulinus	chapim-de-mascarilha
Remiz macronyx	chapim-de-cabeça-preta
Remiz coronatus	chapim-de-coroa-branca
Remiz consobrinus	chapim-chinês
Anthoscopus punctifrons	chapim-do-algodão-sudanês
Anthoscopus parvulus	chapim-do-algodão-amarelo
Anthoscopus musculus	chapim-do-algodão-etíope
Anthoscopus flavifrons	chapim-do-algodão-de-testa-amarela
Anthoscopus caroli	chapim-do-algodão-cinzento
Anthoscopus minutus	chapim-do-algodão-do-cabo
Auriparus flaviceps	chapim-de-face-dourada

Nicatoridae Conquistadores

Superficialmente semelhantes aos picanços e aos bulbuls, de cujas famílias já fizeram parte no passado, os conquistadores têm hoje a sua própria família. São aves florestais, de plumagem esverdeada, que se alimentam de pequenos animais. Podem ser muito esquivos e difíceis de observar quando não vocalizam. O nome genérico *Nicator* deriva do grego *nikator* que significa conquistador, tendo este termo sido escolhido para designar as espécies deste grupo.

Espécies: 3

Distribuição: África subsariana

Nicator chloris	conquistador-ocidental
Nicator gularis	conquistador-de-garganta-branca
Nicator vireo	conquistador-de-garganta-amarela

Panuridae Chapim-de-bigodes

O chapim-de-bigodes (assim chamado por ter sido originalmente colocado por Lineu no género *Parus*) não é um verdadeiro chapim. Na verdade, embora já tenha sido colocado noutras famílias, sabe-se hoje que não tem qualquer parente próximo. Este passeriforme encontra-se intimamente associado a zonas húmidas, nidificando em grandes caniçais junto a lagos ou pauis. Alimenta-se de insectos no Verão e de sementes de caniços no Inverno.

Espécies: 1

Distribuição: Eurásia

Panurus biarmicus	chapim-de-bigodes

Alaudidae Cotovias, Calhandras e afins

As cem espécies que integram esta grande família têm em comum a preferência por locais com poucas ou nenhumas árvores e a plumagem dominada por tons castanhos, que lhes confere uma boa camuflagem no tipo de habitat que frequentam. A maioria tem cantos muito elaborados, emitidos geralmente em voo durante longos períodos. Esta família tem uma distribuição geográfica vasta, mas é em África e nas estepes asiáticas que se encontra a maior diversidade de espécies.

Espécies: 99

Distribuição: América do Norte, Eurásia, África e Austrália

Alaemon alaudipes	cotovia-de-bico-curvo
Alaemon hamertoni	cotovia-de-hamerton
Chersomanes beesleyi	cotovia-de-beesley
Chersomanes albofasciata	cotovia-esporada
Ammomanopsis grayi	cotovia-da-namíbia
Certhilauda chuana	cotovia-d'unha-curta
Certhilauda subcoronata	cotovia-namaqua
Certhilauda semitorquata	cotovia-do-transvaal
Certhilauda curvirostris	cotovia-de-bico-comprido
Pinarocorys nigricans	cotovia-sombria
Pinarocorys erythropygia	cotovia-d'uropígio-ruivo
Ramphocoris clotbey	calhandra-de-bico-grosso
Ammomanes deserti	calhandrinha-do-deserto
Ammomanes cinctura	calhandrinha-das-dunas
Ammomanes phoenicura	calhandrinha-rabirruiva
Eremopterix australis	pastor-preto
Eremopterix hova	pastor-malgaxe
Eremopterix nigriceps	pastor-de-coroa-preta
Eremopterix leucotis	pastor-de-dorso-castanho
Eremopterix griseus	pastor-de-coroa-cinzenta
Eremopterix signatus	pastor-de-cabeça-castanha
Eremopterix verticalis	pastor-de-dorso-cinzento
Eremopterix leucopareia	pastor-de-faces-brancas
Calendulauda rufa	cotovia-ruiva
Calendulauda sabota	cotovia-sabota
Calendulauda poecilosterna	cotovia-de-peito-rosado
Calendulauda gilletti	cotovia-de-gillett
Calendulauda africanoides	cotovia-fulva
Calendulauda albescens	cotovia-do-karoo
Calendulauda burra	cotovia-vermelha
Calendulauda erythrochlamys	cotovia-das-dunas

Heteromirafra archeri	cotovia-de-archer
Heteromirafra ruddi	cotovia-de-rudd
Mirafra passerina	cotovia-monótona
Mirafra pulpa	cotovia-de-friedmann
Mirafra cordofanica	cotovia-do-cordofão
Mirafra williamsi	cotovia-de-williams
Mirafra javanica	cotovia-cantora
Mirafra cheniana	cotovia-melodiosa
Mirafra albicauda	cotovia-de-cauda-branca
Plocealauda microptera	cotovia-birmanesa
Plocealauda erythrocephala	cotovia-indochinesa
Plocealauda affinis	cotovia-do-decão
Plocealauda erythroptera	cotovia-indiana
Plocealauda assamica	cotovia-bengalense
Amirafra collaris	cotovia-de-colar
Amirafra angolensis	cotovia-angolana
Amirafra rufocinnamomea	cotovia-das-castanholas
Corypha apiata	cotovia-batedora
Corypha fasciolata	cotovia-do-calaári
Corypha kidepoensis	cotovia-de-kidepo
Corypha hypermetra	cotovia-d'asa-vermelha
Corypha kurrae	cotovia-do-darfur
Corypha africana	cotovia-de-nuca-vermelha
Corypha athi	cotovia-sentinela
Corypha kabalii	cotovia-das-planícies
Corypha nigrescens	cotovia-dos-planaltos
Corypha sharpii	cotovia-de-sharpe
Corypha somalica	cotovia-somali
Lullula arborea	cotovia-arbórea
Spizocorys obbiensis	cotovia-de-obbia
Spizocorys sclateri	cotovia-de-sclater
Spizocorys starki	cotovia-de-stark
Spizocorys fremantlii	cotovia-de-cauda-curta
Spizocorys personata	cotovia-mascarada
Spizocorys fringillaris	cotovia-de-botha
Spizocorys conirostris	cotovia-de-bico-rosado
Alauda leucoptera	cotovia-d'asa-branca
Alauda razae	laverca-do-raso
Alauda gulgula	laverca-oriental
Alauda arvensis	laverca-eurasiática
Galerida deva	cotovia-deva
Galerida modesta	cotovia-modesta
Galerida magnirostris	cotovia-de-bico-grosso
Galerida theklae	cotovia-montesina
Galerida cristata	cotovia-de-poupa

Galerida malabarica	cotovia-malabar
Eremophila alpestris	calhandra-cornuda
Eremophila bilopha	calhandra-de-temminck
Calandrella acutirostris	calhandrinha-de-hume
Calandrella dukhunensis	calhandrinha-oriental
Calandrella blanfordi	calhandrinha-de-blanford
Calandrella eremica	calhandrinha-de-barrete-ruivo
Calandrella cinerea	calhandrinha-de-barrete-vermelho
Calandrella brachydactyla	calhandrinha-comum
Melanocorypha bimaculata	calhandra-bimaculada
Melanocorypha calandra	calhandra-real
Melanocorypha yeltoniensis	calhandra-preta
Melanocorypha mongolica	calhandra-mongol
Melanocorypha maxima	calhandra-do-tibete
Chersophilus duponti	calhandra-de-dupont
Eremalauda dunni	calhandra-de-dunn
Eremalauda eremodites	calhandra-árabe
Alaudala cheleensis	calhandrinha-asiática
Alaudala somalica	calhandrinha-somali
Alaudala rufescens	calhandrinha-das-marismas
Alaudala heinei	calhandrinha-do-turquestão
Alaudala raytal	calhandrinha-da-areia

O nome bulbul é originário do persa e significa 'rouxinol'. As espécies que integram esta família são passeriformes de tamanho médio, com uma cauda longa e uma plumagem muitas vezes uniforme, embora algumas apresentem padrões mais contrastados. Frequentam locais arborizados, desde florestas até savanas ou mesmo jardins. A dieta é variada, mas muitas espécies apresentam uma grande preferência por frutas.

Espécies: 162

Distribuição: África, metade sul da Ásia e algumas ilhas do oceano Índico

Andropadus importunus	bulbul-sombrio
Stelgidillas gracilirostris	bulbul-de-bico-fino
Calyptocichla serinus	bulbul-dourado
Neolestes torquatus	bulbul-de-colar
Bleda syndactylus	bulbul-de-cauda-vermelha
Bleda eximius	bulbul-de-cauda-verde
Bleda canicapillus	bulbul-formigueiro
Bleda notatus	bulbul-de-loros-amarelos
Bleda ugandae	bulbul-ugandês
Atimastillas flavicollis	bulbul-de-garganta-amarela
Atimastillas flavigula	bulbul-de-garganta-pálida
Ixonotus guttatus	bulbul-malhado
Thescelocichla leucopleura	bulbul-dos-pântanos
Chlorocichla laetissima	bulbul-alegre
Chlorocichla prigoginei	bulbul-de-prigogine
Chlorocichla falkensteini	bulbul-de-falkenstein
Chlorocichla flaviventris	bulbul-de-barriga-amarela
Chlorocichla simplex	bulbul-modesto
Baeopogon indicator	bulbul-indicador
Baeopogon clamans	bulbul-de-sjöstedt
Arizelocichla montana	bulbul-camaronês
Arizelocichla tephrolaema	bulbul-de-garganta-cinzenta
Arizelocichla masukuensis	bulbul-das-misuku
Arizelocichla neumanni	bulbul-das-uluguru
Arizelocichla fusciceps	bulbul-de-cabeça-escura
Arizelocichla chlorigula	bulbul-de-garganta-verde
Arizelocichla kikuyuensis	bulbul-de-peito-oliváceo
Arizelocichla nigriceps	bulbul-do-kilimanjaro
Arizelocichla striifacies	bulbul-de-faces-estriadas
Arizelocichla milanjensis	bulbul-de-milange
Criniger barbatus	bulbul-barbudo

Criniger chloronotus	bulbul-de-dorso-verde
Criniger calurus	bulbul-rabirruivo
Criniger ndussumensis	bulbul-de-barba-branca
Criniger olivaceus	bulbul-de-barba-amarela
Eurillas virens	bulbul-verde
Eurillas latirostris	bulbul-de-bigodes-amarelos
Eurillas curvirostris	bulbul-liso
Eurillas gracilis	bulbul-anão
Eurillas ansorgei	bulbul-de-ansorge
Phyllastrephus debilis	bulbul-minúsculo
Phyllastrephus albigula	bulbul-das-usambara
Phyllastrephus albigularis	bulbul-de-garganta-branca
Phyllastrephus viridiceps	bulbul-do-cuanza
Phyllastrephus xavieri	bulbul-de-xavier
Phyllastrephus icterinus	bulbul-icterino
Phyllastrephus terrestris	bulbul-terrestre
Phyllastrephus poensis	bulbul-de-fernando-pó
Phyllastrephus strepitans	bulbul-pardo
Phyllastrephus cerviniventris	bulbul-oliváceo
Phyllastrephus fischeri	bulbul-de-fischer
Phyllastrephus cabanisi	bulbul-de-cabanis
Phyllastrephus scandens	bulbul-de-cauda-ruiva
Phyllastrephus lorenzi	bulbul-de-lorenz
Phyllastrephus flavostriatus	bulbul-de-estrias-amarelas
Phyllastrephus alfredi	bulbul-de-alfred
Phyllastrephus poliocephalus	bulbul-de-barriga-dourada
Phyllastrephus hypochloris	bulbul-de-toro
Phyllastrephus baumanni	bulbul-de-baumann
Phyllastrephus fulviventris	bulbul-angolano
Tricholestes criniger	bulbul-peludo
Setornis criniger	bulbul-picanço
Alophoixus phaeocephalus	bulbul-de-barrete-cinzento
Alophoixus frater	bulbul-de-palawan
Alophoixus tephrogenys	bulbul-de-faces-cinzentas
Alophoixus ruficrissus	bulbul-penan
Alophoixus bres	bulbul-de-faces-castanhas
Alophoixus flaveolus	bulbul-amarelo
Alophoixus ochraceus	bulbul-ocráceo
Alophoixus pallidus	bulbul-pálido
Alcurus striatus	bulbul-estriado
Iole finschii	bulbul-de-finsch
Iole palawanensis	bulbul-sulfúreo
Iole viridescens	bulbul-esverdeado
Iole crypta	bulbul-críptico
Iole charlottae	bulbul-de-charlotte

Iole cacharensis	bulbul-de-cachar
Iole propinqua	bulbul-d'olho-cinzento
Hemixos flavala	bulbul-d'asa-amarela
Hemixos cinereus	bulbul-cinzento
Hemixos castanonotus	bulbul-castanho
Acritillas indica	bulbul-de-sobrancelha-amarela
Ixos leucogrammicus	bulbul-raiado
Ixos sumatranus	bulbul-de-samatra
Ixos virescens	bulbul-javanês
Ixos malaccensis	bulbul-malaio
Ixos mcclellandii	bulbul-montês
Hypsipetes nicobariensis	bulbul-de-nicobar
Hypsipetes philippinus	bulbul-filipino
Hypsipetes mindorensis	bulbul-de-mindoro
Hypsipetes siquijorensis	bulbul-de-siquijor
Hypsipetes affinis	bulbul-de-cauda-dourada
Hypsipetes platenae	bulbul-de-sangihe
Hypsipetes aureus	bulbul-das-togian
Hypsipetes harterti	bulbul-de-banggai
Hypsipetes longirostris	bulbul-das-sula
Hypsipetes chloris	bulbul-das-molucas
Hypsipetes lucasi	bulbul-de-obi
Hypsipetes mysticalis	bulbul-de-buru
Hypsipetes guimarasensis	bulbul-das-vissaias
Hypsipetes everetti	bulbul-de-everett
Hypsipetes catarmanensis	bulbul-de-camiguin
Hypsipetes rufigularis	bulbul-de-zamboanga
Hypsipetes amaurotis	bulbul-d'orelha-castanha
Hypsipetes borbonicus	bulbul-da-reunião
Hypsipetes madagascariensis	bulbul-malgaxe
Hypsipetes olivaceus	bulbul-das-maurícias
Hypsipetes thompsoni	bulbul-de-cabeça-branca
Hypsipetes leucocephalus	bulbul-preto
Hypsipetes ganeesa	bulbul-dos-gates
Hypsipetes parvirostris	bulbul-das-comores
Hypsipetes moheliensis	bulbul-de-mohéli
Hypsipetes crassirostris	bulbul-das-seicheles
Euptilotus eutilotus	bulbul-lanudo
Microtarsus melanoleucos	bulbul-alvinegro
Microtarsus urostictus	bulbul-d'olho-amarelo
Microtarsus priocephalus	bulbul-de-cabeça-cinzenta
Microtarsus melanocephalos	bulbul-de-cabeça-preta
Microtarsus fuscoflavescens	bulbul-das-andamão
Microtarsus nieuwenhuisii	bulbul-d'olho-azul
Ixodia erythropthalmos	bulbul-de-lunetas

Ixodia cyaniventris	bulbul-de-barriga-cinzenta
Ixodia squamata	bulbul-escamado
Rubigula flaviventris	bulbul-de-crista-preta
Rubigula gularis	bulbul-de-garganta-laranja
Rubigula melanictera	bulbul-cingalês
Rubigula dispar	bulbul-de-garganta-rubi
Rubigula montis	bulbul-do-bornéu
Nok hualon	bulbul-de-faces-nuas
Spizixos canifrons	bulbul-de-bico-grosso
Spizixos semitorques	bulbul-de-meio-colar
Pycnonotus simplex	bulbul-d'olho-branco
Pycnonotus plumosus	bulbul-d'asa-verde
Pycnonotus brunneus	bulbul-d'olho-vermelho
Pycnonotus zeylanicus	bulbul-de-coroa-dourada
Pycnonotus tympanistrigus	bulbul-de-peito-malhado
Pycnonotus pseudosimplex	bulbul-d'olho-creme
Pycnonotus cinereifrons	bulbul-de-testa-cinzenta
Pycnonotus luteolus	bulbul-de-sobrancelha-branca
Pycnonotus blanfordi	bulbul-de-blanford
Pycnonotus conradi	bulbul-de-conrad
Pycnonotus davisoni	bulbul-d'olho-pálido
Pycnonotus finlaysoni	bulbul-de-garganta-estriada
Pycnonotus flavescens	bulbul-flavescente
Pycnonotus snouckaerti	bulbul-de-achém
Pycnonotus bimaculatus	bulbul-bimaculado
Pycnonotus leucops	bulbul-de-faces-pálidas
Pycnonotus xantholaemus	bulbul-de-cabeça-amarela
Pycnonotus penicillatus	bulbul-orelhudo
Pycnonotus xanthorrhous	bulbul-de-peito-castanho
Pycnonotus sinensis	bulbul-chinês
Pycnonotus taivanus	bulbul-da-formosa
Pycnonotus jocosus	bulbul-de-faces-vermelhas
Pycnonotus goiavier	bulbul-mascarado
Pycnonotus cafer	bulbul-cafre
Pycnonotus aurigaster	bulbul-de-crisso-amarelo
Pycnonotus leucotis	bulbul-d'orelha-branca
Pycnonotus leucogenys	bulbul-de-faces-brancas
Pycnonotus xanthopygos	bulbul-árabe
Pycnonotus nigricans	bulbul-de-capuz
Pycnonotus barbatus	bulbul-comum
Pycnonotus capensis	bulbul-do-cabo

As andorinhas são, sem dúvida, dos passeriformes mais bem adaptados a alimentarem-se em voo. O corpo esguio, as asas longas e o bico curto mas com uma grande abertura permitem-lhes uma grande agilidade no ar, enquanto procuram os insectos de que se alimentam. Algumas espécies nidificam isoladamente, enquanto outras são coloniais. Fora da época dos ninhos, as andorinhas podem formar grandes dormitórios, por exemplo em construções ou locais com vegetação densa.

Espécies: 92

Distribuição: Cosmopolita

Pseudochelidon eurystomina	andorinha-dos-rios-africana
Pseudochelidon sirintarae	andorinha-dos-rios-asiática
Psalidoprocne nitens	andorinha-de-cauda-quadrada
Psalidoprocne albiceps	andorinha-de-cabeça-branca
Psalidoprocne fuliginosa	andorinha-camaronesa
Psalidoprocne pristoptera	andorinha-preta
Psalidoprocne obscura	andorinha-fante
Pseudhirundo griseopyga	andorinha-d'uropígio-cinzento
Cheramoeca leucosterna	andorinha-de-dorso-branco
Phedina borbonica	andorinha-das-mascarenhas
Neophedina cincta	andorinha-de-colar
Phedinopsis brazzae	andorinha-de-brazza
Riparia paludicola	andorinha-dos-charcos
Riparia cowani	andorinha-malgaxe
Riparia chinensis	andorinha-de-garganta-cinzenta
Riparia congica	andorinha-congolesa
Riparia riparia	andorinha-das-barreiras
Riparia diluta	andorinha-pálida
Tachycineta bicolor	andorinha-das-árvores
Tachycineta leucorrhoa	andorinha-d'uropígio-branco
Tachycineta leucopyga	andorinha-chilena
Tachycineta stolzmanni	andorinha-de-tumbes
Tachycineta albilinea	andorinha-dos-mangais
Tachycineta albiventer	andorinha-d'asa-branca
Tachycineta euchrysea	andorinha-dourada
Tachycineta cyaneoviridis	andorinha-baamense
Tachycineta thalassina	andorinha-verde-violeta
Progne tapera	andorinha-de-peito-castanho
Progne murphyi	andorinha-peruana
Progne modesta	andorinha-das-galápagos
Progne subis	andorinha-púrpura

Progne elegans	andorinha-meridional
Progne chalybea	andorinha-de-peito-cinzento
Progne sinaloae	andorinha-sinaloense
Progne cryptoleuca	andorinha-cubana
Progne dominicensis	andorinha-dominicana
Stelgidopteryx serripennis	andorinha-serrada-nortenha
Stelgidopteryx ruficollis	andorinha-serrada-meridional
Atticora fasciata	andorinha-de-faixa-branca
Atticora pileata	andorinha-de-cabeça-preta
Atticora tibialis	andorinha-de-coxas-brancas
Pygochelidon cyanoleuca	andorinha-azul-e-branca
Pygochelidon melanoleuca	andorinha-de-coleira
Alopochelidon fucata	andorinha-de-cabeça-castanha
Orochelidon flavipes	andorinha-de-patas-claras
Orochelidon murina	andorinha-de-barriga-parda
Orochelidon andecola	andorinha-andina
Ptyonoprogne rupestris	andorinha-das-rochas
Ptyonoprogne obsoleta	andorinha-do-deserto
Ptyonoprogne rufigula	andorinha-das-rochas-de-garganta-ruiva
Ptyonoprogne fuligula	andorinha-isabel
Ptyonoprogne concolor	andorinha-sombria
Hirundo atrocaerulea	andorinha-azul
Hirundo nigrorufa	andorinha-vermelha-e-preta
Hirundo dimidiata	andorinha-de-peito-pérola
Hirundo domicola	andorinha-das-colinas
Hirundo javanica	andorinha-do-pacífico
Hirundo tahitica	andorinha-taitiana
Hirundo leucosoma	andorinha-d'asa-malhada
Hirundo megaensis	andorinha-de-cauda-branca
Hirundo neoxena	andorinha-australiana
Hirundo rustica	andorinha-das-chaminés
Hirundo lucida	andorinha-guineense
Hirundo aethiopica	andorinha-etíope
Hirundo angolensis	andorinha-angolana
Hirundo nigrita	andorinha-de-babete
Hirundo albigularis	andorinha-de-garganta-branca
Hirundo smithii	andorinha-cauda-d'arame
Atronanus fuliginosus	andorinha-das-florestas
Delichon urbicum	andorinha-dos-beirais
Delichon lagopodum	andorinha-siberiana
Delichon dasypus	andorinha-asiática
Delichon nipalense	andorinha-nepalesa
Cecropis cucullata	andorinha-estriada-grande
Cecropis rufula	andorinha-ruiva
Cecropis daurica	andorinha-dáurica

Cecropis melanocrissus	andorinha-de-rüppell
Cecropis hyperythra	andorinha-cingalesa
Cecropis badia	andorinha-de-barriga-ruiva
Cecropis abyssinica	andorinha-estriada-pequena
Cecropis semirufa	andorinha-de-peito-ruivo
Cecropis senegalensis	andorinha-senegalesa
Petrochelidon rufigula	andorinha-de-garganta-ruiva
Petrochelidon preussi	andorinha-de-preuss
Petrochelidon perdita	andorinha-do-mar-vermelho
Petrochelidon spilodera	andorinha-sul-africana
Petrochelidon fluvicola	andorinha-fluvial
Petrochelidon ariel	andorinha-fada
Petrochelidon nigricans	andorinha-arborícola
Petrochelidon pyrrhonota	andorinha-d'uropígio-canela
Petrochelidon fulva	andorinha-das-cavernas
Petrochelidon rufocollaris	andorinha-de-pescoço-ruivo

Pnoepygidae Ratinhos

Antes consideradas parte da família Timaliidae, estas cinco espécies de aves pequeninas, castanhas, de asas arredondadas e de cauda quase inexistente, foram reconhecidas apenas recentemente como uma família própria. Outras espécies de aspecto semelhante, que mantiveram o nome de ratinho, permanecem na família Timaliidae ou foram atribuídas às novas famílias Pellorneidae e Elachuridae. Tal como pequenos mamíferos, movimentam-se de forma inconspícua pelo solo de florestas densas, em busca de artrópodes no musgo ou na manta morta.

Espécies: 5

Distribuição: Himalaias e sudeste asiático

Pnoepyga albiventer	ratinho-escamoso
Pnoepyga mutica	ratinho-chinês
Pnoepyga formosana	ratinho-da-formosa
Pnoepyga immaculata	ratinho-nepalês
Pnoepyga pusilla	ratinho-pigmeu

De criação relativamente recente, esta família reúne um conjunto de espécies que, na sua maioria, faziam anteriormente parte da família Sylviidae. São aves de dimensão variável e que frequentam diversos tipos de habitats. A sua alimentação é composta sobretudo por insectos. Dentro desta família, o grupo mais numeroso é o das minúsculas rabicurtas *Sylvietta* spp., que constroem um ninho suspenso em forma de bolso ou pera.

Espécies: 18

Distribuição: África subsariana

Melocichla mentalis	felosa-de-bigodes
Sphenoeacus afer	felosa-do-cabo
Achaetops pycnopygius	salta-pedras
Macrosphenus flavicans	bico-longo-amarelo
Macrosphenus kempi	bico-longo-de-kemp
Macrosphenus concolor	bico-longo-cinzento
Macrosphenus pulitzeri	bico-longo-angolano
Macrosphenus kretschmeri	bico-longo-de-kretschmer
Sylvietta brachyura	rabicurta-nortenha
Sylvietta whytii	rabicurta-de-faces-vermelhas
Sylvietta philippae	rabicurta-somali
Sylvietta rufescens	rabicurta-de-bico-comprido
Sylvietta isabellina	rabicurta-isabel
Sylvietta ruficapilla	rabicurta-de-barrete-vermelho
Sylvietta virens	rabicurta-verde
Sylvietta denti	rabicurta-limão
Sylvietta leucophrys	rabicurta-de-sobrancelha-branca
Cryptillas victorini	felosa-de-victorin

Cettiidae Rouxinol-bravo, Cétias e afins

Esta é uma família essencialmente asiática, embora esteja representada na Europa e no Norte de África (pelo bem conhecido rouxinol-bravo) e na Oceânia. A maioria das espécies tem hábitos furtivos, vive no meio de vegetação densa, procura alimento junto ao solo e, em caso de perturbação, afasta-se caminhando, como um ratinho. No passado estas aves integravam a grande família Sylviidae, a qual foi entretanto retalhada, num processo que deu origem a várias famílias novas, incluindo esta.

Espécies: 31

Distribuição: Sul da Europa, Norte de África, Ásia e Oceânia

Abroscopus superciliaris	felosa-do-bambu
Abroscopus albogularis	felosa-de-faces-ruivas
Abroscopus schisticeps	felosa-de-faces-pretas
Phyllergates cucullatus	costureiro-montês
Phyllergates heterolaemus	costureiro-de-capuz
Tickellia hodgsoni	felosa-de-bico-largo
Horornis seebohmi	cétia-filipina
Horornis diphone	cétia-japonesa
Horornis canturians	cétia-coreana
Horornis annae	cétia-de-palau
Horornis carolinae	cétia-das-tanimbar
Horornis parens	cétia-de-makira
Horornis haddeni	cétia-de-bougainville
Horornis ruficapilla	cétia-das-fiji
Horornis fortipes	cétia-montesa
Horornis brunnescens	cétia-dos-himalaias
Horornis acanthizoides	cétia-de-barriga-amarela
Horornis flavolivaceus	cétia-aberrante
Tesia cyaniventer	tésia-de-barriga-cinzenta
Tesia olivea	tésia-ardósia
Tesia everetti	tésia-de-cabeça-ruiva
Tesia superciliaris	tésia-javanesa
Cettia cetti	rouxinol-bravo
Cettia major	cétia-grande
Cettia brunnifrons	cétia-de-barrete
Cettia castaneocoronata	cétia-de-cabeça-castanha
Urosphena squameiceps	cétia-asiática
Urosphena whiteheadi	cétia-do-bornéu
Urosphena subulata	cétia-timorense
Hemitesia pallidipes	cétia-de-patas-claras
Hemitesia neumanni	cétia-de-neumann

Scotocercidae — Prínia-do-deserto

Esta família mono-específica tem como único membro a prínia-do-deserto. Trata-se de uma pequena ave aparentada às fuinhas e ao rouxinol-bravo, tendo já sido integrada nas respectivas famílias por algumas autoridades. Como o seu nome indica, habita zonas áridas ou desérticas, frequentando locais com mato e ravinas. Parece preferir locais com vegetação natural, evitando áreas cultivadas.

Espécies: 1

Distribuição: Norte de África e Sudoeste Asiático

Scotocerca inquieta	prínia-do-deserto

Erythrocercidae — Monarca-amarelo e afins

A situação taxonómica destas aves é algo confusa. Anteriormente estavam na família Monarchidae e só em 2012 foi proposta a criação da família Erythrocercidae. Todavia, algumas autoridades incluem as três espécies aqui apresentadas nas famílias Scotocercidae ou Cettiidae. São aves muito pequenas, com um aspecto intermédio entre uma felosa e um papa-moscas. Essencialmente florestais, frequentam diferentes tipos de bosques e alimentam-se de invertebrados.

Espécies: 3

Distribuição: África subsariana

Erythrocercus holochlorus	monarca-amarelo
Erythrocercus mccallii	monarca-de-barrete-vermelho
Erythrocercus livingstonei	monarca-de-livingstone

Hyliidae — Hílias

Trata-se de uma pequena família que contém apenas duas espécies: as hílias. São aves insectívoras, de muito pequena dimensão, que frequentam as florestas tropicais africanas, aparecendo também noutro tipo de locais florestados. A taxonomia destas aves não é consensual e algumas autoridades classificam-nas noutras famílias.

Espécies: 2

Distribuição: África tropical

Hylia prasina	hília-verde
Pholidornis rushiae	hília-estriada

Aegithalidae Chapim-rabilongo e afins

Irrequietos, os chapins-rabilongos movimentam-se habitualmente em pequenos grupos, em busca de alimento. São aves com um corpo muito pequeno e uma cauda muito longa e, apesar do nome comum 'chapim', não são aparentados aos parídeos. A distribuição mundial da família é vasta, mas é na Ásia que se encontra a maior diversidade de espécies. As espécies que vivem em regiões frias tendem a aconchegar-se durante a noite em pequenos grupos, para preservar energia.

Espécies: 12

Distribuição: Eurásia e Américas do Norte e Central

Aegithalos caudatus	chapim-rabilongo
Aegithalos glaucogularis	chapim-de-garganta-cinzenta
Aegithalos leucogenys	chapim-de-faces-brancas
Aegithalos concinnus	chapim-de-garganta-preta
Aegithalos niveogularis	chapim-de-garganta-branca
Aegithalos iouschistos	chapim-de-testa-ruiva
Aegithalos bonvaloti	chapim-de-sobrancelha-preta
Aegithalos fuliginosus	chapim-fuliginoso
Aegithalos exilis	chapim-pigmeu
Leptopoecile sophiae	chapim-de-sofia
Leptopoecile elegans	chapim-elegante
Psaltriparus minimus	chapim-americano

Phylloscopidae — Felosas

As felosas desta família são pequenas aves de cores subtis, muitas vezes de difícil identificação, que se movimentam freneticamente pela vegetação à procura de insectos. Frequentam habitats diversos e várias delas são migradoras de longa distância, reproduzindo-se em florestas boreais e invernando nos trópicos. O seu ninho localiza-se no solo ou nas camadas mais baixas da vegetação, mesmo nas espécies que preferem a copa das árvores para se alimentar.

Espécies: 81

Distribuição: Europa, África, Ásia, arquipélago indo-malaio (incluindo Papua) e Alasca

Phylloscopus sibilatrix	felosa-assobiadeira
Phylloscopus bonelli	felosa-de-bonelli
Phylloscopus orientalis	felosa-dos-balcãs
Phylloscopus pulcher	felosa-elegante
Phylloscopus maculipennis	felosa-fuliginosa
Phylloscopus humei	felosa-de-hume
Phylloscopus inornatus	felosa-bilistada
Phylloscopus subviridis	felosa-de-brooks
Phylloscopus yunnanensis	felosa-do-iunão
Phylloscopus chloronotus	felosa-de-dorso-claro
Phylloscopus forresti	felosa-do-sujuão
Phylloscopus kansuensis	felosa-de-gansu
Phylloscopus proregulus	felosa-de-pallas
Phylloscopus tytleri	felosa-de-bico-fino
Phylloscopus armandii	felosa-de-david
Phylloscopus schwarzi	felosa-de-radde
Phylloscopus griseolus	felosa-de-barriga-amarela
Phylloscopus affinis	felosa-de-tickell
Phylloscopus fuligiventer	felosa-fumada
Phylloscopus fuscatus	felosa-sombria
Phylloscopus neglectus	felosa-persa
Phylloscopus subaffinis	felosa-chinesa
Phylloscopus trochilus	felosa-musical
Phylloscopus sindianus	felosa-montesa
Phylloscopus canariensis	felosa-das-canárias
Phylloscopus collybita	felosa-comum
Phylloscopus ibericus	felosa-ibérica
Phylloscopus coronatus	felosa-coroada
Phylloscopus ijimae	felosa-de-ijima
Phylloscopus olivaceus	felosa-filipina

Phylloscopus cebuensis	felosa-de-lução
Phylloscopus ruficapilla	felosa-de-coroa-ruiva
Phylloscopus umbrovirens	felosa-castanha
Phylloscopus laetus	felosa-tútsi
Phylloscopus laurae	felosa-de-laura
Phylloscopus herberti	felosa-de-barrete-preto
Phylloscopus budongoensis	felosa-ugandesa
Phylloscopus intermedius	felosa-de-lunetas
Phylloscopus poliogenys	felosa-de-faces-cinzentas
Phylloscopus burkii	felosa-de-barrete-verde
Phylloscopus tephrocephalus	felosa-de-barrete-cinzento
Phylloscopus whistleri	felosa-de-whistler
Phylloscopus valentini	felosa-de-bianchi
Phylloscopus soror	felosa-de-alström
Phylloscopus omeiensis	felosa-de-martens
Phylloscopus nitidus	felosa-do-cáucaso
Phylloscopus plumbeitarsus	felosa-de-patas-cinzentas
Phylloscopus trochiloides	felosa-esverdeada
Phylloscopus emeiensis	felosa-do-emei
Phylloscopus magnirostris	felosa-bicuda
Phylloscopus borealoides	felosa-de-sacalina
Phylloscopus tenellipes	felosa-de-patas-claras
Phylloscopus xanthodryas	felosa-japonesa
Phylloscopus examinandus	felosa-de-kamchatka
Phylloscopus borealis	felosa-boreal
Phylloscopus castaniceps	felosa-de-coroa-castanha
Phylloscopus grammiceps	felosa-javanesa
Phylloscopus montis	felosa-de-peito-amarelo
Phylloscopus calciatilis	felosa-cársica
Phylloscopus ricketti	felosa-sulfúrea
Phylloscopus cantator	felosa-cantadeira
Phylloscopus occipitalis	felosa-occipital
Phylloscopus reguloides	felosa-de-blyth
Phylloscopus claudiae	felosa-de-claudia
Phylloscopus goodsoni	felosa-de-hartert
Phylloscopus ogilviegranti	felosa-de-ogilvie-grant
Phylloscopus hainanus	felosa-de-ainão
Phylloscopus intensior	felosa-de-davison
Phylloscopus xanthoschistos	felosa-de-capuz
Phylloscopus trivirgatus	felosa-trilistada
Phylloscopus nigrorum	felosa-de-negros
Phylloscopus floresianus	felosa-das-flores
Phylloscopus presbytes	felosa-timorense
Phylloscopus rotiensis	felosa-de-rote
Phylloscopus makirensis	felosa-de-makira

Phylloscopus nesophilus	felosa-de-celebes
Phylloscopus sarasinorum	felosa-do-lompobattang
Phylloscopus amoenus	felosa-de-kolombangara
Phylloscopus poliocephalus	felosa-insular
Phylloscopus maforensis	felosa-de-numfor
Phylloscopus misoriensis	felosa-de-biak

Acrocephalidae Rouxinóis-dos-caniços e afins

Encontramos aqui um vasto conjunto de aves acastanhadas, muitas delas sem marcas particulares e bastante semelhantes entre si, o que pode fazer da sua identificação um desafio. Habitam locais com vegetação densa, como caniçais ou matagais, e alimentam-se sobretudo de insectos. No passado integravam a família Sylviidae, que reunia a generalidade das 'felosas', mas estudos recentes permitiram concluir que estas espécies constituem um grupo distinto.

Espécies: 61

Distribuição: Eurásia, África, Austrália e diversas ilhas oceânicas

Graueria vittata	felosa-barrada
Nesillas typica	felosa-malgaxe
Nesillas lantzii	felosa-de-lantz
Nesillas longicaudata	felosa-de-anjouan
Nesillas brevicaudata	felosa-das-comores
Nesillas mariae	felosa-de-mohéli
Nesillas aldabrana	felosa-de-aldabra
Acrocephalus griseldis	felosa-iraquiana
Acrocephalus brevipennis	felosa-de-cabo-verde
Acrocephalus rufescens	felosa-grande-dos-pântanos
Acrocephalus gracilirostris	felosa-pequena-dos-pântanos
Acrocephalus newtoni	felosa-dos-pântanos-malgaxe
Acrocephalus sechellensis	felosa-das-seicheles
Acrocephalus rodericanus	felosa-de-rodrigues
Acrocephalus arundinaceus	rouxinol-grande-dos-caniços
Acrocephalus orientalis	felosa-oriental
Acrocephalus stentoreus	felosa-ruidosa
Acrocephalus australis	felosa-australiana
Acrocephalus familiaris	felosa-familiar
Acrocephalus luscinius	felosa-de-guam
Acrocephalus hiwae	felosa-de-saipan
Acrocephalus nijoi	felosa-de-aguijan
Acrocephalus yamashinae	felosa-de-pagán
Acrocephalus astrolabii	felosa-de-mangareva
Acrocephalus rehsei	felosa-de-nauru
Acrocephalus syrinx	felosa-das-carolinas
Acrocephalus aequinoctialis	felosa-de-kiritimati
Acrocephalus percernis	felosa-de-nuku-hiva
Acrocephalus caffer	felosa-do-taiti
Acrocephalus longirostris	felosa-de-moorea

Acrocephalus musae	felosa-de-forster
Acrocephalus mendanae	felosa-das-marquesas
Acrocephalus atyphus	felosa-de-tuamotu
Acrocephalus kerearako	felosa-das-cook
Acrocephalus rimitarae	felosa-de-rimatara
Acrocephalus taiti	felosa-de-henderson
Acrocephalus vaughani	felosa-de-pitcairn
Acrocephalus bistrigiceps	felosa-de-sobrancelha-preta
Acrocephalus melanopogon	felosa-real
Acrocephalus paludicola	felosa-aquática
Acrocephalus schoenobaenus	felosa-dos-juncos
Acrocephalus sorghophilus	felosa-estriada
Acrocephalus concinens	felosa-de-swinhoe
Acrocephalus tangorum	felosa-da-manchúria
Acrocephalus orinus	felosa-dos-pamir
Acrocephalus agricola	felosa-agrícola
Acrocephalus dumetorum	felosa-das-moitas
Acrocephalus scirpaceus	rouxinol-pequeno-dos-caniços
Acrocephalus palustris	felosa-palustre
Arundinax aedon	felosa-de-bico-grosso
Iduna natalensis	felosa-de-natal
Iduna similis	felosa-amarela
Iduna caligata	felosa-calçada
Iduna rama	felosa-das-estepes
Iduna pallida	felosa-isabel
Iduna opaca	felosa-pálida
Calamonastides gracilirostris	felosa-dos-papiros
Hippolais languida	felosa-de-upcher
Hippolais olivetorum	felosa-das-oliveiras
Hippolais polyglotta	felosa-poliglota
Hippolais icterina	felosa-icterina

Locustellidae Cigarrinhas, Erveiras e afins

Esta família, à semelhança dos Acrocephalidae, contém um conjunto de espécies antes consideradas parte da vasta família Sylviidae. São aves com cores acastanhadas e uma cauda longa e arredondada. O seu ninho é uma taça feita de ervas, construída ao nível do solo ou perto dele. Ocorrem em locais com vegetação densa rente ao solo, sejam estes florestas, pradarias ou caniçais. São difíceis de ver mas fáceis de ouvir, graças às suas características vocalizações, que por vezes lembram o som de insectos.

Espécies: 67

Distribuição: Europa, África, Ásia e Australásia

Robsonius rabori	felosa-terrestre-de-lução
Robsonius thompsoni	felosa-terrestre-da-sierra-madre
Robsonius sorsogonensis	felosa-terrestre-de-sorsogon
Helopsaltes fasciolatus	cigarrinha-de-gray
Helopsaltes amnicola	cigarrinha-de-sacalina
Helopsaltes pryeri	cigarrinha-japonesa
Helopsaltes certhiola	cigarrinha-de-pallas
Helopsaltes ochotensis	cigarrinha-de-middendorff
Helopsaltes pleskei	cigarrinha-de-pleske
Locustella lanceolata	cigarrinha-lanceolada
Locustella alfredi	cigarrinha-dos-bambus
Locustella fluviatilis	cigarrinha-fluvial
Locustella luscinioides	cigarrinha-ruiva
Locustella major	cigarrinha-de-bico-comprido
Locustella luteoventris	cigarrinha-de-barriga-ruiva
Locustella naevia	cigarrinha-malhada
Locustella tacsanowskia	cigarrinha-chinesa
Locustella accentor	cigarrinha-amigável
Locustella caudata	cigarrinha-rabilonga
Locustella castanea	cigarrinha-de-celebes
Locustella musculus	cigarrinha-de-ceram
Locustella portenta	cigarrinha-de-taliabu
Locustella disturbans	cigarrinha-de-buru
Locustella davidi	cigarrinha-de-david
Locustella kashmirensis	cigarrinha-de-caxemira
Locustella thoracica	cigarrinha-de-peito-malhado
Locustella alishanensis	cigarrinha-da-formosa
Locustella mandelli	cigarrinha-de-mandelli
Locustella idonea	cigarrinha-de-dalat
Locustella montis	cigarrinha-javanesa

Locustella chengi	cigarrinha-do-sujuão
Locustella seebohmi	cigarrinha-de-lução
Poodytes albolimbatus	erveira-do-fly
Poodytes carteri	erveira-do-spinifex
Poodytes rufescens	erveira-das-chatham
Poodytes punctatus	erveira-maori
Poodytes gramineus	erveira-pequena
Malia grata	malia
Cincloramphus cruralis	erveira-castanha
Cincloramphus rubiginosus	erveira-ferrugínea
Cincloramphus grosvenori	erveira-da-nova-bretanha
Cincloramphus bivittatus	erveira-timorense
Cincloramphus mathewsi	erveira-ruiva
Cincloramphus macrurus	erveira-da-papua
Cincloramphus timoriensis	erveira-fulva
Cincloramphus turipavae	erveira-de-guadalcanal
Cincloramphus whitneyi	erveira-de-espírito-santo
Cincloramphus mariae	erveira-da-nova-caledónia
Cincloramphus rufus	erveira-das-fiji
Cincloramphus llaneae	erveira-de-bougainville
Megalurus palustris	erveira-palustre
Elaphrornis palliseri	cigarrinha-cingalesa
Schoenicola platyurus	erveira-de-cauda-larga
Schoenicola striatus	erveira-estriada
Catriscus brevirostris	erveira-cauda-de-leque
Bradypterus sylvaticus	felosa-de-knysna
Bradypterus bangwaensis	felosa-de-bangwa
Bradypterus barratti	felosa-de-barratt
Bradypterus lopezi	felosa-de-lopes
Bradypterus cinnamomeus	felosa-canela
Bradypterus seebohmi	felosa-cinzenta
Bradypterus brunneus	felosa-rabilonga
Bradypterus grandis	felosa-grande
Bradypterus baboecala	felosa-tagarela
Bradypterus carpalis	felosa-d'asa-branca
Bradypterus graueri	felosa-de-grauer
Bradypterus centralis	felosa-de-neumann

Donacobiidae — Donacóbio

O único membro desta família, o donacóbio, é uma ave que confundiu durante muito tempo os taxonomistas. Relativamente grande e fazendo lembrar um mimo ou debulhador em estrutura, é na verdade um parente mais próximo das felosas malgaxes e das cigarrinhas do Velho Mundo, como a riqueza do seu repertório vocal parece também sugerir. É uma espécie insectívora, que ocupa principalmente zonas palustres e prados húmidos nos trópicos e subtrópicos da América do Sul, onde nidifica em pequenos grupos familiares.

Espécies: 1

Distribuição: América do Sul

Donacobius atricapilla	donacóbio

A família Bernieridae é de criação muito recente, existindo apenas desde 2010. Reúne um conjunto de 11 espécies, que são bastante diferentes entre si e se encontram repartidas por oito géneros. São todas endémicas de Madagáscar e algumas são mal conhecidas. A maioria habita em florestas húmidas, embora algumas frequentem zonas mais áridas. Tal como sucede com outras espécies malgaxes, a destruição das florestas constitui um importante factor de ameaça.

Espécies: 11

Distribuição: Madagáscar

Oxylabes madagascariensis	felosa-de-garganta-branca
Bernieria madagascariensis	tetraca-de-bico-comprido
Cryptosylvicola randrianasoloi	felosa-críptica
Hartertula flavoviridis	tetraca-cauda-de-cunha
Thamnornis chloropetoides	felosa-kiritika
Xanthomixis zosterops	tetraca-de-lunetas
Xanthomixis apperti	tetraca-de-appert
Xanthomixis cinereiceps	tetraca-de-coroa-cinzenta
Crossleyia xanthophrys	tetraca-de-sobrolho-amarelo
Crossleyia tenebrosa	tetraca-escuro
Randia pseudozosterops	randia-malgaxe

Cisticolidae Fuinhas, Prínias, Costureiros e afins

Estas são aves muito características do continente africano, embora a família esteja representada noutros continentes. Bastante pequenas, têm geralmente uma cauda longa e tons castanhos ou esverdeados, havendo várias espécies muito semelhantes entre si. Alimentam-se de insectos e frequentam zonas abertas ou florestadas, mas ricas em vegetação herbácea densa, onde nidificam. Este grupo resulta de uma cisão da família Sylviidae, que no passado reunia toda a espécie de 'felosas'.

Espécies: 166

Distribuição: África, Sul da Eurásia, Madagáscar e Austrália

Neomixis tenella	jeri-comum
Neomixis viridis	jeri-verde
Neomixis striatigula	jeri-de-garganta-estriada
Cisticola erythrops	fuinha-de-faces-ruivas
Cisticola cantans	fuinha-cantora
Cisticola lateralis	fuinha-assobiadeira
Cisticola woosnami	fuinha-de-woosnam
Cisticola anonymus	fuinha-tagarela
Cisticola bulliens	fuinha-sussurrante
Cisticola hunteri	fuinha-de-hunter
Cisticola chubbi	fuinha-de-chubb
Cisticola bakerorum	fuinha-de-kilombero
Cisticola nigriloris	fuinha-mascarada
Cisticola aberrans	fuinha-preguiçosa
Cisticola bailunduensis	fuinha-do-huambo
Cisticola chiniana	fuinha-chocalheira
Cisticola bodessa	fuinha-boran
Cisticola njombe	fuinha-de-njombe
Cisticola cinereolus	fuinha-cinzenta
Cisticola restrictus	fuinha-do-tana
Cisticola rufilatus	fuinha-rabirruiva
Cisticola subruficapilla	fuinha-de-dorso-cinzento
Cisticola lais	fuinha-chorona
Cisticola distinctus	fuinha-de-lynes
Cisticola galactotes	fuinha-d'asa-ruiva
Cisticola marginatus	fuinha-do-nilo
Cisticola haematocephalus	fuinha-costeira
Cisticola anderseni	fuinha-de-cauda-branca
Cisticola lugubris	fuinha-etíope
Cisticola luapula	fuinha-de-luapula
Cisticola pipiens	fuinha-chilreante

Cisticola carruthersi	fuinha-de-carruthers
Cisticola tinniens	fuinha-tilintante
Cisticola robustus	fuinha-robusta
Cisticola aberdare	fuinha-dos-aberdare
Cisticola natalensis	fuinha-de-natal
Cisticola ruficeps	fuinha-de-cabeça-ruiva
Cisticola guinea	fuinha-de-dorst
Cisticola nana	fuinha-anã
Cisticola brachypterus	fuinha-d'asa-curta
Cisticola rufus	fuinha-ruiva
Cisticola troglodytes	fuinha-raposina
Cisticola fulvicapilla	fuinha-de-coroa-ruiva
Cisticola angusticauda	fuinha-rabilonga
Cisticola melanurus	fuinha-de-cauda-preta
Cisticola juncidis	fuinha-dos-juncos
Cisticola haesitatus	fuinha-de-socotra
Cisticola cherina	fuinha-malgaxe
Cisticola aridulus	fuinha-do-deserto
Cisticola textrix	fuinha-das-nuvens
Cisticola eximius	fuinha-de-dorso-preto
Cisticola dambo	fuinha-dos-dambos
Cisticola brunnescens	fuinha-peitoral
Cisticola cinnamomeus	fuinha-de-coroa-pálida
Cisticola ayresii	fuinha-de-ayres
Cisticola exilis	fuinha-de-cabeça-dourada
Incana incana	prínia-de-socotra
Prinia crinigera	prínia-dos-himalaias
Prinia striata	prínia-estriada
Prinia polychroa	prínia-castanha
Prinia cooki	prínia-birmanesa
Prinia rocki	prínia-de-aname
Prinia atrogularis	prínia-de-garganta-preta
Prinia khasiana	prínia-de-coroa-ruiva
Prinia superciliaris	prínia-montesa
Prinia cinereocapilla	prínia-de-barrete-cinzento
Prinia buchanani	prínia-de-testa-ruiva
Prinia rufescens	prínia-de-dorso-ruivo
Prinia hodgsonii	prínia-de-peito-cinzento
Prinia gracilis	prínia-elegante
Prinia lepida	prínia-delicada
Prinia sylvatica	prínia-da-selva
Prinia familiaris	prínia-d'asa-listada
Prinia flaviventris	prínia-de-barriga-amarela
Prinia socialis	prínia-cinzenta
Prinia subflava	prínia-de-flancos-castanhos

Prinia inornata	prínia-simples
Prinia somalica	prínia-somali
Prinia fluviatilis	prínia-aquática
Prinia flavicans	prínia-de-peito-preto
Prinia maculosa	prínia-malhada
Prinia hypoxantha	prínia-das-drakensberg
Prinia molleri	prínia-de-são-tomé
Prinia bairdii	prínia-barrada
Prinia erythroptera	prínia-d'asa-ruiva
Prinia rufifrons	prínia-de-testa-vermelha
Schistolais leucopogon	prínia-de-garganta-branca
Schistolais leontica	prínia-da-serra-leoa
Phragmacia substriata	prínia-namaqua
Oreophilais robertsi	prínia-de-roberts
Micromacronus leytensis	timali-de-leyte
Micromacronus sordidus	timali-de-mindanau
Urolais epichlorus	prínia-verde
Oreolais pulcher	apális-de-pescoço-preto
Oreolais ruwenzorii	apális-das-ruwenzori
Drymocichla incana	prínia-d'asa-castanha
Spiloptila clamans	prínia-de-testa-malhada
Phyllolais pulchella	prínia-das-acácias
Apalis thoracica	apális-de-colar
Apalis flavigularis	apális-de-garganta-amarela
Apalis fuscigularis	apális-dos-taita
Apalis lynesi	apális-do-namuli
Apalis ruddi	apális-de-rudd
Apalis flavocincta	apális-de-cauda-castanha
Apalis flavida	apális-de-peito-amarelo
Apalis binotata	apális-de-suíças
Apalis personata	apális-de-faces-pretas
Apalis jacksoni	apális-de-garganta-preta
Apalis chariessa	apális-d'asa-branca
Apalis nigriceps	apális-de-barrete-preto
Apalis melanocephala	apális-de-cabeça-preta
Apalis chirindensis	apális-de-chirinda
Apalis porphyrolaema	apális-de-garganta-castanha
Apalis kaboboensis	apális-do-kabobo
Apalis chapini	apális-de-chapin
Apalis sharpii	apális-de-sharpe
Apalis rufogularis	apális-de-garganta-fulva
Apalis argentea	apális-de-moreau
Apalis karamojae	apális-de-karamoja
Apalis stronachi	apális-massai
Apalis bamendae	apális-de-bamenda

Apalis goslingi	apális-congolês
Apalis cinerea	apális-cinzento
Apalis alticola	apális-de-cabeça-castanha
Malcorus pectoralis	prínia-de-faces-ruivas
Hypergerus atriceps	prínia-papa-figos
Eminia lepida	emínia
Camaroptera brachyura	camaróptera-de-dorso-verde
Camaroptera brevicaudata	camaróptera-de-dorso-cinzento
Camaroptera harterti	camaróptera-angolana
Camaroptera superciliaris	camaróptera-de-sobrancelha-amarela
Camaroptera chloronota	camaróptera-de-dorso-oliváceo
Calamonastes simplex	camaróptera-somali
Calamonastes undosus	camaróptera-do-miombo
Calamonastes stierlingi	camaróptera-de-stierling
Calamonastes fasciolatus	camaróptera-barrada
Euryptila subcinnamomea	camaróptera-canela
Bathmocercus cerviniventris	prínia-de-cabeça-preta
Bathmocercus rufus	prínia-ruiva
Scepomycter winifredae	prínia-de-winifred
Orthotomus sutorius	costureiro-rabilongo
Orthotomus atrogularis	costureiro-de-pescoço-preto
Orthotomus chaktomuk	costureiro-cambojano
Orthotomus castaneiceps	costureiro-filipino
Orthotomus chloronotus	costureiro-de-dorso-verde
Orthotomus frontalis	costureiro-de-testa-ruiva
Orthotomus derbianus	costureiro-de-dorso-cinzento
Orthotomus sericeus	costureiro-rabirruivo
Orthotomus ruficeps	costureiro-cinzento
Orthotomus sepium	costureiro-javanês
Orthotomus cinereiceps	costureiro-d'orelhas-brancas
Orthotomus nigriceps	costureiro-de-cabeça-preta
Orthotomus samarensis	costureiro-de-peito-amarelo
Artisornis moreaui	costureiro-de-moreau
Artisornis metopias	costureiro-africano
Poliolais lopezi	camaróptera-de-cauda-branca
Eremomela icteropygialis	eremomela-de-barriga-amarela
Eremomela flavicrissalis	eremomela-somali
Eremomela pusilla	eremomela-senegalesa
Eremomela canescens	eremomela-de-dorso-verde
Eremomela scotops	eremomela-de-barrete-verde
Eremomela gregalis	eremomela-do-karoo
Eremomela usticollis	eremomela-de-garganta-ruiva
Eremomela badiceps	eremomela-de-coroa-ruiva
Eremomela turneri	eremomela-de-turner
Eremomela atricollis	eremomela-de-pescoço-preto

Sylviidae — Toutinegras e afins

Esta família era em tempos muito mais vasta que agora, incluindo uma porção substancial dos passeriformes do Velho Mundo. Estudos genéticos levaram a uma clarificação das relações filogenéticas entre essas espécies e ao erguer de várias novas famílias. As espécies que permanecem nos Sylviidae são pequenas aves de cauda relativamente longa e tons de castanho, branco e preto, que ocorrem em vegetação arbustiva densa, seja em bosques ou matos. A sua dieta consiste maioritariamente de insectos.

Espécies: 32

Distribuição: Europa (particularmente bacia mediterrânica), África, Médio Oriente e Ásia Central

Sylvia atricapilla	toutinegra-de-barrete
Sylvia borin	toutinegra-das-figueiras
Sylvia dohrni	toutinegra-do-príncipe
Sylvia galinieri	miador-abissínio
Sylvia nigricapillus	toutinegra-sul-africana
Sylvia abyssinica	toutinegra-abissínia
Sylvia atriceps	toutinegra-das-ruwenzori
Curruca nisoria	toutinegra-gavião
Curruca layardi	toutinegra-de-layard
Curruca boehmi	toutinegra-de-böhm
Curruca subcoerulea	toutinegra-azulada
Curruca curruca	papa-amoras-cinzento
Curruca lugens	toutinegra-castanha
Curruca buryi	toutinegra-iemenita
Curruca leucomelaena	toutinegra-árabe
Curruca hortensis	toutinegra-real
Curruca crassirostris	toutinegra-oriental
Curruca deserti	toutinegra-do-deserto
Curruca nana	toutinegra-anã
Curruca deserticola	toutinegra-do-atlas
Curruca mystacea	toutinegra-rosada
Curruca ruppeli	toutinegra-de-rüppell
Curruca melanothorax	toutinegra-cipriota
Curruca melanocephala	toutinegra-de-cabeça-preta
Curruca iberiae	toutinegra-de-bigodes
Curruca subalpina	toutinegra-subalpina
Curruca cantillans	toutinegra-dos-balcãs
Curruca communis	papa-amoras-comum
Curruca conspicillata	toutinegra-tomilheira
Curruca sarda	toutinegra-sarda

Curruca undata	toutinegra-do-mato
Curruca balearica	toutinegra-balear

Paradoxornithidae Bicos-de-papagaio

Esta família inclui um conjunto de espécies bastante heterogéneas entre si, tendo parte delas pertencido antes aos Sylviidae - os bicos-de-papagaio - e outra parte aos Timaliidae - várias espécies de fulvetas. Os bicos-de-papagaio são pequenas aves de cores ruivas ou alaranjadas e com um bico espesso e arredondado, que utilizam para consumir sementes e rebentos. As várias fulvetas, pelo contrário, são principalmente insectívoras, com bicos mais finos, embora tenham também plumagens arruivadas.

Espécies: 38

Distribuição: Ásia e uma espécie no oeste da América do Norte

Myzornis pyrrhoura	mizornis-meleiro
Moupinia poecilotis	fulveta-rabirruiva
Lioparus chrysotis	fulveta-dourada
Chrysomma sinense	fulveta-d'olho-amarelo
Chrysomma altirostre	fulveta-de-bico-grosso
Rhopophilus albosuperciliaris	fulveta-do-tarim
Rhopophilus pekinensis	fulveta-de-pequim
Fulvetta ruficapilla	fulveta-de-lunetas
Fulvetta danisi	fulveta-indochinesa
Fulvetta striaticollis	fulveta-chinesa
Fulvetta vinipectus	fulveta-de-sobrancelha-branca
Fulvetta ludlowi	fulveta-de-ludlow
Fulvetta manipurensis	fulveta-de-manipur
Fulvetta cinereiceps	fulveta-de-capuz
Fulvetta formosana	fulveta-da-formosa
Chamaea fasciata	câmea
Paradoxornis heudei	bico-de-papagaio-dos-caniços
Paradoxornis flavirostris	bico-de-papagaio-de-peito-preto
Paradoxornis guttaticollis	bico-de-papagaio-ponteado
Paradoxornis aemodium	bico-de-papagaio-grande
Paradoxornis unicolor	bico-de-papagaio-castanho
Paradoxornis paradoxus	bico-de-papagaio-tridáctilo
Paradoxornis gularis	bico-de-papagaio-de-cabeça-cinzenta
Paradoxornis margaritae	bico-de-papagaio-de-cabeça-preta
Paradoxornis ruficeps	bico-de-papagaio-de-peito-branco
Paradoxornis bakeri	bico-de-papagaio-de-cabeça-ruiva
Suthora davidiana	bico-de-papagaio-de-cauda-curta
Suthora fulvifrons	bico-de-papagaio-fulvo
Suthora nipalensis	bico-de-papagaio-de-garganta-preta
Suthora verreauxi	bico-de-papagaio-dourado

Suthora atrosuperciliaris	bico-de-papagaio-de-bico-pálido
Suthora conspicillata	bico-de-papagaio-de-lunetas
Suthora zappeyi	bico-de-papagaio-de-capuz
Suthora brunnea	bico-de-papagaio-d'asa-castanha
Suthora ricketti	bico-de-papagaio-do-iunão
Suthora webbiana	bico-de-papagaio-de-webb
Suthora alphonsiana	bico-de-papagaio-de-garganta-cinzenta
Suthora przewalskii	bico-de-papagaio-de-przewalski

Zosteropidae — Olhos-brancos e afins

Os olhos-brancos, assim chamados devido ao conspícuo anel branco que ostentam em redor do olho, formam um grupo numeroso. Diversas espécies partilham o mesmo padrão de plumagem: esverdeado por cima e cinzento ou amarelado por baixo. As iuínas são ruivas ou acinzentadas e com uma pequena poupa. Muitas espécies desta família são endémicas de pequenas ilhas ou arquipélagos e uma boa parte encontra-se ameaçada, devido à destruição de habitat e à invasão de predadores.

Espécies: 151

Distribuição: África subsariana, Sul da Ásia, Oceânia e inúmeras ilhas, em especial no oceano Pacífico

Parayuhina diademata	iuína-coroada
Staphida everetti	iuína-do-bornéu
Staphida castaniceps	iuína-estriada
Staphida torqueola	iuína-indochinesa
Yuhina nigrimenta	iuína-de-queixo-preto
Yuhina brunneiceps	iuína-da-formosa
Yuhina flavicollis	iuína-de-bigodes
Yuhina humilis	iuína-birmanesa
Yuhina bakeri	iuína-de-nuca-branca
Yuhina gularis	iuína-de-garganta-estriada
Yuhina occipitalis	iuína-de-crisso-ruivo
Dasycrotapha speciosa	timali-flamejante
Dasycrotapha pygmaea	timali-pigmeu-das-vissaias
Dasycrotapha plateni	timali-pigmeu-de-mindanau
Sterrhoptilus capitalis	timali-de-coroa-ferrugínea
Sterrhoptilus dennistouni	timali-de-coroa-dourada
Sterrhoptilus affinis	timali-de-calabarzon
Sterrhoptilus nigrocapitatus	timali-das-vissaias
Zosterornis hypogrammicus	timali-de-palawan
Zosterornis striatus	timali-estriado
Zosterornis whiteheadi	timali-de-faces-castanhas
Zosterornis latistriatus	timali-de-lução
Zosterornis nigrorum	timali-de-negros
Cleptornis marchei	olho-branco-dourado
Rukia ruki	olho-branco-de-lágrima
Rukia longirostra	olho-branco-de-bico-comprido
Megazosterops palauensis	olho-branco-de-palau
Heleia javanica	olho-branco-javanês
Heleia pinaiae	olho-branco-de-cabeça-cinzenta
Heleia squamifrons	olho-branco-pigmeu

Heleia goodfellowi	olho-branco-de-mindanau
Heleia squamiceps	olho-branco-de-cabeça-riscada
Heleia superciliaris	olho-branco-das-flores
Heleia dohertyi	olho-branco-de-crista
Heleia muelleri	olho-branco-timorense
Heleia crassirostris	olho-branco-de-bico-grosso
Heleia wallacei	olho-branco-das-pequenas-sundas
Apalopteron familiare	olho-branco-das-bonin
Tephrozosterops stalkeri	olho-branco-ruivo
Zosterops ceylonensis	olho-branco-cingalês
Zosterops nigrorum	olho-branco-amarelado
Zosterops atricapilla	olho-branco-mascarado
Zosterops abyssinicus	olho-branco-abissínio
Zosterops flavilateralis	olho-branco-queniano
Zosterops mbuluensis	olho-branco-de-mbulu
Zosterops erythropleurus	olho-branco-de-flancos-ruivos
Zosterops simplex	olho-branco-de-swinhoe
Zosterops emiliae	olho-preto-montês
Zosterops japonicus	olho-branco-japonês
Zosterops palpebrosus	olho-branco-oriental
Zosterops meyeni	olho-branco-filipino
Zosterops semiflavus	olho-branco-de-marianne
Zosterops mouroniensis	olho-branco-de-karthala
Zosterops olivaceus	olho-branco-oliváceo-da-reunião
Zosterops chloronothos	olho-branco-oliváceo-das-maurícias
Zosterops borbonicus	olho-branco-cinzento-da-reunião
Zosterops mauritianus	olho-branco-cinzento-das-maurícias
Zosterops melanocephalus	olho-branco-camaronês
Zosterops stenocricotus	olho-branco-da-floresta
Zosterops stuhlmanni	olho-branco-verde
Zosterops eurycricotus	olho-branco-do-kilimanjaro
Zosterops brunneus	olho-branco-de-fernando-pó
Zosterops poliogastrus	olho-branco-montês
Zosterops kaffensis	olho-branco-de-kafa
Zosterops kikuyuensis	olho-branco-de-kikuyu
Zosterops socotranus	olho-branco-de-socotra
Zosterops ficedulinus	olho-branco-do-princípe
Zosterops griseovirescens	olho-branco-de-ano-bom
Zosterops feae	olho-branco-de-são-tomé
Zosterops lugubris	olho-grosso-de-são-tomé
Zosterops leucophaeus	olho-grosso-do-príncipe
Zosterops silvanus	olho-branco-dos-taita
Zosterops senegalensis	olho-branco-amarelo
Zosterops kasaicus	olho-branco-angolano
Zosterops pallidus	olho-branco-do-orange

Zosterops winifredae	olho-branco-das-pare
Zosterops virens	olho-branco-do-cabo
Zosterops anderssoni	olho-branco-austral
Zosterops vaughani	olho-branco-de-pemba
Zosterops modestus	olho-branco-das-seicheles
Zosterops anjuanensis	olho-branco-de-anjouan
Zosterops aldabrensis	olho-branco-de-aldabra
Zosterops kirki	olho-branco-de-kirk
Zosterops comorensis	olho-branco-de-moéli
Zosterops mayottensis	olho-branco-de-maiote
Zosterops maderaspatanus	olho-branco-malgaxe
Zosterops meratusensis	olho-branco-das-meratus
Zosterops chloris	olho-branco-citrino
Zosterops flavissimus	olho-branco-das-wakatobi
Zosterops atrifrons	olho-branco-de-coroa-preta
Zosterops nehrkorni	olho-branco-de-sangihe
Zosterops consobrinorum	olho-branco-de-celebes
Zosterops somadikartai	olho-branco-das-togian
Zosterops anomalus	olho-branco-anómalo
Zosterops minor	olho-branco-de-testa-verde
Zosterops chrysolaemus	olho-branco-de-testa-preta
Zosterops meeki	olho-branco-de-garganta-branca
Zosterops dehaani	olho-branco-de-morotai
Zosterops atriceps	olho-branco-das-molucas
Zosterops buruensis	olho-branco-de-buru
Zosterops stalkeri	olho-branco-de-ceram
Zosterops flavus	olho-branco-dos-mangais
Zosterops citrinella	olho-branco-pálido
Zosterops luteus	olho-branco-australiano
Zosterops lateralis	olho-branco-de-dorso-cinzento
Zosterops auriventer	olho-branco-de-hume
Zosterops melanurus	olho-branco-de-cauda-preta
Zosterops everetti	olho-branco-de-everett
Zosterops vellalavella	olho-branco-de-vella-lavella
Zosterops sanctaecrucis	olho-branco-de-santa-cruz
Zosterops fuscicapilla	olho-branco-mitrado
Zosterops flavifrons	olho-branco-de-vanuatu
Zosterops superciliosus	olho-branco-de-woodford
Zosterops lacertosus	olho-branco-de-sanford
Zosterops gibbsi	olho-branco-de-vanikoro
Zosterops explorator	olho-branco-das-fiji
Zosterops hypoxanthus	olho-branco-das-bismarck
Zosterops mysorensis	olho-branco-de-biak
Zosterops hamlini	olho-branco-de-bougainville
Zosterops oblitus	olho-branco-de-guadalcanal

Zosterops rendovae	olho-branco-de-makira
Zosterops oleagineus	olho-branco-de-yap
Zosterops finschii	olho-branco-de-finsch
Zosterops ponapensis	olho-branco-de-ponapé
Zosterops cinereus	olho-branco-de-kosrae
Zosterops rotensis	olho-branco-de-rota
Zosterops metcalfii	olho-branco-de-garganta-amarela
Zosterops stresemanni	olho-branco-de-malaita
Zosterops novaeguineae	olho-branco-da-papua
Zosterops kuehni	olho-branco-de-ambon
Zosterops grayi	olho-branco-de-barriga-pérola
Zosterops luteirostris	olho-branco-de-gizo
Zosterops uropygialis	olho-branco-de-barriga-dourada
Zosterops splendidus	olho-branco-esplêndido
Zosterops kulambangrae	olho-branco-das-salomão
Zosterops tetiparius	olho-branco-de-tetepare
Zosterops natalis	olho-branco-da-ilha-de-natal
Zosterops conspicillatus	olho-branco-d’óculos
Zosterops semperi	olho-branco-das-carolinas
Zosterops hypolais	olho-branco-liso
Zosterops paruhbesar	olho-branco-de-wangi-wangi
Zosterops griseotinctus	olho-branco-das-luisíadas
Zosterops murphyi	olho-branco-de-murphy
Zosterops inornatus	olho-branco-simples
Zosterops albogularis	olho-branco-de-peito-branco
Zosterops samoensis	olho-branco-de-samoa
Zosterops strenuus	olho-branco-robusto
Zosterops tenuirostris	olho-branco-de-bico-fino
Zosterops minutus	olho-branco-pequeno
Zosterops xanthochroa	olho-branco-de-dorso-verde
Zosterops rennellianus	olho-branco-da-rennell

Tal como aconteceu com os Sylviidae, esta família era antes muito maior, tendo sido separada em várias famílias distintas, devido a estudos genéticos recentes. As aves que aqui permanecem são na sua maioria aves insectívoras, de hábitos arborícolas. Aqui se incluem a maioria dos timalis, de plumagens castanhas, ruivas ou amareladas, mas também as cimitarras - cujo nome deriva do seu bico longo e curvo - e vários ratinhos, de cauda curta e aspecto muito semelhante aos membros da família Pnoepygidae.

Espécies: 58

Distribuição: Ásia tropical

Timalia pileata	timali-de-barrete
Dumetia hyperythra	timali-fulvo
Dumetia atriceps	timali-de-cabeça-preta
Mixornis kelleyi	timali-de-kelley
Mixornis flavicollis	timali-de-faces-cinzentas
Mixornis prillwitzi	timali-das-kangean
Mixornis gularis	timali-de-garganta-estriada
Mixornis bornensis	timali-do-bornéu
Macronus ptilosus	timali-peludo
Macronus striaticeps	timali-castanho
Cyanoderma chrysaeum	timali-dourado
Cyanoderma erythropterum	timali-d'asa-castanha
Cyanoderma bicolor	timali-bicolor
Cyanoderma melanothorax	timali-frisado
Cyanoderma pyrrhops	timali-de-queixo-preto
Cyanoderma ruficeps	timali-de-coroa-ruiva
Cyanoderma rufifrons	timali-de-testa-ruiva
Spelaeornis caudatus	ratinho-de-garganta-ruiva
Spelaeornis badeigularis	ratinho-dos-mishmi
Spelaeornis troglodytoides	ratinho-d'asa-barrada
Spelaeornis kinneari	ratinho-de-garganta-pálida
Spelaeornis chocolatinus	ratinho-rabilongo
Spelaeornis oatesi	ratinho-dos-chin
Spelaeornis longicaudatus	ratinho-de-peito-fulvo
Spelaeornis reptatus	ratinho-de-barriga-cinzenta
Melanocichla lugubris	charlatão-preto
Melanocichla calva	charlatão-careca
Pomatorhinus ferruginosus	cimitarra-de-coroa-preta
Pomatorhinus phayrei	cimitarra-de-coroa-castanha
Pomatorhinus ochraceiceps	cimitarra-de-bico-vermelho
Pomatorhinus superciliaris	cimitarra-de-bico-fino

Pomatorhinus ruficollis	cimitarra-de-peito-riscado
Pomatorhinus musicus	cimitarra-da-formosa
Pomatorhinus schisticeps	cimitarra-de-sobrancelha-branca
Pomatorhinus horsfieldii	cimitarra-indiana
Pomatorhinus melanurus	cimitarra-cingalesa
Pomatorhinus bornensis	cimitarra-das-sundas
Pomatorhinus montanus	cimitarra-javanesa
Erythrogenys hypoleucos	cimitarra-grande
Erythrogenys erythrogenys	cimitarra-ferrugínea
Erythrogenys imberbis	cimitarra-d'olho-vermelho
Erythrogenys mcclellandi	cimitarra-malhada
Erythrogenys gravivox	cimitarra-estriada
Erythrogenys swinhoei	cimitarra-de-flancos-cinzentos
Erythrogenys erythrocnemis	cimitarra-de-colar
Stachyris nigricollis	timali-de-garganta-preta
Stachyris grammiceps	timali-de-peito-branco
Stachyris maculata	timali-maculado
Stachyris nigriceps	timali-de-cabeça-estriada
Stachyris poliocephala	timali-de-cabeça-cinzenta
Stachyris nonggangensis	timali-de-nonggang
Stachyris herberti	timali-fuliginoso
Stachyris humei	timali-bico-de-cunha-ocidental
Stachyris roberti	timali-bico-de-cunha-oriental
Stachyris leucotis	timali-orelhudo
Stachyris thoracica	timali-de-babete-branco
Stachyris oglei	timali-de-garganta-branca
Stachyris strialata	timali-de-pescoço-malhado

Pellorneidae — Tordinas, Ratinhos e afins

Uma das múltiplas famílias resultantes da divisão dos antigos Timaliidae, esta família agrupa uma série de espécies insectívoras algo variadas em aparência, mas que partilham hábitos terrestres ou uma preferência pelos estratos inferiores da vegetação florestal (ao contrário dos Timaliidae, na definição actual). Tendem por isso a ter patas compridas e cauda relativamente curta. Aqui se incluem também algumas fulvetas do género *Schoeniparus* e os falsos-tordos de África, cujas proporções fazem lembrar pequenos tordos.

Espécies: 67

Distribuição: Ásia tropical (maioria) e África tropical (falsos-tordos)

Graminicola bengalensis	erveira-indiana
Graminicola striatus	erveira-chinesa
Turdinus macrodactylus	ratinho-grande
Turdinus marmoratus	ratinho-marmoreado
Turdinus atrigularis	ratinho-de-garganta-preta
Malacopteron affine	tordina-de-coroa-escura
Malacopteron albogulare	tordina-de-peito-cinzento
Malacopteron cinereum	tordina-de-coroa-escamada
Malacopteron magnum	tordina-de-coroa-ruiva
Malacopteron magnirostre	tordina-de-bigodes
Malacopteron palawanense	tordina-melodiosa
Gampsorhynchus rufulus	timali-de-cabeça-branca
Gampsorhynchus torquatus	timali-de-colar
Schoeniparus cinereus	fulveta-de-garganta-amarela
Schoeniparus castaneceps	fulveta-d'asa-ruiva
Schoeniparus klossi	fulveta-de-barrete-preto
Schoeniparus variegaticeps	fulveta-de-testa-dourada
Schoeniparus rufogularis	fulveta-de-garganta-ruiva
Schoeniparus dubius	fulveta-de-barrete-ruivo
Schoeniparus brunneus	fulveta-escura
Pellorneum ruficeps	tordina-de-peito-estriado
Pellorneum fuscocapillus	tordina-de-barrete-castanho
Pellorneum palustre	tordina-palustre
Pellorneum nigrocapitatum	tordina-malaia
Pellorneum capistratum	tordina-javanesa
Pellorneum capistratoides	tordina-do-bornéu
Pellorneum malaccense	tordina-de-cauda-curta
Pellorneum saturatum	tordina-musical
Pellorneum poliogene	tordina-folhiça
Pellorneum cinereiceps	tordina-de-coroa-cinzenta

Pellorneum albiventre	tordina-de-garganta-malhada
Pellorneum tickelli	tordina-de-peito-fulvo
Pellorneum buettikoferi	tordina-de-samatra
Pellorneum pyrrogenys	tordina-de-temminck
Pellorneum rostratum	tordina-de-peito-branco
Pellorneum bicolor	tordina-ferrugínea
Pellorneum celebense	tordina-de-celebes
Laticilla burnesii	prínia-de-crisso-ruivo
Laticilla cinerascens	prínia-palustre
Illadopsis fulvescens	falso-tordo-pardo
Illadopsis rufipennis	falso-tordo-de-peito-pálido
Illadopsis distans	falso-tordo-de-peito-cinzento
Illadopsis pyrrhoptera	falso-tordo-montês
Illadopsis cleaveri	falso-tordo-de-barrete
Illadopsis albipectus	falso-tordo-de-peito-escamoso
Illadopsis turdina	falso-tordo-malhado
Illadopsis puveli	falso-tordo-de-puvel
Illadopsis rufescens	falso-tordo-d'asa-ruiva
Kenopia striata	tordina-estriada
Malacocincla abbotti	tordina-de-abbott
Malacocincla sepiaria	tordina-de-horsfield
Malacocincla perspicillata	tordina-de-sobrancelha-preta
Gypsophila crassa	ratinho-montês
Gypsophila brevicaudata	ratinho-estriado
Gypsophila annamensis	ratinho-de-annam
Gypsophila calcicola	ratinho-ruivo
Gypsophila crispifrons	ratinho-variável
Gypsophila rufipectus	ratinho-de-peito-ruivo
Ptilocichla mindanensis	ratinho-de-mindanau
Ptilocichla leucogrammica	ratinho-do-bornéu
Ptilocichla falcata	ratinho-falcado
Napothera epilepidota	ratinho-de-sobrancelha
Napothera malacoptila	ratinho-de-bico-comprido
Napothera albostriata	ratinho-de-samatra
Napothera pasquieri	ratinho-de-garganta-branca
Napothera naungmungensis	ratinho-de-naung-mung
Napothera danjoui	ratinho-de-cauda-curta

Leiothrichidae Charlatães, Zaragateiros e afins

Esta família reúne um conjunto de aves de tamanho pequeno a médio, algumas com plumagens bastante coloridas. Vivem em ambientes variados, desde florestas densas até savanas ou zonas de matos, sendo a sua alimentação composta sobretudo por insectos, bagas e sementes. Embora contando com cerca de vinte espécies em África, esta é uma família essencialmente asiática, sendo o Extremo Oriente é a região onde é possível encontrar a maior diversidade.

Espécies: 143

Distribuição: África e metade sul da Ásia, desde o Médio Oriente até à China

Alcippe poioicephala	fulveta-de-faces-castanhas
Alcippe grotei	fulveta-de-sobrancelha-preta
Alcippe brunneicauda	fulveta-castanha
Alcippe pyrrhoptera	fulveta-javanesa
Alcippe nipalensis	fulveta-nepalesa
Alcippe davidi	fulveta-de-david
Alcippe hueti	fulveta-de-huet
Alcippe morrisonia	fulveta-de-faces-cinzentas
Alcippe fratercula	fulveta-do-iunão
Alcippe peracensis	fulveta-montesa
Grammatoptila striata	charlatão-de-poupa
Cutia nipalensis	cutia-nepalesa
Cutia legalleni	cutia-vietnamita
Laniellus langbianis	síbia-de-coroa-cinzenta
Laniellus albonotatus	síbia-malhada
Trochalopteron subunicolor	charlatão-escamado
Trochalopteron austeni	charlatão-de-cabeça-castanha
Trochalopteron squamatum	charlatão-d'asa-azul
Trochalopteron lineatum	charlatão-estriado
Trochalopteron imbricatum	charlatão-do-butão
Trochalopteron virgatum	charlatão-raiado
Trochalopteron variegatum	charlatão-variegado
Trochalopteron affine	charlatão-de-faces-pretas
Trochalopteron morrisonianum	charlatão-do-morrison
Trochalopteron henrici	charlatão-de-faces-castanhas
Trochalopteron elliotii	charlatão-de-elliot
Trochalopteron milnei	charlatão-de-cauda-vermelha
Trochalopteron yersini	charlatão-de-yersin
Trochalopteron erythrocephalum	charlatão-de-coroa-castanha
Trochalopteron chrysopterum	charlatão-de-assam

Trochalopteron formosum	charlatão-d'asa-vermelha
Trochalopteron melanostigma	charlatão-d'orelhas-prateadas
Trochalopteron ngoclinhense	charlatão-d'asa-dourada
Trochalopteron peninsulae	charlatão-malaio
Montecincla jerdoni	charlatão-do-banasura
Montecincla cachinnans	charlatão-dos-nilgiris
Montecincla fairbanki	charlatão-dos-palni
Montecincla meridionalis	charlatão-do-ashambu
Heterophasia picaoides	síbia-rabilonga
Heterophasia auricularis	síbia-de-faces-brancas
Heterophasia capistrata	síbia-ruiva
Heterophasia pulchella	síbia-formosa
Heterophasia gracilis	síbia-cinzenta
Heterophasia melanoleuca	síbia-de-dorso-preto
Heterophasia desgodinsi	síbia-de-cabeça-preta
Actinodura nipalensis	síbia-nepalesa
Actinodura morrisoniana	síbia-da-formosa
Actinodura waldeni	síbia-do-iunão
Actinodura souliei	síbia-estriada
Actinodura cyanouroptera	síbia-d'asa-azul
Actinodura strigula	síbia-de-garganta-estriada
Actinodura egertoni	síbia-ferrugínea
Actinodura ramsayi	síbia-de-lunetas
Actinodura sodangorum	síbia-de-barrete-preto
Leiothrix lutea	rouxinol-do-japão
Leiothrix argentauris	rouxinol-de-faces-prateadas
Minla ignotincta	minla-de-cauda-vermelha
Leioptila annectens	síbia-de-dorso-ruivo
Liocichla bugunorum	charlatão-bugun
Liocichla omeiensis	charlatão-do-emei
Liocichla steerii	charlatão-de-steere
Liocichla phoenicea	charlatão-de-faces-vermelhas
Liocichla ripponi	charlatão-de-rippon
Argya malcolmi	zaragateiro-cinzento-grande
Argya cinereifrons	zaragateiro-de-cabeça-cinzenta
Argya longirostris	zaragateiro-de-bico-fino
Argya subrufa	zaragateiro-ruivo
Argya rufescens	zaragateiro-de-bico-laranja
Argya striata	zaragateiro-dos-matos
Argya affinis	zaragateiro-de-bico-amarelo
Argya rubiginosa	zaragateiro-ferrugíneo
Argya aylmeri	zaragateiro-de-aylmer
Argya altirostris	zaragateiro-iraquiano
Argya huttoni	zaragateiro-afegão
Argya caudata	zaragateiro-indiano

Argya fulva	zaragateiro-fulvo
Argya squamiceps	zaragateiro-árabe
Argya earlei	zaragateiro-estriado
Argya gularis	zaragateiro-de-garganta-branca
Turdoides nipalensis	zaragateiro-nepalês
Turdoides atripennis	zaragateiro-capuchinho
Turdoides gilberti	zaragateiro-camaronês
Turdoides chapini	zaragateiro-de-chapin
Turdoides rufocinctus	zaragateiro-de-colar-vermelho
Turdoides plebejus	zaragateiro-pardo
Turdoides leucopygia	zaragateiro-d'uropígio-branco
Turdoides hindei	zaragateiro-de-hinde
Turdoides squamulata	zaragateiro-escamoso
Turdoides jardineii	zaragateiro-castanho
Turdoides gymnogenys	zaragateiro-de-faces-nuas
Turdoides leucocephala	zaragateiro-de-cabeça-branca
Turdoides reinwardtii	zaragateiro-de-cabeça-preta
Turdoides tenebrosa	zaragateiro-sombrio
Turdoides bicolor	zaragateiro-bicolor
Turdoides hartlaubii	zaragateiro-de-hartlaub
Turdoides sharpei	zaragateiro-de-mascarilha
Turdoides melanops	zaragateiro-de-loros-pretos
Turdoides hypoleuca	zaragateiro-queniano
Garrulax merulinus	charlatão-de-peito-malhado
Garrulax annamensis	charlatão-de-peito-laranja
Garrulax canorus	charlatão-canoro
Garrulax taewanus	charlatão-da-formosa
Garrulax monileger	charlatão-pequeno-de-colar
Garrulax rufifrons	charlatão-de-testa-ruiva
Garrulax palliatus	charlatão-das-sundas
Garrulax leucolophus	charlatão-de-crista-branca
Garrulax bicolor	charlatão-de-samatra
Garrulax milleti	charlatão-de-capuz-preto
Garrulax strepitans	charlatão-de-babete
Garrulax ferrarius	charlatão-cambojano
Garrulax maesi	charlatão-cinzento
Garrulax castanotis	charlatão-de-faces-ruivas
Ianthocincla sukatschewi	charlatão-de-sukatschev
Ianthocincla rufogularis	charlatão-de-queixo-ruivo
Ianthocincla konkakinhensis	charlatão-d'orelha-castanha
Ianthocincla cineracea	charlatão-de-bigodes
Ianthocincla ocellata	charlatão-malhado
Ianthocincla maxima	charlatão-real
Ianthocincla bieti	charlatão-estrelado
Ianthocincla lunulata	charlatão-barrado

Pterorhinus delesserti	charlatão-de-wayanad
Pterorhinus gularis	charlatão-de-barriga-ruiva
Pterorhinus vassali	charlatão-de-faces-brancas
Pterorhinus galbanus	charlatão-de-garganta-amarela
Pterorhinus courtoisi	charlatão-de-coroa-azul
Pterorhinus mitratus	charlatão-de-barrete-castanho
Pterorhinus treacheri	charlatão-de-capuz-castanho
Pterorhinus ruficollis	charlatão-de-pescoço-ruivo
Pterorhinus nuchalis	charlatão-de-dorso-castanho
Pterorhinus chinensis	charlatão-de-garganta-preta
Pterorhinus sannio	charlatão-palhaço
Pterorhinus perspicillatus	charlatão-mascarado
Pterorhinus pectoralis	charlatão-grande-de-colar
Pterorhinus davidi	charlatão-de-david
Pterorhinus woodi	charlatão-indiano
Pterorhinus lanceolatus	charlatão-chinês
Pterorhinus waddelli	charlatão-gigante
Pterorhinus koslowi	charlatão-do-tibete
Pterorhinus albogularis	charlatão-de-garganta-branca
Pterorhinus ruficeps	charlatão-de-coroa-ruiva
Pterorhinus caerulatus	charlatão-de-flancos-cinzentos
Pterorhinus berthemyi	charlatão-ruivo
Pterorhinus poecilorhynchus	charlatão-ferrugíneo

Esta é, sem dúvida, uma das famílias menos bem conhecidas do planeta. Compreende três espécies com aspecto de tordo e plumagem acastanhada, que habitam floresta densa em zonas montanhosas bastante isoladas. Todas elas são tímidas, sendo mais frequentemente ouvidas que vistas. Sabe-se muito pouco sobre os seus hábitos alimentares, mas pensa-se que se alimentam de insectos e bagas, que procuram junto ao solo.

Espécies: 3

Distribuição: África tropical

Modulatrix stictigula	tordina-de-lunetas
Arcanator orostruthus	tordina-malhada
Kakamega poliothorax	tordina-de-kakamega

Promeropidae — Papa-açúcares

Castanhos, com um bico ligeiramente curvo, próprio de aves que se alimentam de néctar e insectos, os papa-açúcares podem fazer lembrar beija-flores (Nectariniidae) de grande dimensão e com uma cauda extremamente longa, mas na verdade não lhes são aparentados. São aves muito dependentes das próteas, um género de plantas que existe na África austral e de cujo néctar se alimentam, tendo também um papel importante como polinizadores.

Espécies: 2

Distribuição: África austral

Promerops cafer	papa-açúcar-do-cabo
Promerops gurneyi	papa-açúcar-de-gurney

As três espécies que constituem esta família são lindíssimas aves, de plumagem azul brilhante nas partes superiores, contrastando com preto ou azul-escuro nas partes inferiores. Alimentam-se na copa de florestas tropicais húmidas, onde procuram os frutos de que se alimentam, com uma particular predilecção por figos. Para construir e cuidar do seu ninho, descem até aos estratos inferiores da floresta.

Espécies: 3

Distribuição: Indochina, arquipélago indo-malaio, Filipinas e partes da Índia

Irena puella	irena-de-dorso-azul
Irena tweeddalii	irena-de-palawan
Irena cyanogastra	irena-de-dorso-preto

Regulidae — Estrelinhas

As estrelinhas são aves minúsculas e hiperactivas, que passam a maior parte do seu tempo na copa das árvores em latitudes temperadas e boreais, procurando pequenos artrópodes na casca, ramos e folhas. Têm uma preferência por coníferas, mas certas espécies (como a estrelinha-da-madeira) ocorrem onde não existem coníferas autóctones. A sua plumagem é bastante uniforme, destacando-se uma lista amarela ou laranja na coroa.

Espécies: 6

Distribuição: Holárctico, estendendo-se a sul até aos Himalaias na Ásia

Corthylio calendula	estrelinha-de-coroa-rubi
Regulus ignicapilla	estrelinha-real
Regulus madeirensis	estrelinha-da-madeira
Regulus satrapa	estrelinha-de-coroa-dourada
Regulus goodfellowi	estrelinha-da-formosa
Regulus regulus	estrelinha-de-poupa

O ratinho-malhado, como o nome sugere, era antes considerado parte dos Timaliidae, mas estudos recentes revelaram que esta espécie pertence a uma linhagem antiga e muito distante dos restantes ratinhos. É uma ave de zonas com vegetação densa de fetos e rododendros, no subcoberto de florestas temperadas e subtropicais do sudeste asiático, a grandes altitudes. A inacessibilidade dos seus habitats, por vezes em desfiladeiros profundos, contribui para a falta de conhecimento sobre esta espécie.

Espécies: 1

Distribuição: montanhas do sudeste asiático, desde o Nepal até à China

Elachura formosa	ratinho-malhado

As hiliotas são aves florestais, que tendem a frequentar as copas das árvores. Apresentam uma plumagem escura por cima e bege por baixo e uma cauda curta. Alimentam-se principalmente de insectos e dos seus ovos. Embora no passado tenham sido colocadas na família Sylviidae ou fossem consideradas próximas dos bátis, dos gladiadores ou dos papa-moscas, dados genéticos recentes sugerem que não têm parentes próximos e devem ter a sua própria família.

Espécies: 4

Distribuição: África subsariana

Hyliota flavigaster	hiliota-de-barriga-amarela
Hyliota australis	hiliota-austral
Hyliota usambara	hiliota-das-usambara
Hyliota violacea	hiliota-de-dorso-violeta

A carriça-eurasiática que conhecemos em Portugal, e que tem uma vasta distribuição, é na verdade a excepção nesta família predominantemente do Novo Mundo, onde ocupam praticamente todos os habitats existentes. São aves pequenas a médias, muito energéticas e com uma cauda curta que mantêm erguida. Todas elas se destacam pela sua extraordinária habilidade vocal, com cantos melodiosos, complexos (por vezes até em duetos) e de um volume muito mais alto do que o seu tamanho faria esperar.

Espécies: 96

Distribuição: Américas (quase todas) e Eurásia (apenas uma espécie)

Campylorhynchus albobrunneus	carriça-de-cabeça-branca
Campylorhynchus zonatus	carriça-de-dorso-barrado
Campylorhynchus megalopterus	carriça-serrana
Campylorhynchus nuchalis	carriça-de-dorso-riscado
Campylorhynchus fasciatus	carriça-ondulada
Campylorhynchus chiapensis	carriça-gigante
Campylorhynchus griseus	carriça-bicolor
Campylorhynchus rufinucha	carriça-de-nuca-ruiva
Campylorhynchus humilis	carriça-de-sclater
Campylorhynchus capistratus	carriça-de-dorso-castanho
Campylorhynchus gularis	carriça-malhada
Campylorhynchus jocosus	carriça-do-balsas
Campylorhynchus yucatanicus	carriça-do-iucatão
Campylorhynchus brunneicapillus	carriça-do-deserto
Campylorhynchus turdinus	carriça-turdina
Odontorchilus branickii	carriça-de-dorso-cinzento
Odontorchilus cinereus	carriça-dentada
Salpinctes obsoletus	carriça-das-rochas
Catherpes mexicanus	carriça-dos-barrancos
Hylorchilus sumichrasti	carriça-de-bico-fino
Hylorchilus navai	carriça-de-nava
Cinnycerthia unirufa	carriça-ruiva
Cinnycerthia olivascens	carriça-sépia
Cinnycerthia peruana	carriça-peruana
Cinnycerthia fulva	carriça-fulva
Cistothorus stellaris	carriça-dos-juncos
Cistothorus meridae	carriça-de-mérida
Cistothorus apolinari	carriça-de-apolinar
Cistothorus platensis	carriça-do-campo
Cistothorus palustris	carriça-dos-pauis
Thryomanes bewickii	carriça-de-bewick
Ferminia cerverai	carriça-de-zapata

Pheugopedius atrogularis	carriça-de-garganta-preta
Pheugopedius spadix	carriça-de-cabeça-cinzenta
Pheugopedius fasciatoventris	carriça-de-barriga-preta
Pheugopedius euophrys	carriça-de-cauda-lisa
Pheugopedius schulenbergi	carriça-de-sobrancelha-cinzenta
Pheugopedius eisenmanni	carriça-inca
Pheugopedius genibarbis	carriça-de-bigodes-brasileira
Pheugopedius mystacalis	carriça-de-bigodes-andina
Pheugopedius coraya	carriça-coraia
Pheugopedius felix	carriça-feliz
Pheugopedius maculipectus	carriça-de-peito-malhado
Pheugopedius rutilus	carriça-de-peito-ruivo
Pheugopedius sclateri	carriça-de-peito-pintalgado
Thryophilus pleurostictus	carriça-de-barriga-riscada
Thryophilus rufalbus	carriça-ruiva-e-branca
Thryophilus sernai	carriça-de-antioquia
Thryophilus nicefori	carriça-de-nicéforo
Thryophilus sinaloa	carriça-sinaloense
Cantorchilus modestus	carriça-modesta
Cantorchilus zeledoni	carriça-dos-canaviais
Cantorchilus elutus	carriça-panamense
Cantorchilus leucotis	carriça-de-peito-fulvo
Cantorchilus superciliaris	carriça-de-sobrancelha-branca
Cantorchilus guarayanus	carriça-dos-guaraios
Cantorchilus longirostris	carriça-de-bico-longo
Cantorchilus griseus	carriça-cinzenta
Cantorchilus semibadius	carriça-ribeirinha
Cantorchilus nigricapillus	carriça-de-cabeça-preta
Cantorchilus thoracicus	carriça-de-peito-estriado
Cantorchilus leucopogon	carriça-de-garganta-estriada
Thryothorus ludovicianus	carriça-da-carolina
Troglodytes troglodytes	carriça-eurasiática
Troglodytes hiemalis	carriça-invernante
Troglodytes pacificus	carriça-do-pacífico
Troglodytes tanneri	carriça-de-clarión
Troglodytes aedon	carriça-doméstica
Troglodytes musculus	carriça-latina
Troglodytes beani	carriça-de-cozumel
Troglodytes martinicensis	carriça-dos-caribes
Troglodytes mesoleucus	carriça-de-santa-lúcia
Troglodytes musicus	carriça-de-são-vicente
Troglodytes grenadensis	carriça-de-granada
Troglodytes cobbi	carriça-das-malvinas
Troglodytes sissonii	carriça-de-socorro
Troglodytes rufociliatus	carriça-de-sobrancelha-ruiva
Troglodytes ochraceus	carriça-ocre
Troglodytes solstitialis	carriça-andina
Troglodytes monticola	carriça-de-santa-marta

Troglodytes rufulus	carriça-dos-tepuis
Thryorchilus browni	carriça-dos-vulcões
Uropsila leucogastra	carriça-de-barriga-branca
Henicorhina leucosticta	carriça-de-peito-branco
Henicorhina leucophrys	carriça-de-peito-cinzento
Henicorhina anachoreta	carriça-eremita
Henicorhina leucoptera	carriça-d'asa-branca
Henicorhina negreti	carriça-do-munchique
Microcerculus philomela	carriça-rouxinol-nortenha
Microcerculus marginatus	carriça-rouxinol-meridional
Microcerculus ustulatus	carriça-flautista
Microcerculus bambla	carriça-de-banda-branca
Cyphorhinus dichrous	carriça-serrana-nortenha
Cyphorhinus thoracicus	carriça-serrana-meridional
Cyphorhinus arada	carriça-musical
Cyphorhinus phaeocephalus	carriça-canora

Polioptilidae Caça-mosquitos

Tão energéticos como as carriças, os caça-mosquitos são aves de tons simples, que se movimentam pela vegetação de florestas e matagais em busca de insectos. No entanto, são, em comparação com as carriças, aves de um aspecto mais leve e elegante, com caudas compridas, com bicos muito longos ou ambos. Em 2005 foi descoberta uma nova espécie, o caça-mosquitos-de-iquitos, endémico de uma pequena área de solos pobres na Amazónia peruana.

Espécies: 22

Distribuição: Américas (excepto regiões boreais e austrais)

Ramphocaenus sticturus	caça-mosquitos-trinador
Ramphocaenus melanurus	caça-mosquitos-de-bico-comprido
Microbates cinereiventris	caça-mosquitos-de-faces-castanhas
Microbates collaris	caça-mosquitos-de-coleira
Polioptila facilis	caça-mosquitos-do-rio-negro
Polioptila guianensis	caça-mosquitos-guianense
Polioptila schistaceigula	caça-mosquitos-ardósia
Polioptila paraensis	caça-mosquitos-paraense
Polioptila clementsi	caça-mosquitos-de-iquitos
Polioptila attenboroughi	caça-mosquitos-do-inambari
Polioptila plumbea	caça-mosquitos-tropical
Polioptila maior	caça-mosquitos-do-maranhão
Polioptila lactea	caça-mosquitos-creme
Polioptila dumicola	caça-mosquitos-de-mascarilha
Polioptila lembeyei	caça-mosquitos-cubano
Polioptila albiventris	caça-mosquitos-do-iucatão
Polioptila bilineata	caça-mosquitos-de-sobrancelha
Polioptila caerulea	caça-mosquitos-azulado
Polioptila melanura	caça-mosquitos-de-cauda-preta
Polioptila californica	caça-mosquitos-da-califórnia
Polioptila nigriceps	caça-mosquitos-de-barrete
Polioptila albiloris	caça-mosquitos-de-faces-brancas

Sittidae — Trepadeira-azul e afins

Esta família de trepadeiras encontra-se bem adaptada a uma vida agarrada às superfícies verticais dos troncos das árvores, graças aos seus pés bastante fortes, que lhes permitem tanto subir como descer. Têm um bico forte, que usam para alargar fendas na casca das árvores, de modo a de lá extrair os pequenos invertebrados de que se alimentam. Nidificam em cavidades e muitas espécies conseguem estreitar o diâmetro da entrada aplicando lama na periferia.

Espécies: 29

Distribuição: América do Norte, Europa, Ásia e, localmente, Norte de África

Sitta leucopsis	trepadeira-de-faces-brancas
Sitta przewalskii	trepadeira-de-przewalski
Sitta magna	trepadeira-gigante
Sitta carolinensis	trepadeira-de-peito-branco
Sitta formosa	trepadeira-formosa
Sitta azurea	trepadeira-de-barriga-preta
Sitta frontalis	trepadeira-de-bico-vermelho
Sitta solangiae	trepadeira-de-bico-amarelo
Sitta oenochlamys	trepadeira-filipina
Sitta pygmaea	trepadeira-pigmeia
Sitta pusilla	trepadeira-de-cabeça-castanha
Sitta insularis	trepadeira-baamense
Sitta yunnanensis	trepadeira-do-iunão
Sitta ledanti	trepadeira-argelina
Sitta krueperi	trepadeira-turca
Sitta canadensis	trepadeira-de-peito-ruivo
Sitta whiteheadi	trepadeira-corsa
Sitta villosa	trepadeira-chinesa
Sitta neumayer	trepadeira-rupestre
Sitta tephronota	trepadeira-persa
Sitta arctica	trepadeira-siberiana
Sitta victoriae	trepadeira-birmanesa
Sitta himalayensis	trepadeira-de-cauda-branca
Sitta europaea	trepadeira-azul
Sitta nagaensis	trepadeira-dos-naga
Sitta cashmirensis	trepadeira-de-caxemira
Sitta castanea	trepadeira-indiana
Sitta cinnamoventris	trepadeira-de-barriga-castanha
Sitta neglecta	trepadeira-indochinesa

Tichodromidae — Trepadeira-dos-muros

A trepadeira-dos-muros é uma ave singular. Habita em zonas rochosas, geralmente em montanha, e trepa pelas paredes, em busca dos insectos de que se alimenta. Embora viva em locais de altitude, no Inverno pode aparecer nas terras baixas, havendo registos em barragens, igrejas ou outras construções. O nome genérico *Tichodroma* deriva do grego antigo e significa "que corre nas paredes", sendo esta uma referência ao habitat e ao modo de vida desta ave.

Espécies: 1

Distribuição: Europa e Ásia

Tichodroma muraria	trepadeira-dos-muros

Certhiidae — Trepadeiras

Estas aves são facilmente reconhecíveis pelo seu comportamento de subir os troncos de árvores, procurando pequenos artrópodes na superfície e nas fissuras da casca. Utilizam para isso o seu bico fino e curvado. Têm a plumagem acastanhada e as penas da cauda fortalecidas, para providenciar suporte. Nidificam também em troncos, debaixo de secções levantadas da casca. Esta família atinge a sua máxima diversidade nas montanhas da Ásia.

Espécies: 9

Distribuição: América do Norte, Eurásia e partes de África

Certhia familiaris	trepadeira-dos-bosques
Certhia hodgsoni	trepadeira-de-hodgson
Certhia americana	trepadeira-americana
Certhia brachydactyla	trepadeira-comum
Certhia himalayana	trepadeira-dos-himalaias
Certhia nipalensis	trepadeira-nepalesa
Certhia discolor	trepadeira-parda
Certhia manipurensis	trepadeira-de-manipur
Certhia tianquanensis	trepadeira-do-sujuão

Salpornithidae — Trepadeiras-malhadas

Até recentemente, estas trepadeiras eram incluídas na família Certhiidae, contudo estudos recentes suportam a sua reclassificação numa família diferente. Embora superficialmente parecidas com as outras trepadeiras, distinguem-se, entre outros aspectos, pelo facto de não se apoiarem na cauda enquanto sobem pelos troncos das árvores. A relação destas aves com as trepadeiras-azuis e com a trepadeira-dos-muros não são ainda muito claras.

Espécies: 2

Distribuição: Índia e regiões tropicais de África

Salpornis spilonota	trepadeira-malhada-indiana
Salpornis salvadori	trepadeira-malhada-africana

Mimidae — Mimos, Debulhadores e afins

Esta família agrupa um conjunto de passeriformes de dimensão média e cauda comprida, conhecidos pelos seus cantos longos e elaborados, incluindo muitas imitações. São omnipresentes em habitats abertos das Américas, desde desertos a savanas, desde que exista alguma vegetação arbustiva densa. Têm uma alimentação omnívora.

Espécies: 35

Distribuição: Américas, com excepção das regiões boreais

Dumetella carolinensis	miador-cinzento
Melanoptila glabrirostris	miador-preto
Mimus polyglottos	mimo-nortenho
Mimus gilvus	mimo-tropical
Mimus gundlachii	mimo-baamense
Mimus thenca	mimo-chileno
Mimus longicaudatus	mimo-rabilongo
Mimus saturninus	mimo-de-sobrancelha
Mimus patagonicus	mimo-patagónico
Mimus triurus	mimo-d'asa-branca
Mimus dorsalis	mimo-castanho
Mimus parvulus	mimo-das-galápagos
Mimus trifasciatus	mimo-da-floreana
Mimus macdonaldi	mimo-da-espanhola
Mimus melanotis	mimo-de-são-cristóvão
Mimus graysoni	mimo-de-socorro
Oreoscoptes montanus	debulhador-das-artemísias
Toxostoma rufum	debulhador-castanho
Toxostoma longirostre	debulhador-de-bico-longo
Toxostoma guttatum	debulhador-de-cozumel
Toxostoma cinereum	debulhador-cinzento
Toxostoma bendirei	debulhador-de-bico-curto
Toxostoma ocellatum	debulhador-malhado
Toxostoma curvirostre	debulhador-de-bico-curvo
Toxostoma redivivum	debulhador-da-califórnia
Toxostoma crissale	debulhador-de-crisso-ruivo
Toxostoma lecontei	debulhador-pálido
Ramphocinclus brachyurus	debulhador-de-martinica
Ramphocinclus sanctaeluciae	debulhador-de-santa-lúcia
Melanotis caerulescens	mimo-azul
Melanotis hypoleucus	mimo-azul-e-branco
Allenia fusca	debulhador-de-peito-escamado
Margarops fuscatus	debulhador-d'olho-pérola
Cinclocerthia ruficauda	tremedor-castanho
Cinclocerthia gutturalis	tremedor-cinzento

Sturnidae Estorninhos, Mainás e afins

Os estorninhos e os mainás são aves do tamanho de tordos, com plumagens muito variadas que, nalguns casos, são muito coloridas ou iridescentes. Frequentam uma grande variedade de habitats, desde florestas, savanas e zonas áridas até terrenos agrícolas e mesmo áreas urbanas. Alimentam-se de frutas e insectos, mas alguns têm uma dieta mais oportunista. Certas espécies ocorrem apenas em ilhas, encontrando-se ameaçadas pela destruição de habitat e pela introdução de predadores.

Espécies: 125

Distribuição: Eurásia, África, Madagáscar e certos locais da Oceânia

Aplonis metallica	estorninho-metálico
Aplonis mystacea	estorninho-d'olho-amarelo
Aplonis cantoroides	estorninho-cantor
Aplonis crassa	estorninho-das-tanimbar
Aplonis feadensis	estorninho-dos-atóis
Aplonis insularis	estorninho-de-rennell
Aplonis magna	estorninho-de-biak
Aplonis brunneicapillus	estorninho-d'olho-branco
Aplonis grandis	estorninho-das-salomão
Aplonis dichroa	estorninho-de-makira
Aplonis zelandica	estorninho-melanésio
Aplonis striata	estorninho-da-nova-caledónia
Aplonis fusca	estorninho-de-norfolk
Aplonis santovestris	estorninho-de-espírito-santo
Aplonis panayensis	estorninho-bronzeado
Aplonis mysolensis	estorninho-das-molucas
Aplonis minor	estorninho-de-cauda-curta
Aplonis opaca	estorninho-micronésio
Aplonis pelzelni	estorninho-de-ponapé
Aplonis tabuensis	estorninho-polinésio
Aplonis atrifusca	estorninho-de-samoa
Aplonis corvina	estorninho-de-kosrae
Aplonis mavornata	estorninho-misterioso
Aplonis cinerascens	estorninho-de-rarotonga
Mino dumontii	mainá-de-faces-amarelas
Mino kreffti	mainá-rabilongo
Mino anais	mainá-dourado
Basilornis celebensis	mainá-de-celebes
Basilornis galeatus	mainá-de-elmo
Basilornis corythaix	mainá-de-ceram
Goodfellowia miranda	mainá-de-mindanau
Sarcops calvus	mainá-calvo

Streptocitta albicollis	mainá-de-pescoço-branco
Streptocitta albertinae	mainá-de-sula
Enodes erythrophris	estorninho-de-sobrancelha-flamejante
Scissirostrum dubium	estorninho-de-bico-grosso
Saroglossa spilopterus	estorninho-d'asa-manchada
Ampeliceps coronatus	mainá-coroado
Gracula ptilogenys	mainá-cingalês
Gracula religiosa	mainá-religioso
Gracula robusta	mainá-de-nias
Gracula venerata	mainá-venerado
Gracula indica	mainá-malabar
Acridotheres grandis	mainá-grande
Acridotheres cristatellus	mainá-de-crista
Acridotheres javanicus	mainá-javanês
Acridotheres cinereus	mainá-cinzento
Acridotheres fuscus	mainá-da-selva
Acridotheres albocinctus	mainá-de-colar
Acridotheres ginginianus	mainá-ribeirinho
Acridotheres tristis	mainá-indiano
Acridotheres burmannicus	mainá-birmanês
Acridotheres leucocephalus	mainá-vinoso
Acridotheres melanopterus	mainá-d'asa-preta
Spodiopsar sericeus	estorninho-de-bico-vermelho
Spodiopsar cineraceus	estorninho-de-faces-brancas
Gracupica nigricollis	estorninho-de-pescoço-preto
Gracupica contra	estorninho-indiano
Gracupica floweri	estorninho-siamês
Gracupica jalla	estorninho-javanês
Agropsar sturninus	estorninho-dáurico
Agropsar philippensis	estorninho-de-faces-castanhas
Sturnia sinensis	estorninho-chinês
Sturnia malabarica	estorninho-de-cabeça-cinzenta
Sturnia erythropygia	estorninho-de-cabeça-branca
Sturnia blythii	estorninho-malabar
Sturnia pagodarum	estorninho-brâmane
Sturnornis albofrontatus	estorninho-cingalês
Leucopsar rothschildi	mainá-de-bali
Fregilupus varius	estorninho-da-reunião
Necropsar rodericanus	estorninho-de-rodrigues
Pastor roseus	estorninho-rosado
Sturnus vulgaris	estorninho-malhado
Sturnus unicolor	estorninho-preto
Creatophora cinerea	estorninho-carunculado
Notopholia corusca	estorninho-de-barriga-preta
Hylopsar purpureiceps	estorninho-de-cabeça-aveludada
Hylopsar cupreocauda	estorninho-de-cauda-cobreada
Lamprotornis nitens	estorninho-do-cabo
Lamprotornis chalybaeus	estorninho-grande-d'orelha-azul

Lamprotornis chloropterus	estorninho-pequeno-d'orelha-azul
Lamprotornis chalcurus	estorninho-de-cauda-bronzeada
Lamprotornis splendidus	estorninho-esplêndido
Lamprotornis ornatus	estorninho-do-príncipe
Lamprotornis iris	estorninho-esmeraldino
Lamprotornis purpureus	estorninho-purpúreo
Lamprotornis purpuroptera	estorninho-de-rüppell
Lamprotornis caudatus	estorninho-rabilongo
Lamprotornis regius	estorninho-de-peito-amarelo
Lamprotornis mevesii	estorninho-de-meves
Lamprotornis australis	estorninho-de-burchell
Lamprotornis acuticaudus	estorninho-de-cauda-afilada
Lamprotornis superbus	estorninho-soberbo
Lamprotornis hildebrandti	estorninho-de-hildebrandt
Lamprotornis shelleyi	estorninho-de-shelley
Lamprotornis pulcher	estorninho-de-barriga-ruiva
Lamprotornis unicolor	estorninho-cinzento
Lamprotornis fischeri	estorninho-de-fischer
Lamprotornis bicolor	estorninho-bicolor
Lamprotornis albicapillus	estorninho-de-coroa-branca
Hartlaubius auratus	estorninho-malgaxe
Cinnyricinclus leucogaster	estorninho-ametista
Onychognathus morio	estorninho-d'asa-ruiva
Onychognathus tenuirostris	estorninho-de-bico-fino
Onychognathus fulgidus	estorninho-d'asa-canela
Onychognathus walleri	estorninho-de-waller
Onychognathus blythii	estorninho-somali
Onychognathus frater	estorninho-de-socotra
Onychognathus tristramii	estorninho-de-tristram
Onychognathus nabouroup	estorninho-d'asa-pálida
Onychognathus salvadorii	estorninho-coroado
Onychognathus albirostris	estorninho-de-bico-branco
Onychognathus neumanni	estorninho-de-neumann
Poeoptera stuhlmanni	estorninho-de-stuhlmann
Poeoptera kenricki	estorninho-de-kenrick
Poeoptera lugubris	estorninho-de-cauda-fina
Pholia sharpii	estorninho-de-sharpe
Arizelopsar femoralis	estorninho-de-abbott
Grafisia torquata	estorninho-de-colar
Speculipastor bicolor	estorninho-pega
Neocichla gutturalis	estorninho-d'asa-branca
Rhabdornis mystacalis	trepadeira-de-cabeça-riscada
Rhabdornis inornatus	trepadeira-de-peito-riscado
Rhabdornis rabori	trepadeira-das-vissaias
Rhabdornis grandis	trepadeira-grande

Buphagidae — Pica-bois

Estas curiosas aves, aparentadas aos estorninhos, devem o seu nome ao hábito de pousarem em mamíferos de grande porte, tanto domésticos como selvagens, incluindo bovinos, zebras, impalas, rinocerontes, hipopótamos e girafas. Alimentam-se de pequenos insectos, carraças, larvas e outros parasitas, mas também podem consumir o sangue dos animais onde pousaram. O nome genérico *Buphagus* deriva do grego e significa "que come o boi".

Espécies: 2

Distribuição: África subsariana

Buphagus africanus	pica-boi-de-bico-amarelo
Buphagus erythrorynchа	pica-boi-de-bico-vermelho

Turdidae Tordos, Melros e afins

Estas aves podem ser encontradas em quase todos os cantos do mundo, saltitando pelo solo de bosques, matos, prados e jardins urbanos. Para além dos tordos, incluem-se aqui os solitários dos trópicos, os azulinhos da América do Norte ou a belíssima grandala dos Himalaias. A dieta dos turdídeos é essencialmente insectívora, mas as espécies de latitudes nortenhas consomem bagas no Inverno. São, em termos gerais, aves possantes, de patas fortes e cauda razoavelmente comprida. Cerca de um quarto das espécies tem um estatuto de conservação desfavorável.

Espécies: 195

Distribuição: cosmopolita, excepto Antárctida

Grandala coelicolor	grandala
Sialia currucoides	azulejo-montês
Sialia mexicana	azulejo-ocidental
Sialia sialis	azulejo-oriental
Stizorhina finschi	tordo-de-finsch
Stizorhina fraseri	tordo-de-fraser
Neocossyphus poensis	tordo-de-fernando-pó
Neocossyphus rufus	tordo-de-cauda-ruiva
Pinarornis plumosus	chasco-das-rochas
Myadestes occidentalis	solitário-de-dorso-castanho
Myadestes unicolor	solitário-unicolor
Myadestes townsendi	solitário-nortenho
Myadestes myadestinus	solitário-kamao
Myadestes woahensis	solitário-amaui
Myadestes lanaiensis	solitário-olomao
Myadestes obscurus	solitário-omao
Myadestes palmeri	solitário-puaiohi
Myadestes elisabeth	solitário-cubano
Myadestes genibarbis	solitário-de-garganta-ruiva
Myadestes melanops	solitário-de-faces-pretas
Myadestes coloratus	solitário-variado
Myadestes ralloides	solitário-andino
Chlamydochaera jefferyi	cochoa-do-bornéu
Cochoa purpurea	cochoa-púrpura
Cochoa viridis	cochoa-verde
Cochoa beccarii	cochoa-de-samatra
Cochoa azurea	cochoa-javanesa
Ixoreus naevius	tordo-variegado
Ridgwayia pinicola	tordo-asteca
Cichlopsis leucogenys	solitário-ruivo
Entomodestes coracinus	solitário-preto
Entomodestes leucotis	solitário-d'orelhas-brancas

Hylocichla mustelina	tordo-dos-bosques
Catharus dryas	tordo-de-peito-dourado
Catharus maculatus	tordo-maculado
Catharus aurantiirostris	tordo-de-bico-laranja
Catharus mexicanus	tordo-de-barrete-preto
Catharus fuscater	tordo-de-dorso-sombrio
Catharus ustulatus	tordo-de-swainson
Catharus gracilirostris	tordo-de-talamanca
Catharus guttatus	tordo-eremita
Catharus occidentalis	tordo-de-bico-pardo
Catharus frantzii	tordo-de-coroa-ruiva
Catharus minimus	tordo-de-faces-cinzentas
Catharus bicknelli	tordo-de-bicknell
Catharus fuscescens	tordo-fulvo
Zoothera dixoni	tordo-rabilongo
Zoothera mollissima	tordo-alpino
Zoothera salimalii	tordo-dos-himalaias
Zoothera griseiceps	tordo-do-sujuão
Zoothera monticola	tordo-de-bico-comprido
Zoothera heinrichi	tordo-de-celebes
Zoothera marginata	tordo-orlado
Zoothera everetti	tordo-do-bornéu
Zoothera andromedae	tordo-das-sundas
Zoothera aurea	tordo-dourado
Zoothera dauma	tordo-escamoso
Zoothera neilgherriensis	tordo-dos-nilgiris
Zoothera imbricata	tordo-cingalês
Zoothera major	tordo-das-amami
Zoothera terrestris	tordo-das-bonin
Zoothera turipavae	tordo-de-guadalcanal
Zoothera margaretae	tordo-de-makira
Zoothera heinei	tordo-de-heine
Zoothera machiki	tordo-das-tanimbar
Zoothera lunulata	tordo-lunulado
Zoothera talaseae	tordo-da-nova-bretanha
Zoothera atrigena	tordo-de-faces-pretas
Geokichla sibirica	tordo-siberiano
Geokichla wardii	tordo-alvinegro
Geokichla princei	tordo-ganês
Geokichla camaronensis	tordo-camaronês
Geokichla guttata	tordo-malhado
Geokichla spiloptera	tordo-d'asa-perlada
Geokichla crossleyi	tordo-de-crossley
Geokichla piaggiae	tordo-de-piaggia
Geokichla oberlaenderi	tordo-de-oberlaender
Geokichla gurneyi	tordo-de-gurney
Geokichla citrina	tordo-citrino
Geokichla dumasi	tordo-de-buru

Geokichla joiceyi	tordo-de-ceram
Geokichla peronii	tordo-timorense
Geokichla schistacea	tordo-d'orelha-branca
Geokichla interpres	tordo-de-touca
Geokichla leucolaema	tordo-de-engano
Geokichla dohertyi	tordo-das-pequenas-sundas
Geokichla cinerea	tordo-cinzento
Geokichla erythronota	tordo-de-dorso-ferrugíneo
Geokichla mendeni	tordo-de-peleng
Turdus simensis	tordo-etíope
Turdus litsitsirupa	tordo-litsitsirupa
Turdus mupinensis	tordo-chinês
Turdus philomelos	tordo-músico
Turdus viscivorus	tordoveia
Turdus pelios	tordo-africano
Turdus xanthorhynchus	tordo-do-príncipe
Turdus olivaceofuscus	tordo-de-são-tomé
Turdus abyssinicus	tordo-abissínio
Turdus helleri	tordo-dos-taita
Turdus roehli	tordo-das-usambara
Turdus olivaceus	tordo-oliváceo
Turdus libonyana	tordo-chicharrio
Turdus bewsheri	tordo-das-comores
Turdus tephronotus	tordo-oculado
Turdus smithi	tordo-do-karoo
Turdus ludoviciae	tordo-somali
Turdus mandarinus	melro-chinês
Turdus iliacus	tordo-ruivo
Turdus merula	melro-preto
Turdus menachensis	tordo-iemenita
Turdus niveiceps	tordo-da-formosa
Turdus boulboul	melro-d'asa-cinzenta
Turdus simillimus	melro-indiano
Turdus unicolor	tordo-unicolor
Turdus dissimilis	tordo-de-peito-preto
Turdus cardis	tordo-japonês
Turdus hortulorum	tordo-de-dorso-cinzento
Turdus obscurus	tordo-de-cabeça-cinzenta
Turdus pallidus	tordo-pálido
Turdus feae	tordo-de-fea
Turdus chrysolaus	tordo-de-cabeça-parda
Turdus celaenops	tordo-das-izu
Turdus mindorensis	tordo-de-mindoro
Turdus thomassoni	tordo-de-lução
Turdus nigrorum	tordo-de-mindanau
Turdus schlegelii	tordo-do-mutis
Turdus erythropleurus	tordo-da-ilha-de-natal
Turdus javanicus	tordo-javanês

Turdus deningeri	tordo-das-molucas
Turdus papuensis	tordo-da-papua
Turdus heinrothi	tordo-das-bismarck
Turdus bougainvillei	tordo-de-bougainville
Turdus kulambangrae	tordo-das-salomão
Turdus vanikorensis	tordo-de-vanikoro
Turdus pritzbueri	tordo-de-cabeça-branca
Turdus xanthopus	tordo-da-nova-caledónia
Turdus poliocephalus	tordo-do-mar-de-tasman
Turdus samoensis	tordo-de-samoa
Turdus ruficeps	tordo-das-fiji
Turdus maximus	melro-dos-himalaias
Turdus kessleri	tordo-de-dorso-branco
Turdus pilaris	tordo-zornal
Turdus torquatus	melro-de-colar
Turdus atrogularis	tordo-de-garganta-preta
Turdus ruficollis	tordo-de-garganta-ruiva
Turdus eunomus	tordo-d'asa-ruiva
Turdus naumanni	tordo-de-naumann
Turdus rubrocanus	tordo-castanho
Turdus albocinctus	tordo-anelado
Turdus turdoides	tordo-montês-de-celebes
Turdus migratorius	tordo-americano
Turdus infuscatus	melro-guatemalteco
Turdus rufitorques	tordo-de-colar-ruivo
Turdus nigrescens	melro-fuliginoso
Turdus plumbeus	tordo-de-patas-vermelhas
Turdus ardosiaceus	tordo-das-grandes-antilhas
Turdus ravidus	tordo-da-grande-caimão
Turdus aurantius	tordo-de-queixo-branco
Turdus lherminieri	tordo-das-pequenas-antilhas
Turdus plebejus	tordo-montês-americano
Turdus leucops	tordo-d'olho-pálido
Turdus jamaicensis	tordo-jamaicano
Turdus swalesi	tordo-dominicano
Turdus fulviventris	tordo-de-barriga-castanha
Turdus reevei	tordo-de-dorso-plúmbeo
Turdus chiguanco	melro-chiguanco
Turdus nigriceps	tordo-ferreiro-andino
Turdus serranus	melro-serrano
Turdus olivater	tordo-de-cabeça-preta
Turdus fuscater	melro-grande
Turdus falcklandii	tordo-austral
Turdus lawrencii	tordo-imitador
Turdus murinus	tordo-dos-tepuis
Turdus subalaris	tordo-ferreiro-oriental
Turdus amaurochalinus	tordo-de-peito-creme
Turdus eremita	tordo-de-tristão-da-cunha

Turdus maranonicus	tordo-do-maranhão
Turdus ignobilis	tordo-de-bico-preto
Turdus arthuri	tordo-da-campina
Turdus flavipes	tordo-de-patas-amarelas
Turdus assimilis	tordo-de-garganta-branca
Turdus daguae	tordo-do-dagua
Turdus phaeopygus	tordo-de-flancos-cinzentos
Turdus albicollis	tordo-de-pescoço-branco
Turdus rufopalliatus	tordo-de-dorso-ruivo
Turdus obsoletus	tordo-pardo
Turdus leucomelas	tordo-de-peito-pálido
Turdus fumigatus	tordo-do-cacau
Turdus hauxwelli	tordo-de-hauxwell
Turdus rufiventris	tordo-de-barriga-ruiva
Turdus grayi	tordo-argiloso
Turdus nudigenis	tordo-de-lunetas
Turdus maculirostris	tordo-equatoriano
Turdus sanchezorum	tordo-da-várzea
Turdus haplochrous	tordo-boliviano

Muscicapidae Papa-moscas, Chascos e afins

Esta família é uma das mais numerosas e alberga muitas espécies que no passado estavam classificadas noutras famílias, como piscos, chascos, cartaxos e rouxinóis. São aves de pequena dimensão e a sua plumagem é variável, predominando os tons pretos, castanhos e ruivos. Aparecem em todo o tipo de habitats, incluindo tundra e desertos, e são sobretudo insectívoras. Muitas são migradoras e merece aqui referência o caso do chasco-cinzento, que tem populações que nidificam na América do Norte mas vão invernar em África.

Espécies: 356

Distribuição: Europa, África e Ásia, com presença sazonal na região neárctica na época dos ninhos

Alethe diademata	pisco-diademado
Alethe castanea	pisco-castanho
Tychaedon coryphoeus	rouxinol-do-karoo
Tychaedon signata	rouxinol-castanho
Tychaedon leucosticta	rouxinol-da-floresta
Tychaedon quadrivirgata	rouxinol-de-bigodes
Tychaedon barbata	rouxinol-do-miombo
Cercotrichas paena	rouxinol-do-kalahari
Cercotrichas podobe	rouxinol-preto
Cercotrichas galactotes	rouxinol-do-mato
Cercotrichas hartlaubi	rouxinol-de-dorso-castanho
Cercotrichas leucophrys	rouxinol-de-dorso-ruivo
Copsychus saularis	shama-oriental
Copsychus sechellarum	shama-das-seicheles
Copsychus mindanensis	shama-filipino
Copsychus albospecularis	shama-malgaxe
Copsychus pyrropygus	shama-de-cauda-ruiva
Copsychus fulicatus	shama-indiano
Copsychus luzoniensis	shama-de-lução
Copsychus superciliaris	shama-das-vissaias
Copsychus niger	shama-de-palawan
Copsychus cebuensis	shama-preto
Copsychus albiventris	shama-das-andamão
Copsychus omissus	shama-javanês
Copsychus stricklandii	shama-de-coroa-branca
Copsychus barbouri	shama-de-maratua
Copsychus nigricauda	shama-das-kangean
Copsychus leggei	shama-cingalês
Copsychus malabaricus	shama-malabar
Agricola pallidus	papa-moscas-pálido
Agricola infuscatus	papa-moscas-chasco

Fraseria cinerascens	papa-moscas-de-sobrancelha-branca
Fraseria ocreata	papa-moscas-florestal
Fraseria griseigularis	papa-moscas-de-garganta-cinzenta
Fraseria plumbea	papa-moscas-de-leque
Fraseria olivascens	papa-moscas-oliváceo
Fraseria lendu	papa-moscas-de-chapin
Fraseria caerulescens	papa-moscas-azulado
Fraseria tessmanni	papa-moscas-de-tessmann
Melaenornis brunneus	papa-moscas-angolano
Melaenornis fischeri	papa-moscas-d'olho-branco
Melaenornis chocolatinus	papa-moscas-chocolate
Melaenornis annamarulae	papa-moscas-liberiano
Melaenornis ardesiacus	papa-moscas-d'olho-amarelo
Melaenornis edolioides	papa-moscas-drongo
Melaenornis pammelaina	papa-moscas-sul-africano
Namibornis herero	chasco-herero
Empidornis semipartitus	papa-moscas-prateado
Sigelus silens	papa-moscas-fiscal
Bradornis comitatus	papa-moscas-ardósia
Bradornis microrhynchus	papa-moscas-de-bico-curto
Bradornis mariquensis	papa-moscas-do-marico
Myopornis boehmi	papa-moscas-de-böhm
Artomyias ussheri	papa-moscas-de-ussher
Artomyias fuliginosa	papa-moscas-fuliginoso
Humblotia flavirostris	papa-moscas-das-comores
Muscicapa griseisticta	papa-moscas-estriado
Muscicapa sibirica	papa-moscas-siberiano
Muscicapa ferruginea	papa-moscas-ferrugíneo
Muscicapa muttui	papa-moscas-de-muttu
Muscicapa randi	papa-moscas-de-rand
Muscicapa segregata	papa-moscas-de-sumba
Muscicapa dauurica	papa-moscas-castanho
Muscicapa williamsoni	papa-moscas-de-williamson
Muscicapa sodhii	papa-moscas-de-celebes
Muscicapa sethsmithi	papa-moscas-de-patas-amarelas
Muscicapa epulata	papa-moscas-anão
Muscicapa adusta	papa-moscas-sombrio
Muscicapa striata	papa-moscas-cinzento
Muscicapa tyrrhenica	papa-moscas-mediterrânico
Muscicapa gambagae	papa-moscas-de-gambaga
Muscicapa cassini	papa-moscas-de-cassin
Muscicapa aquatica	papa-moscas-dos-pauis
Leucoptilon concretum	papa-moscas-de-cauda-branca
Sholicola major	pisco-dos-nilgiris
Sholicola albiventris	pisco-dos-gates
Niltava davidi	papa-moscas-de-fuquiém
Niltava sundara	papa-moscas-de-barriga-ruiva
Niltava sumatrana	papa-moscas-de-samatra

Niltava oatesi	papa-moscas-de-oates
Niltava vivida	papa-moscas-da-formosa
Niltava macgrigoriae	papa-moscas-de-mcgrigor
Niltava grandis	papa-moscas-grande
Cyanoptila cyanomelana	papa-moscas-azul
Cyanoptila cumatilis	papa-moscas-de-zappey
Eumyias albicaudatus	papa-moscas-dos-nilgiris
Eumyias indigo	papa-moscas-índigo
Eumyias thalassinus	papa-moscas-verdete
Eumyias additus	papa-moscas-de-buru
Eumyias panayensis	papa-moscas-turquesa
Eumyias sanfordi	papa-moscas-de-minahasa
Eumyias hoevelli	papa-moscas-de-tiara-azul
Eumyias hyacinthinus	papa-moscas-jacintino
Eumyias oscillans	papa-moscas-das-flores
Eumyias stresemanni	papa-moscas-de-stresemann
Eumyias sordidus	papa-moscas-cingalês
Anthipes monileger	papa-moscas-de-colarinho
Anthipes solitaris	papa-moscas-de-sobrancelha-ruiva
Cyornis unicolor	papa-moscas-unicolor
Cyornis glaucicomans	papa-moscas-chinês
Cyornis rubeculoides	papa-moscas-de-garganta-azul
Cyornis hainanus	papa-moscas-de-ainão
Cyornis superbus	papa-moscas-do-bornéu
Cyornis turcosus	papa-moscas-malaio
Cyornis lemprieri	papa-moscas-de-balabac
Cyornis caerulatus	papa-moscas-de-bico-comprido
Cyornis herioti	papa-moscas-de-peito-azul
Cyornis camarinensis	papa-moscas-das-camarines
Cyornis ruficauda	papa-moscas-filipino
Cyornis ocularis	papa-moscas-de-sulu
Cyornis ruficrissa	papa-moscas-do-kinabalu
Cyornis pallidipes	papa-moscas-de-barriga-branca
Cyornis brunneatus	papa-moscas-de-peito-pardo
Cyornis nicobaricus	papa-moscas-de-nicobar
Cyornis umbratilis	papa-moscas-de-peito-cinzento
Cyornis magnirostris	papa-moscas-de-bico-grosso
Cyornis tickelliae	papa-moscas-de-tickell
Cyornis sumatrensis	papa-moscas-indochinês
Cyornis whitei	papa-moscas-das-colinas
Cyornis rufigastra	papa-moscas-dos-mangais
Cyornis omissus	papa-moscas-omisso
Cyornis kalaoensis	papa-moscas-de-kalao
Cyornis banyumas	papa-moscas-javanês
Cyornis montanus	papa-moscas-dayak
Cyornis kadayangensis	papa-moscas-das-meratus
Cyornis poliogenys	papa-moscas-de-brooks
Cyornis olivaceus	papa-moscas-de-dorso-oliváceo

Cyornis pelingensis	papa-moscas-de-peleng
Cyornis colonus	papa-moscas-de-sula
Cyornis ruckii	papa-moscas-de-medan
Erithacus rubecula	pisco-de-peito-ruivo
Swynnertonia swynnertoni	pisco-de-peitilho
Pogonocichla stellata	pisco-estrelado
Stiphrornis erythrothorax	pisco-da-floresta
Stiphrornis xanthogaster	pisco-de-peito-amarelo
Stiphrornis pyrrholaemus	pisco-de-dorso-oliváceo
Cossyphicula roberti	pisco-de-barriga-branca
Cossyphicula isabellae	pisco-montês
Chamaetylas poliophrys	pisco-de-garganta-ruiva
Chamaetylas poliocephala	pisco-de-peito-castanho
Chamaetylas fuelleborni	pisco-de-peito-branco
Chamaetylas choloensis	pisco-do-cholo
Cossypha albicapillus	pisco-de-coroa-branca
Cossypha heuglini	pisco-de-heuglin
Cossypha dichroa	pisco-de-cabeça-preta
Cossypha semirufa	pisco-de-rüppell
Cossypha niveicapilla	pisco-de-coroa-nivosa
Cossypha natalensis	pisco-de-barrete-ruivo
Cossypha heinrichi	pisco-de-cabeça-branca
Cossypha cyanocampter	pisco-d'ombros-azuis
Cichladusa arquata	tordo-das-palmeiras-de-colar
Cichladusa ruficauda	tordo-das-palmeiras-rabirruivo
Cichladusa guttata	tordo-das-palmeiras-malhado
Xenocopsychus ansorgei	pisco-das-grutas
Dessonornis humeralis	pisco-d'ombros-brancos
Dessonornis caffer	pisco-do-cabo
Dessonornis archeri	pisco-de-archer
Dessonornis anomalus	pisco-de-flancos-esverdeados
Sheppardia montana	pisco-das-usambara
Sheppardia lowei	pisco-de-iringa
Sheppardia aurantiithorax	pisco-das-rubeho
Sheppardia gunningi	pisco-arisco
Sheppardia sharpei	pisco-de-sharpe
Sheppardia bocagei	pisco-de-bocage
Sheppardia poensis	pisco-de-cauda-curta
Sheppardia cyornithopsis	pisco-ocidental
Sheppardia aequatorialis	pisco-equatorial
Sheppardia gabela	pisco-da-gabela
Sheppardia polioptera	pisco-d'asa-cinzenta
Irania gutturalis	pisco-de-garganta-branca
Luscinia luscinia	rouxinol-oriental
Luscinia megarhynchos	rouxinol-comum
Luscinia svecica	pisco-de-peito-azul
Luscinia phaenicuroides	rouxinol-de-barriga-branca
Myiomela leucura	pisco-de-cauda-branca

Myiomela sumatrana	pisco-de-samatra
Myiomela diana	pisco-javanês
Calliope obscura	pisco-de-garganta-preta
Calliope pectardens	pisco-de-peito-ardente
Calliope calliope	pisco-de-garganta-vermelha
Calliope pectoralis	pisco-de-peito-preto
Calliope tschebaiewi	pisco-chinês
Enicurus scouleri	torrenteiro-pequeno
Enicurus immaculatus	torrenteiro-de-dorso-preto
Enicurus schistaceus	torrenteiro-de-dorso-cinzento
Enicurus maculatus	torrenteiro-malhado
Enicurus leschenaulti	torrenteiro-de-testa-branca
Enicurus borneensis	torrenteiro-do-bornéu
Enicurus ruficapillus	torrenteiro-de-barrete-ruivo
Enicurus velatus	torrenteiro-das-sundas
Cinclidium frontale	pisco-de-testa-azul
Myophonus insularis	tordo-assobiador-da-formosa
Myophonus melanurus	tordo-assobiador-brilhante
Myophonus castaneus	tordo-assobiador-castanho
Myophonus caeruleus	tordo-assobiador-azul
Myophonus glaucinus	tordo-assobiador-javanês
Myophonus borneensis	tordo-assobiador-do-bornéu
Myophonus robinsoni	tordo-assobiador-malaio
Myophonus horsfieldii	tordo-assobiador-indiano
Myophonus blighi	tordo-assobiador-cingalês
Heinrichia calligyna	asa-curta-grande
Vauriella gularis	papa-moscas-embridado
Vauriella albigularis	papa-moscas-de-negros
Vauriella insignis	papa-moscas-sublime
Vauriella goodfellowi	papa-moscas-de-mindanau
Leonardina woodi	tordina-de-mindanau
Brachypteryx cruralis	asa-curta-dos-himalaias
Brachypteryx sinensis	asa-curta-chinesa
Brachypteryx goodfellowi	asa-curta-da-formosa
Brachypteryx hyperythra	asa-curta-de-barriga-ruiva
Brachypteryx leucophris	asa-curta-pequena
Brachypteryx poliogyna	asa-curta-filipina
Brachypteryx erythrogyna	asa-curta-do-bornéu
Brachypteryx saturata	asa-curta-de-samatra
Brachypteryx montana	asa-curta-javanesa
Brachypteryx floris	asa-curta-das-flores
Larvivora cyane	pisco-azul
Larvivora brunnea	pisco-indiano
Larvivora akahige	pisco-japonês
Larvivora tanensis	pisco-das-izu
Larvivora komadori	pisco-das-ryukyu
Larvivora namiyei	pisco-de-okinawa
Larvivora sibilans	pisco-assobiador

Larvivora ruficeps	pisco-de-cabeça-ruiva
Ficedula zanthopygia	papa-moscas-d'uropígio-amarelo
Ficedula elisae	papa-moscas-de-dorso-verde
Ficedula narcissina	papa-moscas-narciso
Ficedula owstoni	papa-moscas-das-ryukyu
Ficedula tricolor	papa-moscas-tricolor
Ficedula hyperythra	papa-moscas-nevoso
Ficedula mugimaki	papa-moscas-mugimaki
Ficedula erithacus	papa-moscas-de-dorso-ardósia
Ficedula hodgsoni	papa-moscas-pigmeu
Ficedula strophiata	papa-moscas-de-babete
Ficedula sapphira	papa-moscas-safira
Ficedula superciliaris	papa-moscas-ultramarino
Ficedula westermanni	papa-moscas-alvinegro
Ficedula ruficauda	papa-moscas-de-cauda-ruiva
Ficedula subrubra	papa-moscas-de-caxemira
Ficedula parva	papa-moscas-pequeno
Ficedula albicilla	papa-moscas-da-taiga
Ficedula semitorquata	papa-moscas-de-meio-colar
Ficedula speculigera	papa-moscas-do-atlas
Ficedula hypoleuca	papa-moscas-preto
Ficedula albicollis	papa-moscas-de-colar
Ficedula nigrorufa	papa-moscas-dos-gates
Ficedula riedeli	papa-moscas-das-tanimbar
Ficedula dumetoria	papa-moscas-de-peito-ruivo
Ficedula disposita	papa-moscas-furtivo
Ficedula platenae	papa-moscas-de-palawan
Ficedula rufigula	papa-moscas-de-garganta-ruiva
Ficedula buruensis	papa-moscas-de-peito-laranja
Ficedula harterti	papa-moscas-de-hartert
Ficedula timorensis	papa-moscas-timorense
Ficedula basilanica	papa-moscas-de-basilan
Ficedula luzoniensis	papa-moscas-de-lução
Ficedula crypta	papa-moscas-críptico
Ficedula bonthaina	papa-moscas-do-lompobattang
Ficedula henrici	papa-moscas-de-damar
Tarsiger indicus	pisco-de-sobrancelha-branca
Tarsiger formosanus	pisco-da-formosa
Tarsiger chrysaeus	pisco-dourado
Tarsiger johnstoniae	pisco-de-colar
Tarsiger hyperythrus	pisco-de-peito-fulvo
Tarsiger cyanurus	pisco-de-flancos-ruivos
Tarsiger albocoeruleus	pisco-das-qilian
Tarsiger rufilatus	pisco-dos-himalaias
Heteroxenicus stellatus	asa-curta-estrelada
Phoenicurus erythronotus	rabirruivo-de-dorso-ruivo
Phoenicurus frontalis	rabirruivo-de-testa-azul
Phoenicurus coeruleocephala	rabirruivo-de-barrete-azul

Phoenicurus schisticeps	rabirruivo-de-garganta-branca
Phoenicurus fuliginosus	rabirruivo-plúmbeo
Phoenicurus bicolor	rabirruivo-de-lução
Phoenicurus leucocephalus	rabirruivo-de-barrete-branco
Phoenicurus alaschanicus	rabirruivo-de-alashan
Phoenicurus ochruros	rabirruivo-preto
Phoenicurus phoenicurus	rabirruivo-de-testa-branca
Phoenicurus moussieri	rabirruivo-mourisco
Phoenicurus auroreus	rabirruivo-dáurico
Phoenicurus hodgsoni	rabirruivo-de-hodgson
Phoenicurus erythrogastrus	rabirruivo-d'asa-branca
Monticola cinclorhyncha	roqueiro-de-barrete-azul
Monticola gularis	roqueiro-de-garganta-branca
Monticola rufiventris	roqueiro-de-barriga-castanha
Monticola brevipes	roqueiro-de-dedos-curtos
Monticola explorator	roqueiro-sentinela
Monticola erythronotus	roqueiro-da-montanha-âmbar
Monticola sharpei	roqueiro-malgaxe
Monticola imerina	roqueiro-litoral
Monticola rufocinereus	roqueiro-pequeno
Monticola saxatilis	melro-das-rochas
Monticola solitarius	melro-azul
Monticola semirufus	roqueiro-abissínio
Monticola rupestris	roqueiro-do-cabo
Monticola angolensis	roqueiro-do-miombo
Saxicola jerdoni	cartaxo-alvinegro
Saxicola ferreus	cartaxo-cinzento
Saxicola rubetra	cartaxo-nortenho
Saxicola macrorhynchus	cartaxo-bicudo
Saxicola gutturalis	cartaxo-timorense
Saxicola caprata	cartaxo-preto
Saxicola insignis	cartaxo-mongol
Saxicola leucurus	cartaxo-de-cauda-branca
Saxicola stejnegeri	cartaxo-do-amur
Saxicola torquatus	cartaxo-africano
Saxicola tectes	cartaxo-da-reunião
Saxicola maurus	cartaxo-siberiano
Saxicola rubicola	cartaxo-comum
Saxicola dacotiae	cartaxo-das-canárias
Campicoloides bifasciatus	chasco-estriado
Emarginata schlegelii	chasco-do-karoo
Emarginata tractrac	chasco-pálido
Emarginata sinuata	chasco-asa-de-foice
Pinarochroa sordida	chasco-afroalpino
Thamnolaea cinnamomeiventris	chasco-imitador
Thamnolaea coronata	chasco-de-coroa-branca
Myrmecocichla aethiops	chasco-etíope
Myrmecocichla tholloni	chasco-congolês

Myrmecocichla formicivora	chasco-formigueiro
Myrmecocichla monticola	chasco-montês
Myrmecocichla nigra	chasco-escuro
Myrmecocichla melaena	chasco-de-rüppell
Myrmecocichla collaris	chasco-de-ruaha
Myrmecocichla arnotti	chasco-de-arnot
Oenanthe oenanthe	chasco-cinzento
Oenanthe seebohmi	chasco-do-atlas
Oenanthe pileata	chasco-de-barrete-preto
Oenanthe bottae	chasco-de-peito-ruivo
Oenanthe frenata	chasco-de-peito-ferrugíneo
Oenanthe isabellina	chasco-isabel
Oenanthe heuglinii	chasco-de-heuglin
Oenanthe monacha	chasco-de-capuz
Oenanthe deserti	chasco-do-deserto
Oenanthe hispanica	chasco-ruivo
Oenanthe pleschanka	chasco-bicolor
Oenanthe melanoleuca	chasco-do-levante
Oenanthe cypriaca	chasco-cipriota
Oenanthe albifrons	chasco-de-testa-branca
Oenanthe phillipsi	chasco-somali
Oenanthe moesta	chasco-de-barrete-cinzento
Oenanthe melanura	chasco-rabinegro
Oenanthe familiaris	chasco-familiar
Oenanthe scotocerca	chasco-de-cauda-castanha
Oenanthe dubia	chasco-sombrio
Oenanthe fusca	chasco-castanho
Oenanthe picata	chasco-variável
Oenanthe finschii	chasco-de-finsch
Oenanthe lugens	chasco-fúnebre
Oenanthe xanthoprymna	chasco-persa
Oenanthe chrysopygia	chasco-afegão
Oenanthe leucopyga	chasco-de-barrete-branco
Oenanthe albonigra	chasco-de-hume
Oenanthe leucura	chasco-preto
Oenanthe lugentoides	chasco-arábico
Oenanthe lugubris	chasco-abissínio

Cinclidae Melros-d'água

Os melros-d’água são os únicos passeriformes capazes de mergulhar e nadar. Estão intimamente associados a cursos de água corrente, frequentemente rochosos, onde capturam invertebrados aquáticos. Tendem a ocorrer em regiões montanhosas, mas no inverno podem descer até águas mais paradas nas terras baixas. Como adaptação ao seu estilo de vida, têm patas robustas e uma plumagem densa e impermeável.

Espécies: 5

Distribuição: oeste das Américas (a sul e a norte) e Eurásia

Cinclus cinclus	melro-d'água-europeu
Cinclus pallasii	melro-d'água-castanho
Cinclus mexicanus	melro-d'água-americano
Cinclus leucocephalus	melro-d'água-de-coroa-branca
Cinclus schulzii	melro-d'água-de-garganta-ruiva

Chloropseidae Verdinhos

Os verdinhos são aves do tamanho de um pardal e têm um nome bastante apto, com a sua plumagem da mesma cor que folhas jovens. Estando tão bem camuflados e passando toda a sua vida nas altas copas da floresta tropical, estas aves podem ser difíceis de avistar. São insectívoras, mas a sua língua está bem adaptada para obter néctar de flores e também comem frutos. Quatro das espécies encontram-se ameaçadas, devido à pressão da desflorestação e à captura ilegal para o comércio de aves exóticas.

Espécies: 12

Distribuição: Ásia tropical

Chloropsis flavipennis	verdinho-filipino
Chloropsis palawanensis	verdinho-de-garganta-amarela
Chloropsis sonnerati	verdinho-grande
Chloropsis cyanopogon	verdinho-pequeno
Chloropsis moluccensis	verdinho-d'asa-azul
Chloropsis cochinchinensis	verdinho-javanês
Chloropsis kinabaluensis	verdinho-do-bornéu
Chloropsis jerdoni	verdinho-de-jerdon
Chloropsis aurifrons	verdinho-de-testa-dourada
Chloropsis media	verdinho-de-samatra
Chloropsis hardwickii	verdinho-de-barriga-laranja
Chloropsis venusta	verdinho-de-face-azul

Dicaeidae Pica-flores

Estas aves não "picam" flores no mesmo sentido que os fura-flores do Novo Mundo (Thraupidae), mas consomem néctar e, acima de tudo, alimentam-se de frutos e bagas. Muitas comem bagas de viscos, que outras espécies frugívoras tendem a evitar. São pequenas, com cauda curta e com um bico relativamente curto e robusto, por vezes curvo. Frequentam a copa das árvores e as orlas de florestas, onde são gregárias e bastante vocais.

Espécies: 57

Distribuição: Ásia meridional, Austrália e Papua

Prionochilus maculatus	pica-flor-de-peito-amarelo
Prionochilus percussus	pica-flor-de-peito-carmesim
Prionochilus plateni	pica-flor-de-palawan
Prionochilus xanthopygius	pica-flor-d'uropígio-amarelo
Prionochilus thoracicus	pica-flor-de-peito-escarlate
Pachyglossa olivacea	pica-flor-oliváceo
Pachyglossa propria	pica-flor-de-bigodes
Pachyglossa chrysorrhea	pica-flor-de-peito-estriado
Pachyglossa melanozantha	pica-flor-de-barriga-amarela
Pachyglossa vincens	pica-flor-cingalês
Pachyglossa everetti	pica-flor-de-dorso-castanho
Pachyglossa agilis	pica-flor-de-bico-grosso
Dicaeum dayakorum	pica-flor-de-lunetas
Dicaeum annae	pica-flor-d'uropígio-dourado
Dicaeum aeruginosum	pica-flor-estriado
Dicaeum aureolimbatum	pica-flor-de-flancos-amarelos
Dicaeum nigrilore	pica-flor-de-mindanau
Dicaeum anthonyi	pica-flor-de-coroa-amarela
Dicaeum kampalili	pica-flor-de-coroa-flamejante
Dicaeum bicolor	pica-flor-bicolor
Dicaeum australe	pica-flor-filipino
Dicaeum haematostictum	pica-flor-de-colar-preto
Dicaeum retrocinctum	pica-flor-de-mindoro
Dicaeum quadricolor	pica-flor-de-cebu
Dicaeum trigonostigma	pica-flor-de-barriga-laranja
Dicaeum hypoleucum	pica-flor-de-barriga-branca
Dicaeum erythrorhynchos	pica-flor-de-bico-pálido
Dicaeum concolor	pica-flor-liso
Dicaeum minullum	pica-flor-simples
Dicaeum virescens	pica-flor-das-andamão
Dicaeum pygmaeum	pica-flor-pigmeu
Dicaeum nehrkorni	pica-flor-de-nehrkorn
Dicaeum erythrothorax	pica-flor-de-buru
Dicaeum schistaceiceps	pica-flor-de-halmaera

Dicaeum vulneratum	pica-flor-cinzento
Dicaeum pectorale	pica-flor-de-coroa-verde
Dicaeum geelvinkianum	pica-flor-de-barrete-vermelho
Dicaeum nitidum	pica-flor-das-luisíadas
Dicaeum eximium	pica-flor-das-bismarck
Dicaeum aeneum	pica-flor-das-salomão
Dicaeum tristrami	pica-flor-de-makira
Dicaeum igniferum	pica-flor-incandescente
Dicaeum maugei	pica-flor-de-peito-vermelho
Dicaeum keiense	pica-flor-das-kai
Dicaeum hirundinaceum	pica-flor-andorinha
Dicaeum celebicum	pica-flor-de-celebes
Dicaeum monticolum	pica-flor-do-bornéu
Dicaeum ignipectus	pica-flor-de-peito-flamejante
Dicaeum cambodianum	pica-flor-cambojano
Dicaeum beccarii	pica-flor-de-samatra
Dicaeum luzoniense	pica-flor-de-lução
Dicaeum sanguinolentum	pica-flor-sangrento
Dicaeum rhodopygiale	pica-flor-das-flores
Dicaeum wilhelminae	pica-flor-das-sundas
Dicaeum hanieli	pica-flor-timorense
Dicaeum cruentatum	pica-flor-de-dorso-vermelho
Dicaeum trochileum	pica-flor-de-cabeça-vermelha

Como o seu nome sugere, os beija-flores alimentam-se de néctar, que extraem directamente das flores com o seu bico longo. Desempenham por isso um papel importante como agentes polinizadores. No entanto, também capturam insectos. A maioria tem cores muito vivas e iridescências. Já os papa-aranhas são menos coloridos e, apesar do seu nome, também consomem néctar. A família tem uma distribuição vasta, sendo em África que se encontra a maior diversidade de espécies.

Espécies: 153

Distribuição: África subsariana, Egipto, Sul da Ásia, Papua, Norte da Austrália e algumas ilhas oceânicas

Chalcoparia singalensis	beija-flor-de-faces-rubi
Deleornis fraseri	beija-flor-de-fraser
Deleornis axillaris	beija-flor-de-cabeça-cinzenta
Anthreptes reichenowi	beija-flor-de-reichenow
Anthreptes anchietae	beija-flor-de-anchieta
Anthreptes simplex	beija-flor-simples
Anthreptes malacensis	beija-flor-de-garganta-castanha
Anthreptes griseigularis	beija-flor-de-garganta-cinzenta
Anthreptes rhodolaemus	beija-flor-de-garganta-vermelha
Anthreptes gabonicus	beija-flor-dos-mangais
Anthreptes longuemarei	beija-flor-violeta
Anthreptes orientalis	beija-flor-queniano
Anthreptes neglectus	beija-flor-das-uluguru
Anthreptes aurantius	beija-flor-de-cauda-violeta
Anthreptes seimundi	beija-flor-de-seimund
Anthreptes rectirostris	beija-flor-de-bico-direito
Anthreptes tephrolaemus	beija-flor-de-queixo-cinzento
Anthreptes rubritorques	beija-flor-de-colar-vermelho
Hedydipna collaris	beija-flor-de-colar-púrpura
Hedydipna platura	beija-flor-pigmeu
Hedydipna metallica	beija-flor-do-nilo
Hedydipna pallidigaster	beija-flor-de-amani
Anabathmis reichenbachii	beija-flor-de-reichenbach
Anabathmis hartlaubii	beija-flor-do-príncipe
Anabathmis newtonii	beija-flor-de-são-tomé
Dreptes thomensis	beija-flor-gigante
Anthobaphes violacea	beija-flor-de-peito-laranja
Cyanomitra verticalis	beija-flor-de-cabeça-verde
Cyanomitra bannermani	beija-flor-de-bannerman
Cyanomitra cyanolaema	beija-flor-de-garganta-azul
Cyanomitra oritis	beija-flor-camaronês
Cyanomitra alinae	beija-flor-de-cabeça-azul

Cyanomitra olivacea	beija-flor-oliváceo
Cyanomitra veroxii	beija-flor-cinzento
Chalcomitra adelberti	beija-flor-de-garganta-clara
Chalcomitra fuliginosa	beija-flor-fuliginoso
Chalcomitra rubescens	beija-flor-de-garganta-verde
Chalcomitra amethystina	beija-flor-ametista
Chalcomitra senegalensis	beija-flor-de-peito-escarlate
Chalcomitra hunteri	beija-flor-de-hunter
Chalcomitra balfouri	beija-flor-de-socotra
Leptocoma zeylonica	beija-flor-cingalês
Leptocoma minima	beija-flor-pequeno
Leptocoma sperata	beija-flor-de-garganta-púrpura
Leptocoma brasiliana	beija-flor-granate
Leptocoma aspasia	beija-flor-preto
Leptocoma calcostetha	beija-flor-de-peito-bronze
Nectarinia bocagii	beija-flor-de-bocage
Nectarinia purpureiventris	beija-flor-de-peito-púrpura
Nectarinia tacazze	beija-flor-do-tekezé
Nectarinia kilimensis	beija-flor-bronzeado
Nectarinia famosa	beija-flor-verde
Nectarinia johnstoni	beija-flor-de-johnston
Drepanorhynchus reichenowi	beija-flor-d'asa-dourada
Cinnyris chloropygius	beija-flor-de-barriga-verde
Cinnyris minullus	beija-flor-anão
Cinnyris manoensis	beija-flor-do-miombo
Cinnyris gertrudis	beija-flor-de-pinto
Cinnyris chalybeus	beija-flor-de-banda-fina
Cinnyris neergaardi	beija-flor-de-neergaard
Cinnyris stuhlmanni	beija-flor-de-stuhlmann
Cinnyris whytei	beija-flor-malauiano
Cinnyris prigoginei	beija-flor-de-prigogine
Cinnyris ludovicensis	beija-flor-das-montanhas
Cinnyris reichenowi	beija-flor-de-preuss
Cinnyris afer	beija-flor-de-dois-colares
Cinnyris regius	beija-flor-real
Cinnyris rockefelleri	beija-flor-de-rockefeller
Cinnyris mediocris	beija-flor-do-kilimanjaro
Cinnyris usambaricus	beija-flor-das-usambara
Cinnyris fuelleborni	beija-flor-de-fülleborn
Cinnyris moreaui	beija-flor-de-moreau
Cinnyris loveridgei	beija-flor-de-loveridge
Cinnyris pulchellus	beija-flor-rabilongo
Cinnyris melanogastrus	beija-flor-de-fischer
Cinnyris mariquensis	beija-flor-do-marico
Cinnyris shelleyi	beija-flor-de-shelley
Cinnyris congensis	beija-flor-congolês
Cinnyris erythrocercus	beija-flor-de-peito-vermelho
Cinnyris nectarinioides	beija-flor-de-barriga-preta

Cinnyris bifasciatus	beija-flor-de-duas-bandas
Cinnyris tsavoensis	beija-flor-do-tsavo
Cinnyris chalcomelas	beija-flor-de-peito-violeta
Cinnyris pembae	beija-flor-de-pemba
Cinnyris bouvieri	beija-flor-de-bouvier
Cinnyris osea	beija-flor-da-palestina
Cinnyris hellmayri	beija-flor-árabe
Cinnyris habessinicus	beija-flor-brilhante
Cinnyris coccinigastrus	beija-flor-esplêndido
Cinnyris johannae	beija-flor-de-johanna
Cinnyris superbus	beija-flor-soberbo
Cinnyris rufipennis	beija-flor-d'asa-ruiva
Cinnyris oustaleti	beija-flor-de-oustalet
Cinnyris talatala	beija-flor-de-barriga-branca
Cinnyris venustus	beija-flor-de-barriga-amarela
Cinnyris fuscus	beija-flor-sombrio
Cinnyris ursulae	beija-flor-de-úrsula
Cinnyris batesi	beija-flor-de-bates
Cinnyris cupreus	beija-flor-cobreado
Cinnyris asiaticus	beija-flor-púrpura
Cinnyris ornatus	beija-flor-ornado
Cinnyris jugularis	beija-flor-de-dorso-verde
Cinnyris aurora	beija-flor-de-palawan
Cinnyris frenatus	beija-flor-de-freio
Cinnyris infrenatus	beija-flor-das-tukangbesi
Cinnyris teysmanni	beija-flor-das-flores
Cinnyris clementiae	beija-flor-de-clémence
Cinnyris idenburgi	beija-flor-do-mamberamo
Cinnyris buettikoferi	beija-flor-de-sumba
Cinnyris solaris	beija-flor-timorense
Cinnyris sovimanga	beija-flor-malgaxe
Cinnyris abbotti	beija-flor-de-abbott
Cinnyris notatus	beija-flor-de-bico-comprido
Cinnyris dussumieri	beija-flor-das-seicheles
Cinnyris humbloti	beija-flor-de-humblot
Cinnyris comorensis	beija-flor-de-anjouan
Cinnyris coquerellii	beija-flor-de-maiote
Cinnyris lotenius	beija-flor-de-loten
Aethopyga primigenia	beija-flor-de-capuz-cinzento
Aethopyga boltoni	beija-flor-de-bolton
Aethopyga tibolii	beija-flor-tboli
Aethopyga linaraborae	beija-flor-de-lina
Aethopyga flagrans	beija-flor-flamejante
Aethopyga guimarasensis	beija-flor-de-guimarás
Aethopyga pulcherrima	beija-flor-d'asa-metálica
Aethopyga duyvenbodei	beija-flor-elegante
Aethopyga shelleyi	beija-flor-filipino
Aethopyga bella	beija-flor-formoso

Aethopyga gouldiae	beija-flor-de-gould
Aethopyga nipalensis	beija-flor-de-cauda-verde
Aethopyga eximia	beija-flor-de-flancos-brancos
Aethopyga christinae	beija-flor-de-cauda-forcada
Aethopyga saturata	beija-flor-de-garganta-preta
Aethopyga siparaja	beija-flor-carmesim
Aethopyga magnifica	beija-flor-magnífico
Aethopyga vigorsii	beija-flor-de-vigors
Aethopyga mystacalis	beija-flor-javanês
Aethopyga temminckii	beija-flor-de-temminck
Aethopyga ignicauda	beija-flor-cauda-de-fogo
Kurochkinegramma hypogrammicum	papa-aranhas-de-nuca-púrpura
Arachnothera longirostra	papa-aranhas-pequeno
Arachnothera flammifera	papa-aranhas-filipino
Arachnothera dilutior	papa-aranhas-pálido
Arachnothera crassirostris	papa-aranhas-de-bico-grosso
Arachnothera robusta	papa-aranhas-de-bico-longo
Arachnothera flavigaster	papa-aranhas-de-lunetas
Arachnothera chrysogenys	papa-aranhas-de-faces-amarelas
Arachnothera clarae	papa-aranhas-calvo
Arachnothera modesta	papa-aranhas-modesto
Arachnothera affinis	papa-aranhas-de-peito-estriado
Arachnothera everetti	papa-aranhas-do-bornéu
Arachnothera magna	papa-aranhas-estriado
Arachnothera juliae	papa-aranhas-de-whitehead

Encontramos aqui várias aves granívoras bem conhecidas das pessoas em geral: os pardais. De facto estas aves, em especial as do género *Passer*, aparecem muitas vezes junto a habitações humanas, o que as torna bastante familiares. No entanto, outros membros da família preferem meios menos humanizados – por exemplo, os pardais do mato *Gymnoris* spp. frequentam matos ou savanas e os pardais das neves *Montifringilla* spp. habitam zonas montanhosas.

Espécies: 43

Distribuição: Eurásia e África

Hypocryptadius cinnamomeus	pardal-canela
Carpospiza brachydactyla	pardal-pálido
Petronia petronia	pardal-francês
Onychostruthus taczanowskii	pardal-d'uropígio-branco
Montifringilla henrici	pardal-do-tibete
Montifringilla nivalis	pardal-das-neves
Montifringilla adamsi	pardal-d'asa-preta
Pyrgilauda theresae	pardal-afegão
Pyrgilauda ruficollis	pardal-de-pescoço-ruivo
Pyrgilauda davidiana	pardal-de-david
Pyrgilauda blanfordi	pardal-de-blanford
Gymnoris pyrgita	pardal-pardo
Gymnoris superciliaris	pardal-de-sobrancelha
Gymnoris dentata	pardal-do-mato
Gymnoris xanthocollis	pardal-de-garganta-amarela
Passer melanurus	pardal-do-cabo
Passer eminibey	pardal-castanho
Passer cordofanicus	pardal-do-cordofão
Passer shelleyi	pardal-de-shelley
Passer rufocinctus	pardal-queniano
Passer motitensis	pardal-grande
Passer griseus	pardal-de-cabeça-cinzenta
Passer swainsonii	pardal-de-swainson
Passer suahelicus	pardal-suaíli
Passer gongonensis	pardal-bico-de-papagaio
Passer diffusus	pardal-sul-africano
Passer pyrrhonotus	pardal-do-sinde
Passer cinnamomeus	pardal-rutilante
Passer montanus	pardal-montês
Passer ammodendri	pardal-dos-amodendros
Passer flaveolus	pardal-de-dorso-liso
Passer hemileucus	pardal-de-abdalcuria
Passer insularis	pardal-de-socotra

Passer hispaniolensis	pardal-espanhol
Passer italiae	pardal-italiano
Passer domesticus	pardal-comum
Passer castanopterus	pardal-somali
Passer iagoensis	pardal-de-cabo-verde
Passer simplex	pardal-do-deserto
Passer zarudnyi	pardal-turcomeno
Passer euchlorus	pardal-árabe
Passer luteus	pardal-dourado
Passer moabiticus	pardal-do-mar-morto

Ploceidae Tecelões, Bispos e afins

Com um bico grosso e, em muitos casos, com plumagens dominadas por amarelo ou vermelho vivo, os tecelões devem o seu nome à habilidade com que conseguem tecer ninhos fechados muito elaborados, usando ervas, caniços ou ramos. Algumas espécies são coloniais, podendo formar colónias muito numerosas. Merece referência o caso dos tecelões-sociáveis, que constroem verdadeiros 'blocos de apartamentos', onde várias centenas de ninhos são agregados numa estrutura comum, com entradas individuais.

Espécies: 122

Distribuição: América do Sul e Central, África subsariana

Bubalornis albirostris	tecelão-de-bico-branco
Bubalornis niger	tecelão-de-bico-vermelho
Dinemellia dinemelli	tecelão-de-cabeça-branca
Plocepasser mahali	tecelão-de-sobrancelha-branca
Plocepasser superciliosus	tecelão-de-coroa-castanha
Plocepasser donaldsoni	tecelão-de-coroa-escamosa
Plocepasser rufoscapulatus	tecelão-de-dorso-ruivo
Histurgops ruficauda	tecelão-rabirruivo
Pseudonigrita arnaudi	tecelão-de-barrete-cinzento
Pseudonigrita cabanisi	tecelão-de-barrete-preto
Philetairus socius	tecelão-sociável
Sporopipes squamifrons	tecelão-escamoso
Sporopipes frontalis	tecelão-frontal
Amblyospiza albifrons	tecelão-de-bico-grosso
Ploceus baglafecht	tecelão-baglafecht
Ploceus bannermani	tecelão-de-bannerman
Ploceus batesi	tecelão-de-cabeça-castanha
Ploceus nigrimentus	tecelão-de-queixo-preto
Ploceus bertrandi	tecelão-malauiano
Ploceus pelzelni	tecelão-de-bico-fino
Ploceus subpersonatus	tecelão-de-loango
Ploceus luteolus	tecelão-pequeno
Ploceus ocularis	tecelão-de-lunetas
Ploceus brachypterus	tecelão-de-nuca-olivácea
Ploceus nigricollis	tecelão-de-pescoço-preto
Ploceus alienus	tecelão-estranho
Ploceus melanogaster	tecelão-de-barriga-preta
Ploceus capensis	tecelão-do-cabo
Ploceus temporalis	tecelão-de-bocage
Ploceus subaureus	tecelão-amarelo
Ploceus xanthops	tecelão-dourado-africano
Ploceus aurantius	tecelão-laranja
Ploceus heuglini	tecelão-de-heuglin

Ploceus bojeri	tecelão-das-palmeiras
Ploceus castaneiceps	tecelão-de-taveta
Ploceus princeps	tecelão-do-príncipe
Ploceus castanops	tecelão-de-garganta-preta
Ploceus xanthopterus	tecelão-de-garganta-castanha
Ploceus holoxanthus	tecelão-de-ruvu
Ploceus burnieri	tecelão-de-kilombero
Ploceus galbula	tecelão-de-rüppell
Ploceus taeniopterus	tecelão-do-nilo
Ploceus intermedius	tecelão-intermédio
Ploceus velatus	tecelão-mascarado
Ploceus katangae	tecelão-de-katanga
Ploceus ruweti	tecelão-de-lufira
Ploceus reichardi	tecelão-de-tanganica
Ploceus vitellinus	tecelão-vitelino
Ploceus spekei	tecelão-de-speke
Ploceus spekeoides	tecelão-de-fox
Ploceus cucullatus	tecelão-de-dorso-malhado
Ploceus grandis	tecelão-gigante
Ploceus castaneofuscus	tecelão-castanho-e-preto
Ploceus nigerrimus	tecelão-preto
Ploceus weynsi	tecelão-de-weyns
Ploceus golandi	tecelão-de-clarke
Ploceus dichrocephalus	tecelão-de-salvadori
Ploceus melanocephalus	tecelão-de-cabeça-preta
Ploceus jacksoni	tecelão-de-dorso-dourado
Ploceus badius	tecelão-canela
Ploceus rubiginosus	tecelão-castanho
Ploceus aureonucha	tecelão-de-nuca-dourada
Ploceus tricolor	tecelão-tricolor
Ploceus albinucha	tecelão-de-maxwell
Ploceus nelicourvi	tecelão-malgaxe
Ploceus sakalava	tecelão-sakalava
Ploceus hypoxanthus	tecelão-dourado-asiático
Ploceus benghalensis	tecelão-de-peito-preto
Ploceus manyar	tecelão-mosqueado
Ploceus philippinus	tecelão-baia
Ploceus megarhynchus	tecelão-de-cabeça-amarela
Ploceus bicolor	tecelão-bicolor
Ploceus preussi	tecelão-de-preuss
Ploceus dorsomaculatus	tecelão-de-barrete-amarelo
Ploceus olivaceiceps	tecelão-de-cabeça-verde
Ploceus nicolli	tecelão-das-usambara
Ploceus insignis	tecelão-de-barrete-castanho
Ploceus angolensis	tecelão-d'asa-barrada
Ploceus sanctithomae	tecelão-de-são-tomé
Ploceus flavipes	tecelão-de-patas-amarelas
Malimbus coronatus	malimbo-coroado

Malimbus cassini	malimbo-de-cassin
Malimbus racheliae	malimbo-de-rachel
Malimbus ballmanni	malimbo-de-ballmann
Malimbus scutatus	malimbo-de-cauda-vermelha
Malimbus ibadanensis	malimbo-de-ibadan
Malimbus nitens	malimbo-de-bico-azul
Malimbus rubricollis	malimbo-de-cabeça-vermelha
Malimbus erythrogaster	malimbo-de-barriga-vermelha
Malimbus malimbicus	malimbo-de-poupa
Anaplectes rubriceps	tecelão-de-cabeça-vermelha
Anaplectes jubaensis	tecelão-do-juba
Quelea cardinalis	quelea-cardinal
Quelea erythrops	quelea-de-cabeça-vermelha
Quelea quelea	quelea-de-bico-vermelho
Pachyphantes superciliosus	tecelão-compacto
Foudia madagascariensis	tecelão-vermelho
Foudia eminentissima	tecelão-das-comores
Foudia aldabrana	tecelão-de-aldabra
Foudia omissa	tecelão-florestal
Foudia rubra	tecelão-das-maurícias
Foudia sechellarum	tecelão-das-seicheles
Foudia flavicans	tecelão-de-rodrigues
Brachycope anomala	tecelão-rabicurto
Euplectes afer	bispo-de-coroa-amarela
Euplectes diadematus	bispo-diademado
Euplectes gierowii	bispo-preto
Euplectes nigroventris	bispo-de-peito-preto
Euplectes hordeaceus	bispo-d'asa-preta
Euplectes orix	bispo-vermelho
Euplectes franciscanus	bispo-laranja
Euplectes aureus	bispo-dourado
Euplectes capensis	bispo-d'uropígio-amarelo
Euplectes axillaris	bispo-cauda-de-leque
Euplectes macroura	bispo-de-dorso-amarelo
Euplectes hartlaubi	bispo-dos-pântanos
Euplectes psammacromius	bispo-montês
Euplectes albonotatus	bispo-d'asa-branca
Euplectes ardens	bispo-de-colar
Euplectes laticauda	bispo-de-cauda-larga
Euplectes progne	bispo-rabilongo
Euplectes jacksoni	bispo-cauda-de-lira

Bicos-de-lacre, granadeiros, capuchinhos, freirinhas e diamantes são alguns dos géneros de aves que integram esta vasta família. Trata-se de espécies granívoras, de pequena dimensão e, em muitos casos, com plumagens contrastadas ou cores vivas, o que faz com que muitas delas sejam populares em cativeiro. Habitam principalmente regiões tropicais e frequentam diversos tipos de habitats. Algumas das espécies que vivem em África são vítimas de parasitismo por parte das viúvas.

Espécies: 140

Distribuição: África subsariana, Sul da Ásia, Austrália e diversas ilhas adjacentes

Heteromunia pectoralis	diamante-de-peito-branco
Oreostruthus fuliginosus	diamante-montês
Stagonopleura guttata	diamante-malhado
Stagonopleura oculata	diamante-oculado
Stagonopleura bella	diamante-formoso
Neochmia phaeton	diamante-escarlate
Neochmia temporalis	diamante-de-sobrolho-vermelho
Emblema pictum	diamante-pintado
Emblema ruficauda	diamante-estrela
Emblema modesta	diamante-modesto
Stizoptera bichenovii	diamante-de-bicheno
Taeniopygia guttata	diamante-mandarim
Taeniopygia castanotis	diamante-australiano
Poephila personata	diamante-mascarado
Poephila acuticauda	diamante-rabilongo
Poephila cincta	diamante-de-garganta-preta
Spermestes griseicapilla	freirinha-de-cabeça-cinzenta
Spermestes cucullata	freirinha-bronzeada
Spermestes fringilloides	freirinha-grande
Spermestes bicolor	freirinha-bicolor
Lepidopygia nana	bico-de-prata-malgaxe
Euodice cantans	bico-de-chumbo-africano
Euodice malabarica	bico-de-chumbo-indiano
Padda oryzivora	pardal-de-java
Padda fuscata	pardal-timorense
Mayrimunia tristissima	capuchinho-de-cabeça-estriada
Mayrimunia leucosticta	capuchinho-malhado
Lonchura punctulata	capuchinho-dominó
Lonchura kelaarti	capuchinho-de-garganta-preta
Lonchura molucca	capuchinho-de-faces-pretas
Lonchura striata	capuchinho-estriado
Lonchura fuscans	capuchinho-escuro

Lonchura leucogastra	capuchinho-de-barriga-branca
Lonchura leucogastroides	capuchinho-javanês
Lonchura malacca	capuchinho-tricolor
Lonchura atricapilla	capuchinho-castanho
Lonchura ferruginosa	capuchinho-ferruginoso
Lonchura maja	capuchinho-de-cabeça-branca
Lonchura pallida	capuchinho-pálido
Lonchura grandis	capuchinho-grande
Lonchura teerinki	capuchinho-de-peito-preto
Lonchura montana	capuchinho-montês
Lonchura monticola	capuchinho-alpino
Lonchura vana	capuchinho-das-arfak
Lonchura nevermanni	capuchinho-de-coroa-cinzenta
Lonchura caniceps	capuchinho-de-cabeça-cinzenta
Lonchura spectabilis	capuchinho-vistoso
Lonchura forbesi	capuchinho-da-nova-irlanda
Lonchura hunsteini	capuchinho-de-hunstein
Lonchura nigerrima	capuchinho-da-nova-hanover
Lonchura flaviprymna	capuchinho-d'uropígio-amarelo
Lonchura quinticolor	capuchinho-multicolor
Lonchura castaneothorax	capuchinho-de-peito-castanho
Lonchura stygia	capuchinho-preto
Lonchura melaena	capuchinho-da-nova-bretanha
Chloebia gouldiae	diamante-de-gould
Erythrura prasina	diamante-rabijunco
Erythrura viridifacies	diamante-de-faces-verdes
Erythrura hyperythra	diamante-de-peito-ruivo
Erythrura psittacea	diamante-papagaio
Erythrura pealii	diamante-das-fiji
Erythrura regia	diamante-real
Erythrura cyaneovirens	diamante-verde-e-azul
Erythrura kleinschmidti	diamante-de-bico-rosado
Erythrura tricolor	diamante-tricolor
Erythrura coloria	diamante-de-mindanau
Erythrura papuana	diamante-da-papua
Erythrura trichroa	diamante-de-faces-azuis
Nesocharis shelleyi	olivinha-rabicurta
Nesocharis ansorgei	olivinha-de-colar
Coccopygia quartinia	bico-de-lacre-de-barriga-amarela
Coccopygia bocagei	bico-de-lacre-de-bocage
Coccopygia melanotis	bico-de-lacre-do-cabo
Mandingoa nitidula	pintadinho-verde
Cryptospiza shelleyi	asa-vermelha-de-shelley
Cryptospiza jacksoni	asa-vermelha-de-jackson
Cryptospiza salvadorii	asa-vermelha-de-salvadori
Cryptospiza reichenovii	asa-vermelha-de-reichenow
Parmoptila rubrifrons	pica-formigas-de-testa-ruiva
Parmoptila woodhousei	pica-formigas-de-garganta-ruiva

Parmoptila jamesoni	pica-formigas-de-jameson
Nigrita fusconotus	negrita-de-peito-branco
Nigrita bicolor	negrita-de-peito-castanho
Nigrita canicapillus	negrita-de-cabeça-cinzenta
Nigrita luteifrons	negrita-de-testa-amarela
Delacourella capistrata	olivinha-de-cabeça-cinzenta
Brunhilda charmosyna	bico-de-lacre-oriental
Brunhilda erythronotos	bico-de-lacre-de-faces-pretas
Glaucestrilda caerulescens	bico-de-lacre-azulado
Glaucestrilda perreini	bico-de-lacre-de-cauda-preta
Glaucestrilda thomensis	bico-de-lacre-angolano
Estrilda nonnula	bico-de-lacre-de-barrete-preto
Estrilda atricapilla	bico-de-lacre-de-cabeça-preta
Estrilda kandti	bico-de-lacre-de-kandt
Estrilda melpoda	bico-de-lacre-de-faces-laranja
Estrilda poliopareia	bico-de-lacre-nigeriano
Estrilda paludicola	bico-de-lacre-dos-pauis
Estrilda astrild	bico-de-lacre-comum
Estrilda nigriloris	bico-de-lacre-de-mascarilha
Estrilda troglodytes	bico-de-lacre-d'uropígio-preto
Estrilda rhodopyga	bico-de-lacre-d'uropígio-vermelho
Estrilda rufibarba	bico-de-lacre-árabe
Ortygospiza atricollis	bico-de-lacre-codorniz
Paludipasser locustella	bico-de-lacre-gafanhoto
Amadina fasciata	degolado-africano
Amadina erythrocephala	degolado-de-cabeça-vermelha
Amandava formosa	bengali-verde
Amandava subflava	bengali-zebra
Amandava amandava	bengali-vermelho
Granatina ianthinogaster	granadeiro-púrpura
Granatina granatina	monsenhor
Uraeginthus angolensis	peito-celeste-angolano
Uraeginthus bengalus	peito-celeste-de-faces-carmesim
Uraeginthus cyanocephalus	peito-celeste-de-coroa-azul
Spermophaga poliogenys	tecelinho-de-grant
Spermophaga haematina	tecelinho-de-cabeça-preta
Spermophaga ruficapilla	tecelinho-de-cabeça-vermelha
Pyrenestes minor	quebra-sementes-do-niassa
Pyrenestes sanguineus	quebra-sementes-carmesim
Pyrenestes ostrinus	quebra-sementes-de-barriga-preta
Pytilia melba	aurora-d'asa-verde
Pytilia afra	aurora-d'asa-laranja
Pytilia phoenicoptera	aurora-d'asa-vermelha
Pytilia lineata	aurora-etíope
Pytilia hypogrammica	aurora-d'asa-amarela
Euschistospiza dybowskii	pintadinho-de-cabeça-cinzenta
Euschistospiza cinereovinacea	pintadinho-sombrio
Hypargos niveoguttatus	pintadinho-de-peito-vermelho

Hypargos margaritatus	pintadinho-de-peito-rosado
Clytospiza monteiri	pintadinho-castanho
Lagonosticta senegala	granadeiro-de-bico-vermelho
Lagonosticta rubricata	granadeiro-de-bico-azul
Lagonosticta rhodopareia	granadeiro-de-jameson
Lagonosticta virata	granadeiro-maliano
Lagonosticta sanguinodorsalis	granadeiro-das-rochas
Lagonosticta umbrinodorsalis	granadeiro-chadiano
Lagonosticta rara	granadeiro-de-barriga-preta
Lagonosticta rufopicta	granadeiro-de-peito-barrado
Lagonosticta nitidula	granadeiro-castanho
Lagonosticta larvata	granadeiro-de-faces-pretas

Viduidae Viúvas

As viúvas são parasitas, que depositam os seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves, principalmente estrildídeos – a excepção está na viúva-tecelão, que parasita fuinhas ou prínias. Os machos de algumas espécies têm caudas muito longas, que exibem para cortejar as fêmeas, ao passo que as espécies sem caudas longas têm vocalizações elaboradas, que incluem imitações. As viúvas tendem a ser bastante promíscuas e tanto os machos como as fêmeas podem ter vários parceiros.

Espécies: 20

Distribuição: África subsariana

Vidua chalybeata	viúva-senegalesa
Vidua purpurascens	viúva-púrpura
Vidua raricola	viúva-de-jambandu
Vidua larvaticola	viúva-de-barka
Vidua funerea	viúva-sombria
Vidua codringtoni	viúva-verde
Vidua wilsoni	viúva-de-wilson
Vidua nigeriae	viúva-nigeriana
Vidua maryae	viúva-do-planalto-jos
Vidua camerunensis	viúva-camaronesa
Vidua macroura	viúva-bico-de-lacre
Vidua hypocherina	viúva-metálica
Vidua fischeri	viúva-rabo-de-palha
Vidua regia	viúva-real
Vidua paradisaea	viúva-do-paraíso
Vidua orientalis	viúva-saheliana
Vidua interjecta	viúva-barulhenta
Vidua togoensis	viúva-togolesa
Vidua obtusa	viúva-de-cauda-larga
Anomalospiza imberbis	viúva-tecelão

Peucedramidae — Ocoteiro

Aqui se inclui apenas uma espécie, o ocoteiro, assim nomeado devido à sua associação a florestas de pinheiros, denominados "ocotes" no México e América Central. É uma ave insectívora de pequena dimensão, que durante muito tempo foi classificada como uma mariquita (família Parulidae). A evidência genética agora disponível parece indicar que as ferreirinhas da Eurásia são os seus parentes mais próximos.

Espécies: 1

Distribuição: América Central, México e sudoeste dos E.U.A.

Peucedramus taeniatus	ocoteiro

Prunellidae Ferreirinhas

As ferreirinhas são características de zonas montanhosas da Eurásia, muitas vezes acima da linha das árvores, com a única excepção da ferreirinha-comum, que também ocorre em matos e florestas das terras baixas. Alimentam-se de insectos e sementes ao nível do solo. Possuem um dos mais complexos e variáveis sistemas de reprodução de todas as aves, onde cada macho pode acasalar com várias fêmeas e cada fêmea com vários machos, dependendo do alimento disponível e da dimensão dos territórios.

Espécies: 13

Distribuição: Eurásia

Prunella collaris	ferreirinha-alpina
Prunella himalayana	ferreirinha-dos-himalaias
Prunella rubeculoides	ferreirinha-de-peito-vermelho
Prunella strophiata	ferreirinha-de-peito-ruivo
Prunella montanella	ferreirinha-siberiana
Prunella fulvescens	ferreirinha-parda
Prunella ocularis	ferreirinha-de-radde
Prunella fagani	ferreirinha-iemenita
Prunella atrogularis	ferreirinha-de-garganta-preta
Prunella koslowi	ferreirinha-mongol
Prunella modularis	ferreirinha-comum
Prunella rubida	ferreirinha-japonesa
Prunella immaculata	ferreirinha-imaculada

Esta família reúne três grupos de aves distintas: as alvéolas, que têm um ar elegante e uma plumagem contrastada, à base de branco, preto, cinzento ou amarelo; as petinhas, que são acastanhadas, geralmente riscadas e com um aspecto mais críptico; e as sentinelas, que são castanhas por cima mas têm um tom mais vivo por baixo, em geral amarelo ou avermelhado. Todas elas apresentam uma cauda longa. São aves insectívoras e a maioria frequenta habitats abertos.

Espécies: 70

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Dendronanthus indicus	alvéola-florestal
Motacilla flava	alvéola-amarela
Motacilla tschutschensis	alvéola-oriental
Motacilla citreola	alvéola-citrina
Motacilla capensis	alvéola-do-cabo
Motacilla flaviventris	alvéola-malgaxe
Motacilla bocagii	rabicurta-de-são-tomé
Motacilla cinerea	alvéola-cinzenta
Motacilla clara	alvéola-rabilonga
Motacilla alba	alvéola-branca
Motacilla aguimp	alvéola-africana
Motacilla samveasnae	alvéola-do-mekong
Motacilla grandis	alvéola-japonesa
Motacilla maderaspatensis	alvéola-indiana
Tmetothylacus tenellus	petinha-dourada
Hemimacronyx chloris	petinha-de-peito-amarelo
Macronyx sharpei	sentinela-de-sharpe
Macronyx flavicollis	sentinela-abissínia
Macronyx fuelleborni	sentinela-de-fülleborn
Macronyx capensis	sentinela-do-cabo
Macronyx croceus	sentinela-amarela
Macronyx aurantiigula	sentinela-de-pangani
Macronyx ameliae	sentinela-de-garganta-rosada
Macronyx grimwoodi	sentinela-de-grimwood
Anthus richardi	petinha-de-richard
Anthus rufulus	petinha-dos-arrozais
Anthus australis	petinha-australiana
Anthus novaeseelandiae	petinha-neozelandesa
Anthus cinnamomeus	petinha-do-capim
Anthus hoeschi	petinha-montesa
Anthus godlewskii	petinha-de-blyth
Anthus campestris	petinha-dos-campos
Anthus similis	petinha-de-bico-comprido

Anthus nicholsoni	petinha-de-nicholson
Anthus nyassae	petinha-do-niassa
Anthus vaalensis	petinha-creme
Anthus leucophrys	petinha-de-dorso-liso
Anthus pallidiventris	petinha-pernilonga
Anthus pratensis	petinha-dos-prados
Anthus trivialis	petinha-das-árvores
Anthus hodgsoni	petinha-silvestre
Anthus gustavi	petinha-de-pechora
Anthus roseatus	petinha-rosada
Anthus cervinus	petinha-de-garganta-ruiva
Anthus japonicus	petinha-siberiana
Anthus rubescens	petinha-americana
Anthus spinoletta	petinha-ribeirinha
Anthus petrosus	petinha-marítima
Anthus nilghiriensis	petinha-dos-nilgiris
Anthus sylvanus	petinha-dos-himalaias
Anthus berthelotii	corre-caminho
Anthus lineiventris	petinha-estriada
Anthus crenatus	petinha-das-rochas
Anthus brachyurus	petinha-rabicurta
Anthus caffer	petinha-do-mato
Anthus sokokensis	petinha-de-sokoke
Anthus melindae	petinha-de-malindi
Anthus gutturalis	petinha-da-papua
Anthus ruficollis	madanga
Anthus spragueii	petinha-das-pradarias
Anthus chii	petinha-amarelada
Anthus peruvianus	petinha-peruana
Anthus furcatus	petinha-de-bico-curto
Anthus brevirostris	petinha-da-puna
Anthus chacoensis	petinha-das-pampas
Anthus correndera	petinha-austral
Anthus antarcticus	petinha-da-geórgia-do-sul
Anthus nattereri	petinha-de-peito-ocre
Anthus hellmayri	petinha-de-barriga-acanelada
Anthus bogotensis	petinha-andina

Urocynchramidae Rosadinho-rabilongo

Esta é uma espécie enigmática, que apresenta características intermédias entre os fringilídeos e os emberizídeos, tanto morfológica como vocalmente, tendo já feito parte de ambas as famílias. Porém, devido às suas características peculiares, tem actualmente a sua própria família. Vive em zonas montanhosas e é uma ave tímida, que passa muito tempo escondida na vegetação densa, só se mostrando mais quando pousa no topo de uma moita, para cantar.

Espécies: 1

Distribuição: China

Urocynchramus pylzowi	rosadinho-rabilongo

Fringillidae Tentilhões, Pintassilgos e afins

Esta vasta família contém aves maioritariamente granívoras e frugívoras, algumas delas com formas de bico muito especializadas - veja-se os cruza-bicos ou bicos-grossudos. Para além dos tentilhões, pintassilgos e parentes próximos a que estamos acostumados no hemisfério norte, inclui também as coloridas eufónias da América tropical e um extraordinariamente diverso grupo de aves endémicas do Havai, muitas delas nectarívoras.

Espécies: 238

Distribuição: Américas, Europa, Ásia e África

Fringilla coelebs	tentilhão-comum
Fringilla spodiogenys	tentilhão-de-faces-cinzentas
Fringilla moreletti	tentilhão-dos-açores
Fringilla maderensis	tentilhão-da-madeira
Fringilla canariensis	tentilhão-das-canárias
Fringilla teydea	tentilhão-azul
Fringilla polatzeki	tentilhão-da-grã-canária
Fringilla montifringilla	tentilhão-montês
Mycerobas icterioides	bico-grossudo-de-cabeça-preta
Mycerobas affinis	bico-grossudo-de-colar
Mycerobas melanozanthos	bico-grossudo-pintalgado
Mycerobas carnipes	bico-grossudo-d'asa-branca
Hesperiphona vespertina	bico-grossudo-vespertino
Hesperiphona abeillei	bico-grossudo-de-capuz
Coccothraustes coccothraustes	bico-grossudo-eurasiático
Eophona migratoria	bico-grossudo-chinês
Eophona personata	bico-grossudo-japonês
Pinicola enucleator	pintarroxo-de-bico-grosso
Pyrrhula nipalensis	dom-fafe-castanho
Pyrrhula aurantiaca	dom-fafe-laranja
Pyrrhula erythrocephala	dom-fafe-de-cabeça-vermelha
Pyrrhula erythaca	dom-fafe-de-cabeça-cinzenta
Pyrrhula owstoni	dom-fafe-da-formosa
Pyrrhula leucogenis	dom-fafe-filipino
Pyrrhula pyrrhula	dom-fafe-eurasiático
Pyrrhula murina	priolo
Rhodopechys sanguineus	pintarroxo-d'asa-carmesim
Bucanetes githagineus	pintarroxo-trombeteiro
Bucanetes mongolicus	pintarroxo-mongol
Agraphospiza rubescens	pintarroxo-rubro
Callacanthis burtoni	tentilhão-de-lunetas
Pyrrhoplectes epauletta	tentilhão-de-nuca-dourada
Procarduelis nipalensis	pintarroxo-escuro
Leucosticte nemoricola	pintarroxo-montês-simples

Leucosticte brandti	pintarroxo-montês-cinzento
Leucosticte arctoa	pintarroxo-montês-siberiano
Leucosticte tephrocotis	pintarroxo-montês-de-coroa-cinzenta
Leucosticte atrata	pintarroxo-montês-preto
Leucosticte australis	pintarroxo-montês-de-barrete
Carpodacus erythrinus	pintarroxo-carmim
Carpodacus sipahi	pintarroxo-escarlate
Carpodacus ferreorostris	pintarroxo-das-bonin
Carpodacus rubicilloides	pintarroxo-estriado
Carpodacus rubicilla	pintarroxo-grande
Carpodacus grandis	pintarroxo-dos-himalaias
Carpodacus rhodochlamys	pintarroxo-de-manto-vermelho
Carpodacus pulcherrimus	pintarroxo-soberbo-dos-himalaias
Carpodacus davidianus	pintarroxo-soberbo-chinês
Carpodacus waltoni	pintarroxo-d'uropígio-rosado
Carpodacus rodochroa	pintarroxo-de-sobrancelha-rosa
Carpodacus edwardsii	pintarroxo-castanho
Carpodacus rodopeplus	pintarroxo-d'asa-pintada
Carpodacus verreauxii	pintarroxo-de-sharpe
Carpodacus vinaceus	pintarroxo-vinoso
Carpodacus formosanus	pintarroxo-da-formosa
Carpodacus synoicus	pintarroxo-do-sinai
Carpodacus stoliczkae	pintarroxo-pálido
Carpodacus roborowskii	pintarroxo-do-tibete
Carpodacus sillemi	pintarroxo-montês-de-cabeça-castanha
Carpodacus sibiricus	pintarroxo-rabilongo-siberiano
Carpodacus lepidus	pintarroxo-rabilongo-chinês
Carpodacus roseus	pintarroxo-rosado
Carpodacus trifasciatus	pintarroxo-de-três-faixas
Carpodacus thura	pintarroxo-de-sobrancelha-branca
Carpodacus dubius	pintarroxo-chinês
Carpodacus puniceus	pintarroxo-de-testa-vermelha
Carpodacus subhimachalus	pintarroxo-de-cabeça-vermelha
Melamprosops phaeosoma	puli
Paroreomyza maculata	alauaio-de-oahu
Paroreomyza flammea	alauaio-de-molokai
Paroreomyza montana	alauaio-de-maui
Oreomystis bairdi	akikiki-de-kauai
Telespiza cantans	palila-de-laysan
Telespiza ultima	palila-de-nihoa
Loxioides bailleui	palila-do-havai
Rhodacanthis flaviceps	koa-pequeno
Rhodacanthis palmeri	koa-grande
Chloridops kona	bico-grande-de-kona
Psittirostra psittacea	ou
Dysmorodrepanis munroi	bico-de-gancho-de-lanai
Drepanis coccinea	ivi
Drepanis pacifica	mamo-do-havai

Drepanis funerea	mamo-preto
Ciridops anna	ula-ai-hawane
Palmeria dolei	akoekoe
Himatione sanguinea	apapane
Himatione fraithii	trepadeira-do-mel
Viridonia sagittirostris	amakihi-grande
Akialoa obscura	akialoa-do-havai
Akialoa ellisiana	akialoa-de-oahu
Akialoa stejnegeri	akialoa-de-kauai
Akialoa lanaiensis	akialoa-de-lanai
Hemignathus lucidus	nukupu-de-oahu
Hemignathus hanapepe	nukupu-de-kauai
Hemignathus affinis	nukupu-de-maui
Hemignathus wilsoni	akiapolau
Pseudonestor xanthophrys	bico-de-gancho-de-maui
Magumma parva	anianiau
Loxops mana	akikiki-do-havai
Loxops caeruleirostris	akepa-de-kauai
Loxops coccineus	akepa-do-havai
Loxops wolstenholmei	akepa-de-oahu
Loxops ochraceus	akepa-de-maui
Chlorodrepanis virens	amaki-do-havai
Chlorodrepanis flava	amaki-de-oahu
Chlorodrepanis stejnegeri	amaki-de-kauai
Haemorhous purpureus	pintarroxo-púrpura
Haemorhous cassinii	pintarroxo-de-cassin
Haemorhous mexicanus	pintarroxo-mexicano
Chloris chloris	verdilhão-europeu
Chloris sinica	verdilhão-chinês
Chloris kittlitzi	verdilhão-das-bonin
Chloris spinoides	verdilhão-dos-himalaias
Chloris monguilloti	verdilhão-vietnamita
Chloris ambigua	verdilhão-de-cabeça-preta
Rhodospiza obsoleta	pintarroxo-do-deserto
Rhynchostruthus socotranus	bico-grosso-de-socotra
Rhynchostruthus percivali	bico-grosso-árabe
Rhynchostruthus louisae	bico-grosso-somali
Linurgus olivaceus	canário-papa-figos
Crithagra rufobrunnea	canário-do-príncipe
Crithagra concolor	canário-de-são-tomé
Crithagra citrinelloides	canário-etíope
Crithagra frontalis	canário-de-testa-amarela
Crithagra hyposticta	canário-oriental
Crithagra capistrata	canário-de-faces-pretas
Crithagra koliensis	canário-dos-papiros
Crithagra scotops	canário-da-floresta
Crithagra leucopygia	canário-d'uropígio-branco
Crithagra atrogularis	canário-de-garganta-preta

Crithagra xanthopygia	canário-d'uropígio-amarelo
Crithagra reichenowi	canário-de-reichenow
Crithagra rothschildi	canário-árabe
Crithagra flavigula	canário-de-garganta-amarela
Crithagra xantholaema	canário-de-coleira-preta
Crithagra citrinipectus	canário-de-peito-limão
Crithagra mozambica	canário-moçambicano
Crithagra dorsostriata	canário-de-barriga-branca
Crithagra ankoberensis	canário-de-ankober
Crithagra menachensis	canário-iemenita
Crithagra totta	canário-do-cabo
Crithagra symonsi	canário-das-drakensberg
Crithagra donaldsoni	canário-de-bico-grosso
Crithagra buchanani	canário-de-buchanan
Crithagra flaviventris	canário-de-barriga-amarela
Crithagra sulphurata	canário-girassol
Crithagra striatipectus	canário-de-peito-estriado
Crithagra reichardi	canário-de-reichard
Crithagra gularis	canário-de-cabeça-estriada
Crithagra canicapilla	canário-ocidental
Crithagra mennelli	canário-d'orelhas-pretas
Crithagra tristriata	canário-d'uropígio-castanho
Crithagra albogularis	canário-de-garganta-branca
Crithagra burtoni	canário-de-burton
Crithagra striolata	canário-estriado
Crithagra whytii	canário-de-whyte
Crithagra melanochroa	canário-dos-kipengere
Crithagra leucoptera	canário-d'asa-branca
Linaria flavirostris	pintarroxo-de-bico-amarelo
Linaria cannabina	pintarroxo-europeu
Linaria yemenensis	pintarroxo-iemenita
Linaria johannis	pintarroxo-somali
Acanthis flammea	pintarroxo-de-queixo-preto
Loxia pytyopsittacus	cruza-bico-papagaio
Loxia scotica	cruza-bico-escocês
Loxia curvirostra	cruza-bico-comum
Loxia sinesciuris	cruza-bico-de-cassia
Loxia leucoptera	cruza-bico-d'asa-branca
Loxia megaplaga	cruza-bico-dominicano
Chrysocorythus estherae	chamariz-indonésio
Chrysocorythus mindanensis	chamariz-de-mindanau
Carduelis carduelis	pintassilgo-europeu
Carduelis caniceps	pintassilgo-oriental
Carduelis citrinella	verdilhão-serrano
Carduelis corsicana	verdilhão-corso
Serinus pusillus	chamariz-de-testa-vermelha
Serinus serinus	chamariz-europeu
Serinus syriacus	chamariz-sírio

Serinus canaria	canário-da-terra
Serinus canicollis	canário-de-nuca-cinzenta
Serinus flavivertex	canário-de-coroa-amarela
Serinus nigriceps	canário-de-cabeça-preta
Serinus alario	canário-alário
Spinus thibetanus	lugre-do-tibete
Spinus lawrencei	lugre-de-lawrence
Spinus tristis	lugre-americano
Spinus psaltria	lugre-pequeno
Spinus spinus	lugre-eurasiático
Spinus dominicensis	lugre-das-antilhas
Spinus pinus	lugre-dos-pinheiros
Spinus atriceps	lugre-de-coroa-preta
Spinus notatus	lugre-de-cabeça-preta
Spinus barbatus	lugre-de-queixo-preto
Spinus xanthogastrus	lugre-de-barriga-amarela
Spinus olivaceus	lugre-oliváceo
Spinus magellanicus	lugre-de-capuz
Spinus siemiradzkii	lugre-açafrão
Spinus yarrellii	lugre-nordestino
Spinus cucullatus	lugre-vermelho
Spinus atratus	lugre-preto
Spinus uropygialis	lugre-d'uropígio-amarelo
Spinus crassirostris	lugre-de-bico-grosso
Spinus spinescens	lugre-andino
Chlorophonia elegantissima	eufónia-de-barrete-azul
Chlorophonia musica	eufónia-dominicana
Chlorophonia sclateri	eufónia-porto-riquenha
Chlorophonia flavifrons	eufónia-das-pequenas-antilhas
Chlorophonia cyanocephala	eufónia-d'uropígio-dourado
Chlorophonia cyanea	clorofónia-de-nuca-azul
Chlorophonia pyrrhophrys	clorofónia-de-peito-castanho
Chlorophonia flavirostris	clorofónia-de-colar
Chlorophonia occipitalis	clorofónia-de-coroa-azul
Chlorophonia callophrys	clorofónia-de-sobrancelha-dourada
Euphonia jamaica	eufónia-jamaicana
Euphonia saturata	eufónia-de-coroa-laranja
Euphonia plumbea	eufónia-plúmbea
Euphonia chlorotica	eufónia-de-garganta-púrpura
Euphonia finschi	eufónia-guianense
Euphonia concinna	eufónia-do-magdalena
Euphonia trinitatis	eufónia-de-trinidade
Euphonia godmani	eufónia-mexicana
Euphonia affinis	eufónia-de-garganta-preta
Euphonia luteicapilla	eufónia-de-coroa-amarela
Euphonia chrysopasta	eufónia-de-loros-brancos
Euphonia minuta	eufónia-de-crisso-branco
Euphonia chalybea	eufónia-de-garganta-verde

Euphonia violacea	eufónia-violácea
Euphonia hirundinacea	eufónia-de-garganta-amarela
Euphonia laniirostris	eufónia-de-bico-grosso
Euphonia imitans	eufónia-de-coroa-manchada
Euphonia gouldi	eufónia-olivácea
Euphonia fulvicrissa	eufónia-de-crisso-fulvo
Euphonia anneae	eufónia-de-coroa-ruiva
Euphonia xanthogaster	eufónia-de-barriga-laranja
Euphonia mesochrysa	eufónia-esverdeada
Euphonia cayennensis	eufónia-de-flancos-dourados
Euphonia rufiventris	eufónia-de-barriga-ruiva
Euphonia pectoralis	eufónia-de-barriga-castanha

Calcariidae — Escrevedeira-das-neves e afins

As escrevedeiras-das-neves e os seus parentes próximos reproduzem-se na tundra árctica e nas pradarias norte-americanas, onde a sua plumagem lhes permite camuflarem-se, ora na vegetação herbácea, ora na neve. Alimentam as crias com insectos na primavera boreal, mas as espécies árcticas migram para sul no Inverno, podendo ser avistadas em praias, campos e outras áreas abertas, onde consomem essencialmente sementes e bagas.

Espécies: 6

Distribuição: América do Norte e Eurásia

Rhynchophanes mccownii	escrevedeira-de-bico-grosso
Calcarius lapponicus	escrevedeira-da-lapónia
Calcarius pictus	escrevedeira-de-smith
Calcarius ornatus	escrevedeira-de-nuca-ruiva
Plectrophenax nivalis	escrevedeira-das-neves
Plectrophenax hyperboreus	escrevedeira-hiperbórea

Rhodinocichlidae Tangará-tordo-rosado

O nome desta ave alude tanto à sua aparência intermédia entre um tangará e um tordo, como ao canto que inclui qualidades típicas de ambas as famílias. Forma hoje em dia uma família monoespecífica, mas este poderá um dia deixar de ser o caso, já que o tangará-tordo-rosado ocorre em cinco populações isoladas e bem diferenciadas morfologicamente. São aves tímidas, que buscam insectos, sementes, bagas e frutos ao nível do solo, em canaviais ou vegetação arbustiva densa.

Espécies: 1

Distribuição: México, América Central e extremo norte da América do Sul (Colômbia e Venezuela)

Rhodinocichla rosea	tangará-tordo-rosado

Emberizidae — Escrevedeiras e afins

A maioria das escrevedeiras encontra-se nesta família. São aves de bico cónico, com uma mandíbula inferior mais espessa, que se alimentam de invertebrados durante a reprodução e de sementes o resto do ano. Na sua plumagem frequentemente exibem listas proeminentes na cabeça. Têm cantos melodiosos e podem ser encontradas principalmente em zonas abertas, mas também em áreas parcialmente arborizadas ou em caniçais.

Espécies: 44

Distribuição: Europa, Ásia e África

Emberiza lathami	escrevedeira-de-crista
Emberiza siemsseni	escrevedeira-azul
Emberiza calandra	trigueirão
Emberiza citrinella	escrevedeira-amarela
Emberiza leucocephalos	escrevedeira-de-barrete-branco
Emberiza cia	cia
Emberiza godlewskii	escrevedeira-de-godlewski
Emberiza cioides	escrevedeira-de-brandt
Emberiza stewarti	escrevedeira-de-coroa-branca
Emberiza jankowskii	escrevedeira-de-dorso-ruivo
Emberiza buchanani	escrevedeira-de-cabeça-cinzenta
Emberiza cineracea	escrevedeira-turca
Emberiza hortulana	sombria
Emberiza caesia	escrevedeira-cinzenta
Emberiza cirlus	escrevedeira-de-garganta-preta
Emberiza striolata	escrevedeira-estriada
Emberiza sahari	escrevedeira-doméstica
Emberiza impetuani	escrevedeira-cotovia
Emberiza tahapisi	escrevedeira-acanelada
Emberiza goslingi	escrevedeira-de-gosling
Emberiza socotrana	escrevedeira-de-socotra
Emberiza capensis	escrevedeira-do-cabo
Emberiza tristrami	escrevedeira-de-tristram
Emberiza fucata	escrevedeira-orelhuda
Emberiza pusilla	escrevedeira-pigmeia
Emberiza chrysophrys	escrevedeira-de-sobrolho
Emberiza rustica	escrevedeira-rústica
Emberiza elegans	escrevedeira-elegante
Emberiza aureola	escrevedeira-aureolada
Emberiza poliopleura	escrevedeira-somali
Emberiza flaviventris	escrevedeira-de-peito-dourado
Emberiza affinis	escrevedeira-d'uropígio-castanho
Emberiza cabanisi	escrevedeira-de-cabanis
Emberiza rutila	escrevedeira-ruiva

Emberiza koslowi	escrevedeira-do-tibete
Emberiza melanocephala	escrevedeira-de-cabeça-preta
Emberiza bruniceps	escrevedeira-de-cabeça-ruiva
Emberiza sulphurata	escrevedeira-japonesa
Emberiza spodocephala	escrevedeira-de-faces-pretas
Emberiza personata	escrevedeira-mascarada
Emberiza variabilis	escrevedeira-dos-bambus
Emberiza pallasi	escrevedeira-de-pallas
Emberiza yessoensis	escrevedeira-da-manchúria
Emberiza schoeniclus	escrevedeira-dos-caniços

Embora designados "sparrows" (pardais) em inglês, os tico-ticos e parentes próximos são mais próximos das escrevedeiras, e têm um papel ecológico no Novo Mundo semelhante ao destas últimas no Velho Mundo. Podem ser encontrados em todo o tipo de habitats, desde a selva amazónica até à tundra canadiana. Possuem um bico apropriado para comer sementes, mas incluem também muitos invertebrados na sua dieta.

Espécies: 141

Distribuição: Américas

Oreothraupis arremonops	tico-tico-tangará
Chlorospingus flavigularis	clorospingo-de-garganta-amarela
Chlorospingus parvirostris	clorospingo-de-bigodes-amarelos
Chlorospingus canigularis	clorospingo-de-garganta-cinzenta
Chlorospingus pileatus	clorospingo-de-sobrancelhas-brancas
Chlorospingus flavopectus	clorospingo-comum
Chlorospingus tacarcunae	clorospingo-do-tacarcuna
Chlorospingus inornatus	clorospingo-do-pirre
Chlorospingus semifuscus	clorospingo-escuro
Rhynchospiza stolzmanni	tico-tico-de-tumbes
Rhynchospiza dabbenei	tico-tico-dos-yungas
Rhynchospiza strigiceps	tico-tico-do-chaco
Peucaea carpalis	tico-tico-d'asa-ruiva
Peucaea sumichrasti	tico-tico-de-cauda-canela
Peucaea ruficauda	tico-tico-de-cabeça-listada
Peucaea humeralis	tico-tico-de-peito-preto
Peucaea mystacalis	tico-tico-de-bigodes
Peucaea botterii	tico-tico-de-botteri
Peucaea cassinii	tico-tico-de-cassin
Peucaea aestivalis	tico-tico-de-bachman
Ammodramus savannarum	tico-tico-gafanhoto
Ammodramus humeralis	tico-tico-campestre
Ammodramus aurifrons	tico-tico-de-sobrancelha-amarela
Arremonops rufivirgatus	tico-tico-azeitona
Arremonops chloronotus	tico-tico-de-costas-verdes
Arremonops conirostris	tico-tico-de-listas-pretas
Arremonops tocuyensis	tico-tico-do-tocuyo
Amphispizopsis quinquestriata	tico-tico-de-cinco-listas
Amphispiza bilineata	tico-tico-de-garganta-preta
Chondestes grammacus	tico-tico-arlequim
Calamospiza melanocorys	tico-tico-cotovia
Spizella passerina	tico-tico-trinador
Spizella pallida	tico-tico-pálido
Spizella atrogularis	tico-tico-de-queixo-preto

Spizella pusilla	tico-tico-pequeno
Spizella breweri	tico-tico-de-brewer
Spizella wortheni	tico-tico-do-planalto
Arremon basilicus	tico-tico-de-bangs
Arremon perijanus	tico-tico-de-perijá
Arremon costaricensis	tico-tico-costa-riquenho
Arremon atricapillus	tico-tico-de-cabeça-preta
Arremon phaeopleurus	tico-tico-de-caracas
Arremon phygas	tico-tico-de-paria
Arremon assimilis	tico-tico-de-sobrancelha-cinzenta
Arremon torquatus	tico-tico-de-sobrancelha-branca
Arremon aurantiirostris	tico-tico-de-bico-laranja
Arremon abeillei	tico-tico-de-coroa-preta
Arremon nigriceps	tico-tico-do-maranhão
Arremon schlegeli	tico-tico-d'asa-dourada
Arremon axillaris	tico-tico-de-bico-dourado
Arremon taciturnus	tico-tico-peitoral
Arremon franciscanus	tico-tico-do-rio-são-francisco
Arremon semitorquatus	tico-tico-de-coleira-interrompida
Arremon dorbignii	tico-tico-de-dorso-musgoso
Arremon flavirostris	tico-tico-de-bico-amarelo
Arremon virenticeps	tico-tico-de-listas-verdes
Arremon brunneinucha	tico-tico-de-coroa-castanha
Arremon crassirostris	tico-tico-de-faces-sujas
Arremon castaneiceps	tico-tico-de-peito-oliváceo
Passerella unalaschcensis	tico-tico-fuliginoso
Passerella schistacea	tico-tico-argiloso
Passerella megarhyncha	tico-tico-de-bico-grosso
Passerella iliaca	tico-tico-raposino
Spizelloides arborea	tico-tico-arbóreo
Junco vulcani	junco-dos-vulcões
Junco insularis	junco-de-guadalupe
Junco hyemalis	junco-d'olho-preto
Junco phaeonotus	junco-d'olho-amarelo
Junco bairdi	junco-da-baixa-califórnia
Zonotrichia capensis	tico-tico-comum
Zonotrichia leucophrys	tico-tico-de-coroa-branca
Zonotrichia atricapilla	tico-tico-de-coroa-dourada
Zonotrichia querula	tico-tico-de-harris
Zonotrichia albicollis	tico-tico-de-garganta-branca
Artemisiospiza nevadensis	tico-tico-das-artemísias
Artemisiospiza belli	tico-tico-de-bell
Oriturus superciliosus	tico-tico-riscado
Pooecetes gramineus	tico-tico-vespertino
Ammospiza leconteii	tico-tico-de-leconte
Ammospiza maritima	tico-tico-marítimo
Ammospiza nelsoni	tico-tico-de-nelson
Ammospiza caudacuta	tico-tico-dos-sapais

Centronyx bairdii	tico-tico-de-baird
Centronyx henslowii	tico-tico-de-henslow
Passerculus sandwichensis	tico-tico-dos-prados
Xenospiza baileyi	tico-tico-serrano
Melospiza melodia	tico-tico-musical
Melospiza lincolnii	tico-tico-de-lincoln
Melospiza georgiana	tico-tico-dos-pântanos
Pezopetes capitalis	tico-tico-de-pés-grandes
Torreornis inexpectata	tico-tico-de-zapata
Melozone kieneri	toqui-de-nuca-ruiva
Melozone fusca	toqui-pardo
Melozone albicollis	toqui-de-garganta-branca
Melozone aberti	toqui-mascarado
Melozone crissalis	toqui-da-califórnia
Melozone occipitalis	toqui-de-coroa-cinzenta
Melozone leucotis	toqui-d'orelhas-brancas
Melozone biarcuata	toqui-de-faces-brancas
Melozone cabanisi	toqui-costa-riquenho
Aimophila rufescens	tico-tico-ferrugíneo
Aimophila ruficeps	tico-tico-de-coroa-ruiva
Aimophila notosticta	tico-tico-de-oaxaca
Pipilo chlorurus	toqui-de-cauda-verde
Pipilo maculatus	toqui-malhado
Pipilo erythrophthalmus	toqui-de-flancos-ruivos
Pipilo naufragus	toqui-das-bermudas
Pipilo ocai	toqui-de-colar
Atlapetes pileatus	tico-tico-de-barrete-ruivo
Atlapetes albinucha	tico-tico-de-nuca-branca
Atlapetes tibialis	tico-tico-de-coxas-amarelas
Atlapetes luteoviridis	tico-tico-verde-e-amarelo
Atlapetes albofrenatus	tico-tico-de-freio
Atlapetes personatus	tico-tico-dos-tepuis
Atlapetes melanocephalus	tico-tico-de-santa-marta
Atlapetes semirufus	tico-tico-de-peito-ocre
Atlapetes flaviceps	tico-tico-de-cabeça-amarela
Atlapetes fuscoolivaceus	tico-tico-sombrio
Atlapetes leucopis	tico-tico-de-lágrimas
Atlapetes albiceps	tico-tico-de-cabeça-branca
Atlapetes rufigenis	tico-tico-de-faces-ruivas
Atlapetes crassus	tico-tico-do-chocó
Atlapetes tricolor	tico-tico-tricolor
Atlapetes schistaceus	tico-tico-ardósia
Atlapetes taczanowskii	tico-tico-de-taczanowski
Atlapetes pallidinucha	tico-tico-de-nuca-pálida
Atlapetes blancae	tico-tico-de-antioquia
Atlapetes latinuchus	tico-tico-de-peito-amarelo
Atlapetes nigrifrons	tico-tico-de-testa-preta
Atlapetes leucopterus	tico-tico-d'asa-branca

Atlapetes pallidiceps	tico-tico-de-cabeça-pálida
Atlapetes seebohmi	tico-tico-de-seebohm
Atlapetes nationi	tico-tico-de-barriga-ferrugínea
Atlapetes forbesi	tico-tico-do-apurímac
Atlapetes melanopsis	tico-tico-de-lunetas
Atlapetes terborghi	tico-tico-de-vilcabamba
Atlapetes canigenis	tico-tico-de-cuzco
Atlapetes melanolaemus	tico-tico-de-faces-pretas
Atlapetes rufinucha	tico-tico-boliviano
Atlapetes fulviceps	tico-tico-de-cabeça-fulva
Atlapetes citrinellus	tico-tico-de-listas-amarelas

Calyptophilidae — Caliptófilos

Esta família inclui duas espécies insectívoras, os caliptófilos, endémicos das florestas da Ilha Espanhola, onde preferem áreas com um estrato arbustivo denso. Esse facto, aliado à sua plumagem de tons subtis, faz com que sejam difíceis de detectar. Apesar disso, a sua presença é denunciada pelo seu canto enfático, emitido em dueto pelos dois membros do casal. O estatuto de conservação de ambas as espécies é desfavorável devido a alterações no seu habitat.

Espécies: 2

Distribuição: Ilha Espanhola (República Dominicana e Haiti)

Calyptophilus tertius	caliptófilo-ocidental
Calyptophilus frugivorus	caliptófilo-oriental

Phaenicophilidae Quatro-olhos e afins

Esta família é endémica das Grandes Antilhas e reúne um conjunto de aves com características distintas. Os quatro-olhos são assim chamados pelas conspícuas manchas brancas na cabeça. As cíguas que são aves frugívoras, cujas fêmeas têm uma plumagem simples, mas em que os machos são aves vistosas, com tons de laranja no corpo e um padrão de listas brancas e pretas na cabeça. Há ainda duas espécies de mariquitas, antes consideradas parte da família Parulidae e um tangará endémico de Porto Rico. Trata-se de aves essencialmente florestais, que ocorrem em diversos tipos de bosques.

Espécies: 9

Distribuição: Grandes Antilhas (Cuba, Jamaica, Espanhola e Porto Rico) e Baamas

Phaenicophilus palmarum	quatro-olhos-de-coroa-preta
Phaenicophilus poliocephalus	quatro-olhos-de-coroa-cinzenta
Microligea palustris	mariquita-de-cauda-verde
Xenoligea montana	mariquita-d'asa-branca
Nesospingus speculiferus	tangará-porto-riquenho
Spindalis zena	cígua-cubana
Spindalis dominicensis	cígua-dominicana
Spindalis portoricensis	cígua-porto-riquenha
Spindalis nigricephala	cígua-jamaicana

Zeledoniidae — Zeledonia

O único membro desta família, a zeledonia, é uma pequenina ave de cauda curta, cuja coroa alaranjada e plumagem simples fazem lembrar uma estrelinha. Alimenta-se de invertebrados, que procura ao nível do solo, a coberto de vegetação densa. Distribui-se pelas cordilheiras da Costa Rica e do Panamá, em florestas tropicais húmidas acima dos 1500 metros de altitude.

Espécies: 1

Distribuição: Costa Rica e Panamá

Zeledonia coronata	zeledonia

Teretistridae — Mariquitas cubanas

Endémica da ilha de Cuba, esta família inclui duas espécies, uma ocorrendo na parte ocidental da ilha e outra na parte oriental. Ambas são pequenas aves, semelhantes às mariquitas da família Parulidae, com tons de amarelo e cinzento. São principalmente insectívoras e frequentam vegetação arbustiva densa, tanto em zonas de matos mais secos como em floresta tropical húmida a maiores altitudes.

Espécies: 2

Distribuição: Cuba

Teretistris fernandinae	mariquita-de-cabeça-amarela
Teretistris fornsi	mariquita-cubana

Os icterídeos destacam-se pelo seu repertório vocal rico e característico. O seu bico é robusto e pontiagudo e a plumagem é dominada por tons de preto e amarelo, mas de resto as espécies variam muito em dimensão e hábitos, podendo ser encontradas em praticamente qualquer habitat das Américas. São omnívoros e algumas das espécies são migratórias. Muitas espécies são coloniais (por exemplo as oropêndolas, com os seus grandes ninhos em forma de pêndulo) e outras até parasitam ninhos de outras aves.

Espécies: 108

Distribuição: Américas

Icteria virens	ictéria
Xanthocephalus xanthocephalus	sargento-de-cabeça-amarela
Dolichonyx oryzivorus	triste-pia
Sturnella neglecta	estornela-ocidental
Sturnella magna	estornela-oriental
Sturnella lilianae	estornela-de-chihuahua
Leistes militaris	estornela-de-peito-vermelho
Leistes superciliaris	estornela-de-sobrancelha
Leistes bellicosus	estornela-peruana
Leistes loyca	estornela-rabilonga
Leistes defilippii	estornela-das-pampas
Amblycercus holosericeus	cacique-de-bico-amarelo
Cassiculus melanicterus	cacique-d'asa-amarela
Psarocolius wagleri	oropêndola-de-cabeça-castanha
Psarocolius angustifrons	oropêndola-de-dorso-ruivo
Psarocolius atrovirens	oropêndola-verde-escura
Psarocolius decumanus	oropêndola-de-crista
Psarocolius viridis	oropêndola-verde
Psarocolius bifasciatus	oropêndola-olivácea
Psarocolius montezuma	oropêndola-de-montezuma
Psarocolius guatimozinus	oropêndola-preta
Psarocolius cassini	oropêndola-do-baudó
Cacicus solitarius	cacique-solitário
Cacicus chrysopterus	cacique-d'asa-dourada
Cacicus koepckeae	cacique-de-koepcke
Cacicus sclateri	cacique-equatoriano
Cacicus cela	cacique-d'uropígio-amarelo
Cacicus uropygialis	cacique-subtropical
Cacicus chrysonotus	cacique-serrano
Cacicus latirostris	cacique-de-cauda-bandada
Cacicus oseryi	cacique-de-capacete
Cacicus haemorrhous	cacique-d'uropígio-vermelho
Icterus parisorum	corrupião-de-scott

Icterus chrysater	corrupião-de-dorso-amarelo
Icterus graduacauda	corrupião-de-audubon
Icterus leucopteryx	corrupião-jamaicano
Icterus auratus	corrupião-laranja
Icterus gularis	corrupião-de-altamira
Icterus nigrogularis	corrupião-amarelo
Icterus bullockiorum	corrupião-de-bullock
Icterus pustulatus	corrupião-de-dorso-listado
Icterus abeillei	corrupião-de-dorso-preto
Icterus galbula	corrupião-de-baltimore
Icterus mesomelas	corrupião-de-cauda-amarela
Icterus pectoralis	corrupião-de-peito-manchado
Icterus graceannae	corrupião-d'orlas-brancas
Icterus jamacaii	corrupião-nordestino
Icterus icterus	corrupião-venezuelano
Icterus croconotus	corrupião-amazónico
Icterus maculialatus	corrupião-d'asa-barrada
Icterus wagleri	corrupião-de-capuz-preto
Icterus cucullatus	corrupião-de-capuz-dourado
Icterus prosthemelas	corrupião-monástico
Icterus spurius	corrupião-dos-pomares
Icterus melanopsis	corrupião-cubano
Icterus northropi	corrupião-baamense
Icterus bonana	corrupião-de-martinica
Icterus portoricensis	corrupião-porto-riquenho
Icterus oberi	corrupião-de-monserrate
Icterus laudabilis	corrupião-de-santa-lúcia
Icterus dominicensis	corrupião-dominicano
Icterus auricapillus	corrupião-de-coroa-laranja
Icterus pyrrhopterus	corrupião-variável
Icterus cayanensis	corrupião-d'ombros-amarelos
Nesopsar nigerrimus	sargento-jamaicano
Agelaius xanthomus	sargento-d'ombros-amarelos
Agelaius humeralis	sargento-d'ombros-ruivos
Agelaius tricolor	sargento-tricolor
Agelaius phoeniceus	sargento-d'asa-vermelha
Agelaius assimilis	sargento-d'ombros-vermelhos
Molothrus rufoaxillaris	vaqueiro-gritador
Molothrus oryzivorus	vaqueiro-gigante
Molothrus bonariensis	vaqueiro-reluzente
Molothrus aeneus	vaqueiro-d'olho-vermelho
Molothrus armenti	vaqueiro-pequeno
Molothrus ater	vaqueiro-de-cabeça-castanha
Dives warczewiczi	sargento-do-mato
Dives dives	sargento-melodioso
Ptiloxena atroviolacea	sargento-cubano
Euphagus carolinus	sargento-ferrugíneo
Euphagus cyanocephalus	sargento-de-brewer

Quiscalus quiscula	rabo-de-quilha-comum
Quiscalus nicaraguensis	rabo-de-quilha-nicaraguense
Quiscalus lugubris	rabo-de-quilha-caribenho
Quiscalus niger	rabo-de-quilha-das-antilhas
Quiscalus major	rabo-de-quilha-dos-pântanos
Quiscalus mexicanus	rabo-de-quilha-mexicano
Quiscalus palustris	rabo-de-quilha-de-bico-fino
Hypopyrrhus pyrohypogaster	rabo-de-quilha-de-barriga-vermelha
Lampropsar tanagrinus	rabo-de-quilha-aveludado
Gymnomystax mexicanus	sargento-corrupião
Macroagelaius subalaris	rabo-de-quilha-colombiano
Macroagelaius imthurni	rabo-de-quilha-dos-tepuis
Curaeus curaeus	sargento-austral
Amblyramphus holosericeus	sargento-cardeal
Anumara forbesi	sargento-de-forbes
Gnorimopsar chopi	sargento-chopi
Oreopsar bolivianus	sargento-boliviano
Agelaioides badius	sargento-asa-de-telha
Agelaioides fringillarius	sargento-pálido
Agelasticus thilius	sargento-d'asa-amarela
Agelasticus xanthophthalmus	sargento-d'olho-pálido
Agelasticus cyanopus	sargento-unicolor
Chrysomus ruficapillus	sargento-de-coroa-castanha
Chrysomus icterocephalus	sargento-de-capuz-amarelo
Xanthopsar flavus	sargento-amarelo
Pseudoleistes virescens	sargento-castanho-e-amarelo
Pseudoleistes guirahuro	sargento-d'uropígio-amarelo

As mariquitas são pequenos passeriformes arborícolas, de ecologia semelhante às felosas do Velho Mundo (daí a designação "warbler" em inglês), mas com cores muito mais vivas e contrastantes. Cerca de metade delas são migradoras de longa distância, nidificando na América do Norte e invernando nos trópicos. A maioria é insectívora, mas podem consumir grandes quantidades de frutos e néctar fora da época de nidificação.

Espécies: 120

Distribuição: Américas, excepto extremo sul

Seiurus aurocapilla	mariquita-forneira
Helmitheros vermivorum	mariquita-vermívora
Parkesia motacilla	mariquita-aquática-meridional
Parkesia noveboracensis	mariquita-aquática-boreal
Vermivora bachmanii	mariquita-de-bachman
Vermivora chrysoptera	mariquita-d'asa-dourada
Vermivora cyanoptera	mariquita-d'asa-azul
Mniotilta varia	mariquita-riscadinha
Protonotaria citrea	mariquita-protonotária
Limnothlypis swainsonii	mariquita-de-swainson
Oreothlypis superciliosa	mariquita-de-peito-crescente
Oreothlypis gutturalis	mariquita-garganta-de-fogo
Leiothlypis peregrina	mariquita-do-tennessee
Leiothlypis celata	mariquita-de-coroa-laranja
Leiothlypis crissalis	mariquita-de-colima
Leiothlypis luciae	mariquita-de-lucy
Leiothlypis ruficapilla	mariquita-de-coroa-ruiva
Leiothlypis virginiae	mariquita-virginiana
Leucopeza semperi	mariquita-de-semper
Oporornis agilis	mariquita-do-connecticut
Geothlypis poliocephala	mariquita-de-coroa-cinzenta
Geothlypis aequinoctialis	mariquita-mascarada-nortenha
Geothlypis chiriquensis	mariquita-de-chiriqui
Geothlypis auricularis	mariquita-de-loros-pretos
Geothlypis velata	mariquita-mascarada-meridional
Geothlypis tolmiei	mariquita-de-tolmie
Geothlypis philadelphia	mariquita-carpideira
Geothlypis formosa	mariquita-do-kentucky
Geothlypis semiflava	mariquita-de-coroa-olivácea
Geothlypis speciosa	mariquita-de-faces-pretas
Geothlypis beldingi	mariquita-de-belding
Geothlypis rostrata	mariquita-mascarada-baamense
Geothlypis flavovelata	mariquita-de-altamira
Geothlypis trichas	mariquita-de-mascarilha

Geothlypis nelsoni	mariquita-do-mato
Catharopeza bishopi	mariquita-de-são-vicente
Setophaga plumbea	mariquita-plúmbea
Setophaga angelae	mariquita-de-angela
Setophaga pharetra	mariquita-jamaicana
Setophaga citrina	mariquita-de-capuz
Setophaga ruticilla	mariquita-rabirruiva
Setophaga kirtlandii	mariquita-de-kirtland
Setophaga tigrina	mariquita-tigrina
Setophaga cerulea	mariquita-cerúlea
Setophaga americana	mariquita-americana
Setophaga pitiayumi	mariquita-de-dorso-oliváceo
Setophaga magnolia	mariquita-das-magnólias
Setophaga castanea	mariquita-castanha
Setophaga fusca	mariquita-ardente
Setophaga aestiva	mariquita-amarela
Setophaga petechia	mariquita-dos-mangais
Setophaga pensylvanica	mariquita-de-peito-avelã
Setophaga striata	mariquita-estriada
Setophaga caerulescens	mariquita-azul-de-garganta-preta
Setophaga palmarum	mariquita-das-palmeiras
Setophaga pityophila	mariquita-de-testa-olivácea
Setophaga pinus	mariquita-dos-pinheiros
Setophaga coronata	mariquita-coroada
Setophaga audubonii	mariquita-de-audubon
Setophaga goldmani	mariquita-de-coroa-amarela
Setophaga dominica	mariquita-de-garganta-amarela
Setophaga flavescens	mariquita-baamense
Setophaga vitellina	mariquita-das-caimão
Setophaga discolor	mariquita-das-pradarias
Setophaga adelaidae	mariquita-porto-riquenha
Setophaga subita	mariquita-de-barbuda
Setophaga delicata	mariquita-de-santa-lúcia
Setophaga graciae	mariquita-de-grace
Setophaga nigrescens	mariquita-cinzenta-de-garganta-preta
Setophaga townsendi	mariquita-de-townsend
Setophaga occidentalis	mariquita-eremita
Setophaga chrysoparia	mariquita-de-faces-douradas
Setophaga virens	mariquita-verde-de-garganta-preta
Myiothlypis luteoviridis	mariquita-citrina
Myiothlypis basilica	mariquita-de-santa-marta
Myiothlypis leucophrys	mariquita-de-sobrancelha-branca
Myiothlypis flaveola	mariquita-amarelada
Myiothlypis leucoblephara	mariquita-assobiadeira
Myiothlypis signata	mariquita-de-patas-claras
Myiothlypis nigrocristata	mariquita-de-crista-preta
Myiothlypis fulvicauda	mariquita-de-cauda-fulva
Myiothlypis rivularis	mariquita-ribeirinha

Myiothlypis bivittata	mariquita-de-banda-dupla
Myiothlypis roraimae	mariquita-do-roraima
Myiothlypis chrysogaster	mariquita-de-barriga-dourada
Myiothlypis chlorophrys	mariquita-do-chocó
Myiothlypis conspicillata	mariquita-de-loros-brancos
Myiothlypis cinereicollis	mariquita-de-garganta-cinzenta
Myiothlypis fraseri	mariquita-cinzenta-e-dourada
Myiothlypis coronata	mariquita-de-crista-ruiva
Myiothlypis griseiceps	mariquita-de-cabeça-cinzenta
Basileuterus lachrymosus	mariquita-cauda-de-leque
Basileuterus rufifrons	mariquita-de-cabeça-ruiva
Basileuterus delattrii	mariquita-de-cabeça-avelã
Basileuterus melanogenys	mariquita-de-coroa-castanha
Basileuterus ignotus	mariquita-do-pirre
Basileuterus belli	mariquita-de-sobrancelha-dourada
Basileuterus culicivorus	mariquita-de-coroa-dourada
Basileuterus melanotis	mariquita-costa-riquenha
Basileuterus tacarcunae	mariquita-do-tacarcuna
Basileuterus trifasciatus	mariquita-de-três-bandas
Basileuterus punctipectus	mariquita-dos-yungas
Basileuterus tristriatus	mariquita-trilistada
Cardellina canadensis	mariquita-canadiana
Cardellina pusilla	mariquita-de-barrete-preto
Cardellina rubrifrons	mariquita-de-face-vermelha
Cardellina rubra	mariquita-vermelha
Cardellina versicolor	mariquita-de-cabeça-rosada
Myioborus pictus	mariquita-pintada
Myioborus miniatus	mariquita-de-garganta-ardósia
Myioborus brunniceps	mariquita-de-barrete-castanho
Myioborus flavivertex	mariquita-de-barrete-amarelo
Myioborus albifrons	mariquita-de-testa-branca
Myioborus ornatus	mariquita-adornada
Myioborus melanocephalus	mariquita-d'óculos
Myioborus torquatus	mariquita-de-colar
Myioborus pariae	mariquita-de-paria
Myioborus albifacies	mariquita-de-faces-brancas
Myioborus cardonai	mariquita-do-guaiquinima
Myioborus castaneocapilla	mariquita-dos-tepuis

Mitrospingidae Tangará-de-faces-sombrias e afins

O agrupamento destas quatro espécies numa família própria está longe de ser intuitivo, resultando de análises genéticas. De resto, são parecidos a membros típicos da família dos tangarás (Thraupidae), à excepção talvez do tangará-de-bico-vermelho, com a sua plumagem preta e branca. São aves omnívoras, que ocorrem em bosques tropicais, e todas elas são bastante gregárias.

Espécies: 4

Distribuição: partes da América do Sul e Central

Mitrospingus cassinii	tangará-de-faces-sombrias
Mitrospingus oleagineus	tangará-de-dorso-oliváceo
Orthogonys chloricterus	tangará-verde-azeitona
Lamprospiza melanoleuca	tangará-de-bico-vermelho

Esta família sobrepõe-se largamente à família Thraupidae em aparência e ecologia, mas a sua distribuição está centrada no hemisfério norte e contém mais espécies migratórias. Aqui se incluem muitas espécies com o bico espesso e alimentação à base de sementes, como os azulões ou os realejos, mas também espécies com bicos mais finos e maior quantidade de insectos na dieta, como as pirangas ou os granatelos.

Espécies: 54

Distribuição: Américas, excepto nos extremos norte e sul

Piranga bidentata	piranga-estriada
Piranga lutea	piranga-serrana
Piranga flava	piranga-de-fogo
Piranga hepatica	piranga-hepática
Piranga rubra	piranga-vermelha
Piranga roseogularis	piranga-de-garganta-rosada
Piranga olivacea	piranga-escarlate
Piranga ludoviciana	piranga-ocidental
Piranga leucoptera	piranga-d'asa-branca
Piranga erythrocephala	piranga-de-cabeça-vermelha
Piranga rubriceps	piranga-de-capuz-vermelho
Habia rubica	tangará-de-coroa-vermelha
Driophlox fuscicauda	tangará-de-garganta-vermelha
Driophlox atrimaxillaris	tangará-costa-riquenho
Driophlox gutturalis	tangará-fuliginoso
Driophlox cristata	tangará-de-crista-vermelha
Chlorothraupis carmioli	tangará-de-carmiol
Chlorothraupis frenata	tangará-de-freio
Chlorothraupis olivacea	tangará-de-lunetas-amarelas
Chlorothraupis stolzmanni	tangará-de-peito-ocre
Pheucticus chrysopeplus	realejo-amarelo
Pheucticus tibialis	realejo-de-calções-pretos
Pheucticus chrysogaster	realejo-dourado
Pheucticus aureoventris	realejo-de-dorso-preto
Pheucticus ludovicianus	realejo-de-peito-rosado
Pheucticus melanocephalus	realejo-de-cabeça-preta
Granatellus venustus	granatelo-de-peito-vermelho
Granatellus sallaei	granatelo-de-garganta-cinzenta
Granatellus pelzelni	granatelo-de-peito-rosa
Granatellus paraensis	granatelo-do-pará
Cardinalis cardinalis	cardeal-nortenho
Cardinalis phoeniceus	cardeal-caribenho
Cardinalis sinuatus	cardeal-do-deserto
Caryothraustes poliogaster	bico-grosso-de-faces-pretas

Caryothraustes canadensis	bico-grosso-verde-amarelado
Periporphyrus celaeno	bico-grosso-carmesim
Periporphyrus erythromelas	bico-grosso-vermelho-e-preto
Amaurospiza concolor	sementeiro-azul
Amaurospiza aequatorialis	sementeiro-equatoriano
Amaurospiza moesta	sementeiro-azul-ferrete
Amaurospiza carrizalensis	sementeiro-de-carrizal
Spiza americana	savaneiro
Cyanoloxia glaucocaerulea	azulão-glauco
Cyanoloxia cyanoides	azulão-escuro
Cyanoloxia rothschildii	azulão-amazónico
Cyanoloxia brissonii	azulão-ultramarino
Cyanocompsa parellina	azulão-mexicano
Passerina caerulea	cardeal-real
Passerina cyanea	cardeal-azul
Passerina amoena	cardeal-lazúli
Passerina versicolor	cardeal-multicolor
Passerina ciris	cardeal-arco-íris
Passerina rositae	cardeal-de-barriga-rosado
Passerina leclancherii	cardeal-de-peito-laranja

Thraupidae — Tangarás, Tentilhões do Novo Mundo e afins

Esta vastíssima família abrange um conjunto de aves muito variadas em aparência em ecologia. Aqui se inclui a maioria dos tangarás, muitos deles de cores extraordinárias, que frequentam as copas da floresta tropical, em busca de frutos e insectos. Também aqui podem ser encontradas muitas espécies granívoras, denominadas tentilhões e canários pela sua semelhança superficial aos fringilídeos. São ainda parte dos Thraupidae os fura-flores, que "roubam" o néctar da base das flores sem contribuir para a polinização.

Espécies: 396

Distribuição: América do Sul e Central

Catamblyrhynchus diadema	tangará-felpudo
Charitospiza eucosma	tentilhão-chapim
Orchesticus abeillei	tangará-castanho
Parkerthraustes humeralis	bico-grosso-d'ombros-amarelos
Nemosia pileata	tangará-de-capuz-preto
Nemosia rourei	tangará-apunhalado
Cyanicterus cyanicterus	tangará-de-dorso-azul
Sericossypha albocristata	tangará-de-coroa-branca
Compsothraupis loricata	tangará-de-garganta-escarlate
Coryphaspiza melanotis	tentilhão-mascarado
Embernagra platensis	tentilhão-das-pampas
Embernagra longicauda	tentilhão-das-chapadas
Emberizoides ypiranganus	tentilhão-palustre
Emberizoides herbicola	tentilhão-de-cauda-graduada
Emberizoides duidae	tentilhão-do-duida
Incaspiza pulchra	tentilhão-inca-grande
Incaspiza personata	tentilhão-inca-de-dorso-ruivo
Incaspiza ortizi	tentilhão-inca-cinzento
Incaspiza laeta	tentilhão-inca-de-bigodes
Incaspiza watkinsi	tentilhão-inca-pequeno
Rhopospina fruticeti	tentilhão-de-peito-preto
Rhopospina caerulescens	tentilhão-do-cerrado
Rhopospina alaudina	tentilhão-de-cauda-bandada
Rhopospina carbonaria	tentilhão-carvoeiro
Chlorophanes spiza	dácnis-meleiro-verde
Iridophanes pulcherrimus	dácnis-meleiro-de-colar
Chrysothlypis salmoni	tangará-vermelho-e-branco
Chrysothlypis chrysomelas	tangará-preto-e-amarelo
Heterospingus rubrifrons	tangará-d'uropígio-amarelo
Heterospingus xanthopygius	tangará-de-sobrancelha-escarlate
Hemithraupis flavicollis	tangará-de-dorso-amarelo

Hemithraupis guira	tangará-guirá
Hemithraupis ruficapilla	tangará-ferrugíneo
Tersina viridis	tangará-andorinha
Cyanerpes caeruleus	dácnis-meleiro-violeta
Cyanerpes cyaneus	dácnis-meleiro-de-patas-vermelhas
Cyanerpes nitidus	dácnis-meleiro-de-bico-curto
Cyanerpes lucidus	dácnis-meleiro-reluzente
Dacnis berlepschi	dácnis-de-peito-escarlate
Dacnis venusta	dácnis-de-coxas-vermelhas
Dacnis cayana	dácnis-azul
Dacnis flaviventer	dácnis-de-barriga-amarela
Dacnis hartlaubi	dácnis-turquesa
Dacnis lineata	dácnis-de-faces-pretas
Dacnis egregia	dácnis-d'ombros-amarelos
Dacnis viguieri	dácnis-esverdeado
Dacnis nigripes	dácnis-de-patas-pretas
Dacnis albiventris	dácnis-de-barriga-branca
Saltatricula multicolor	saltador-do-chaco
Saltatricula atricollis	saltador-de-pescoço-preto
Saltator orenocensis	saltador-do-orinoco
Saltator similis	saltador-d'asa-verde
Saltator grandis	saltador-de-barriga-canela
Saltator olivascens	saltador-oliváceo
Saltator coerulescens	saltador-cinzento
Saltator striatipectus	saltador-listado
Saltator albicollis	saltador-das-antilhas
Saltator maximus	saltador-de-garganta-fulva
Saltator atripennis	saltador-d'asa-preta
Saltator atriceps	saltador-de-cabeça-preta
Saltator nigriceps	saltador-de-capuz
Saltator fuliginosus	saltador-de-garganta-preta
Saltator grossus	saltador-de-garganta-branca
Saltator cinctus	saltador-mascarado
Saltator maxillosus	saltador-de-bico-grosso
Saltator aurantiirostris	saltador-de-bico-dourado
Coereba flaveola	bananeiro
Tiaris olivaceus	sementeiro-de-faces-amarelas
Euneornis campestris	sementeiro-de-queixo-ruivo
Melopyrrha portoricensis	sementeiro-porto-riquenho
Melopyrrha grandis	sementeiro-de-são-cristóvão
Melopyrrha violacea	sementeiro-preto
Melopyrrha nigra	sementeiro-cubano
Melopyrrha taylori	sementeiro-da-grande-caimão
Loxipasser anoxanthus	sementeiro-jamaicano
Phonipara canora	sementeiro-canoro
Loxigilla barbadensis	sementeiro-barbadense
Loxigilla noctis	sementeiro-de-garganta-ruiva
Melanospiza richardsoni	sementeiro-de-santa-lúcia

Melanospiza bicolor	sementeiro-de-faces-pretas
Asemospiza fuliginosa	sementeiro-fuliginoso
Asemospiza obscura	sementeiro-pardo
Certhidea olivacea	tentilhão-felosa-oliváceo
Certhidea fusca	tentilhão-felosa-cinzento
Platyspiza crassirostris	tentilhão-vegetariano
Pinaroloxias inornata	tentilhão-do-coco
Camarhynchus heliobates	tentilhão-dos-mangais
Camarhynchus pauper	tentilhão-arbóreo-médio
Camarhynchus pallidus	tentilhão-pica-pau
Camarhynchus parvulus	tentilhão-arbóreo-pequeno
Camarhynchus psittacula	tentilhão-arbóreo-grande
Geospiza fuliginosa	tentilhão-terrestre-pequeno
Geospiza difficilis	tentilhão-terrestre-de-bico-agudo
Geospiza acutirostris	tentilhão-terrestre-da-genovesa
Geospiza septentrionalis	tentilhão-vampiro
Geospiza conirostris	tentilhão-dos-cactos-da-espanhola
Geospiza propinqua	tentilhão-dos-cactos-da-genovesa
Geospiza magnirostris	tentilhão-terrestre-grande
Geospiza scandens	tentilhão-dos-cactos-comum
Geospiza fortis	tentilhão-terrestre-médio
Volatinia jacarina	sementeiro-preto-e-azul
Conothraupis speculigera	tangará-alvinegro
Conothraupis mesoleuca	tangará-bicudo
Creurgops verticalis	tangará-de-coroa-ruiva
Creurgops dentatus	tangará-ardósia
Eucometis penicillata	tangará-de-cabeça-cinzenta
Trichothraupis melanops	tangará-de-lunetas-pretas
Heliothraupis oneilli	tangará-sol
Loriotus cristatus	tangará-de-crista-flamejante
Loriotus luctuosus	tangará-d'ombros-brancos
Loriotus rufiventer	tangará-de-crista-amarela
Coryphospingus pileatus	tentilhão-rei-cinzento
Coryphospingus cucullatus	tentilhão-rei-vermelho
Tachyphonus surinamus	tangará-de-crista-fulva
Tachyphonus delatrii	tangará-de-crista-laranja
Tachyphonus rufus	tangará-preto
Tachyphonus phoenicius	tangará-de-galões
Tachyphonus coronatus	tangará-de-coroa-rubi
Rhodospingus cruentus	tentilhão-carmesim
Lanio versicolor	tangará-versicolor
Lanio fulvus	tangará-fulvo
Lanio aurantius	tangará-de-garganta-preta
Lanio leucothorax	tangará-de-garganta-branca
Ramphocelus sanguinolentus	tangará-de-colar-vermelho
Ramphocelus flammigerus	tangará-d'uropígio-flamejante
Ramphocelus icteronotus	tangará-d'uropígio-limão
Ramphocelus passerinii	tangará-d'uropígio-escarlate

Ramphocelus bresilia	tangará-brasileiro
Ramphocelus dimidiatus	tangará-de-dorso-escarlate
Ramphocelus nigrogularis	tangará-mascarado
Ramphocelus melanogaster	tangará-do-huallaga
Ramphocelus carbo	tangará-de-bico-prateado
Sporophila bouvronides	sementeiro-de-lesson
Sporophila lineola	sementeiro-de-bigodes
Sporophila torqueola	sementeiro-d'uropígio-canela
Sporophila morelleti	sementeiro-de-colar-branco
Sporophila corvina	sementeiro-variável
Sporophila intermedia	sementeiro-cinzento
Sporophila americana	sementeiro-d'asa-barrada
Sporophila fringilloides	sementeiro-de-nuca-branca
Sporophila murallae	sementeiro-de-caquetá
Sporophila luctuosa	sementeiro-alvinegro
Sporophila caerulescens	sementeiro-de-colar-duplo
Sporophila nigricollis	sementeiro-de-barriga-amarela
Sporophila ardesiaca	sementeiro-de-dubois
Sporophila funerea	sementeiro-de-bico-grosso
Sporophila angolensis	sementeiro-de-barriga-castanha
Sporophila nuttingi	sementeiro-nicaraguense
Sporophila maximiliani	sementeiro-de-maximilian
Sporophila crassirostris	sementeiro-de-bico-grande
Sporophila atrirostris	sementeiro-de-bico-preto
Sporophila schistacea	sementeiro-ardósia
Sporophila falcirostris	sementeiro-cigarra
Sporophila frontalis	sementeiro-de-testa-fulva
Sporophila plumbea	sementeiro-plúmbeo
Sporophila beltoni	sementeiro-das-araucárias
Sporophila collaris	sementeiro-ferrugíneo-de-colar
Sporophila albogularis	sementeiro-de-garganta-branca
Sporophila leucoptera	sementeiro-de-barriga-branca
Sporophila peruviana	sementeiro-bico-de-papagaio
Sporophila telasco	sementeiro-de-garganta-avelã
Sporophila simplex	sementeiro-simples
Sporophila castaneiventris	sementeiro-de-peito-castanho
Sporophila minuta	sementeiro-de-peito-ruivo
Sporophila bouvreuil	sementeiro-acobreado
Sporophila nigrorufa	sementeiro-preto-e-ruivo
Sporophila hypoxantha	sementeiro-de-barriga-ruiva
Sporophila ruficollis	sementeiro-de-garganta-preta
Sporophila iberaensis	sementeiro-de-iberá
Sporophila pileata	sementeiro-de-barrete
Sporophila hypochroma	sementeiro-d'uropígio-ruivo
Sporophila cinnamomea	sementeiro-castanho
Sporophila palustris	sementeiro-palustre
Sporophila melanogaster	sementeiro-de-barriga-preta
Piezorina cinerea	tentilhão-cinzento

Xenospingus concolor	tentilhão-de-bico-fino
Cnemoscopus rubrirostris	tangará-de-capuz-cinzento
Cnemoscopus chrysogaster	tangará-de-bico-preto
Pseudospingus verticalis	hemispingo-de-cabeça-preta
Pseudospingus xanthophthalmus	hemispingo-modesto
Poospiza boliviana	monteirinha-boliviana
Poospiza ornata	monteirinha-canela
Poospiza nigrorufa	monteirinha-quem-te-vestiu
Poospiza whitii	monteirinha-preta-e-ruiva
Poospiza hispaniolensis	monteirinha-do-pacífico
Poospiza rubecula	monteirinha-de-peito-ruivo
Poospiza baeri	monteirinha-de-tucumão
Poospiza garleppi	monteirinha-de-cochabamba
Poospiza goeringi	hemispingo-de-dorso-cinzento
Poospiza rufosuperciliaris	hemispingo-de-sobrancelha-ruiva
Kleinothraupis reyi	hemispingo-de-coroa-cinzenta
Kleinothraupis atropileus	hemispingo-de-coroa-preta
Kleinothraupis auricularis	hemispingo-de-sobrancelha-branca
Kleinothraupis calophrys	hemispingo-de-sobrancelha-laranja
Kleinothraupis parodii	hemispingo-de-parodi
Sphenopsis frontalis	hemispingo-oleaginoso
Sphenopsis melanotis	hemispingo-d'orelhas-pretas
Sphenopsis ochracea	hemispingo-ocráceo
Sphenopsis piurae	hemispingo-de-piura
Thlypopsis fulviceps	tangará-de-cabeça-fulva
Thlypopsis inornata	tangará-simples
Thlypopsis sordida	tangará-de-cabeça-laranja
Thlypopsis pyrrhocoma	tangará-de-cabeça-castanha
Thlypopsis ruficeps	tangará-amarelo-e-ruivo
Thlypopsis superciliaris	hemispingo-de-testa-cinzenta
Thlypopsis ornata	tangará-de-peito-laranja
Thlypopsis pectoralis	tangará-de-flancos-castanhos
Castanozoster thoracicus	monteirinha-de-colete
Donacospiza albifrons	tentilhão-dos-caniços
Cypsnagra hirundinacea	tangará-d'uropígio-branco
Poospizopsis hypocondria	monteirinha-de-flancos-ruivos
Poospizopsis caesar	monteirinha-de-peito-castanho
Urothraupis stolzmanni	tangará-de-stolzmann
Nephelornis oneilli	tangará-pardusco
Microspingus lateralis	monteirinha-de-garganta-fulva
Microspingus cabanisi	monteirinha-de-garganta-cinzenta
Microspingus erythrophrys	monteirinha-de-sobrancelha-ruiva
Microspingus alticola	monteirinha-de-cajamarca
Microspingus torquatus	monteirinha-de-coleira
Microspingus trifasciatus	hemispingo-trilistado
Microspingus melanoleucus	monteirinha-de-cabeça-preta
Microspingus cinereus	monteirinha-cinzenta
Conirostrum margaritae	figuinha-ribeirinha

Conirostrum bicolor	figuinha-bicolor
Conirostrum speciosum	figuinha-de-crisso-castanho
Conirostrum leucogenys	figuinha-d'orelhas-brancas
Conirostrum albifrons	figuinha-de-barrete
Conirostrum binghami	figuinha-gigante
Conirostrum sitticolor	figuinha-de-dorso-azul
Conirostrum ferrugineiventre	figuinha-de-sobrancelha-branca
Conirostrum tamarugense	figuinha-do-tamarugal
Conirostrum rufum	figuinha-de-sobrancelha-ruiva
Conirostrum cinereum	figuinha-cinzenta
Sicalis citrina	canário-citrino
Sicalis taczanowskii	canário-de-tumbes
Sicalis uropygialis	canário-d'uropígio-brilhante
Sicalis flaveola	canário-açafrão
Sicalis columbiana	canário-de-testa-laranja
Sicalis luteola	canário-das-pradarias
Sicalis luteocephala	canário-de-cabeça-amarela
Sicalis lebruni	canário-patagónico
Sicalis olivascens	canário-oliváceo
Sicalis mendozae	canário-de-mendoza
Sicalis auriventris	canário-grande
Sicalis raimondii	canário-de-raimondi
Sicalis lutea	canário-da-puna
Phrygilus gayi	tentilhão-de-cabeça-cinzenta
Phrygilus patagonicus	tentilhão-patagónico
Phrygilus atriceps	tentilhão-de-capuz
Phrygilus punensis	tentilhão-peruano
Nesospiza acunhae	tentilhão-da-inacessível
Nesospiza wilkinsi	tentilhão-de-wilkins
Nesospiza questi	tentilhão-de-nightingale
Rowettia goughensis	tentilhão-de-gough
Melanodera melanodera	tentilhão-de-rédeas-brancas
Melanodera xanthogramma	tentilhão-de-rédeas-amarelas
Geospizopsis plebejus	tentilhão-de-peito-cinzento
Geospizopsis unicolor	tentilhão-plúmbeo
Haplospiza unicolor	tentilhão-unicolor
Haplospiza rustica	tentilhão-ardósia
Acanthidops bairdi	tentilhão-de-bico-pontiagudo
Xenodacnis petersi	dácnis-estriado
Xenodacnis parina	dácnis-andino
Idiopsar dorsalis	tentilhão-de-dorso-ruivo
Idiopsar erythronotus	tentilhão-de-garganta-branca
Idiopsar speculifer	tentilhão-dos-glaciares
Idiopsar brachyurus	tentilhão-das-rochas
Catamenia analis	sementeiro-de-cauda-bandada
Catamenia inornata	sementeiro-andino
Catamenia homochroa	sementeiro-do-páramo
Diglossa glauca	fura-flor-d'olho-amarelo

Diglossa caerulescens	fura-flor-azulado
Diglossa cyanea	fura-flor-de-mascarilha
Diglossa melanopis	fura-flor-inca
Diglossa indigotica	fura-flor-índigo
Diglossa sittoides	fura-flor-ferrugíneo
Diglossa plumbea	fura-flor-ardósia
Diglossa baritula	fura-flor-de-barriga-canela
Diglossa mystacalis	fura-flor-de-bigodes
Diglossa lafresnayii	fura-flor-reluzente
Diglossa gloriosissima	fura-flor-de-barriga-ruiva
Diglossa duidae	fura-flor-do-duida
Diglossa major	fura-flor-grande
Diglossa venezuelensis	fura-flor-venezuelano
Diglossa albilatera	fura-flor-de-flancos-brancos
Diglossa carbonaria	fura-flor-carvoeiro
Diglossa brunneiventris	fura-flor-de-garganta-preta
Diglossa gloriosa	fura-flor-de-mérida
Diglossa humeralis	fura-flor-preto
Calochaetes coccineus	tangará-vermelhão
Iridosornis porphyrocephalus	tangará-de-dorso-violáceo
Iridosornis analis	tangará-de-garganta-amarela
Iridosornis jelskii	tangará-de-colar-dourado
Iridosornis reinhardti	tangará-de-reinhardt
Iridosornis rufivertex	tangará-de-coroa-dourada
Pipraeidea melanonota	tangará-de-peito-bege
Rauenia bonariensis	tangará-azul-e-amarelo
Pseudosaltator rufiventris	falso-saltador-de-barriga-ruiva
Dubusia carrikeri	tangará-de-carriker
Dubusia taeniata	tangará-de-peito-fulvo
Dubusia stictocephala	tangará-de-coroa-estriada
Dubusia castaneoventris	tangará-de-barriga-castanha
Buthraupis montana	tangará-serrano-de-capuz
Sporathraupis cyanocephala	tangará-de-cabeça-azul
Tephrophilus wetmorei	tangará-serrano-mascarado
Chlorornis riefferii	tangará-papagaio
Cnemathraupis eximia	tangará-de-peito-preto
Cnemathraupis aureodorsalis	tangará-de-dorso-dourado
Anisognathus somptuosus	tangará-d'asa-azul
Anisognathus notabilis	tangará-de-queixo-preto
Anisognathus melanogenys	tangará-de-santa-marta
Anisognathus igniventris	tangará-de-barriga-escarlate
Anisognathus lacrymosus	tangará-lacrimoso
Chlorochrysa phoenicotis	tangará-verde-brilhante
Chlorochrysa nitidissima	tangará-multicolor
Chlorochrysa calliparaea	tangará-d'orelhas-laranja
Wetmorethraupis sterrhopteron	tangará-de-garganta-laranja
Bangsia flavovirens	tangará-verde-e-amarelo
Bangsia arcaei	tangará-azul-e-dourado

Bangsia aureocincta	tangará-de-anel-dourado
Bangsia edwardsi	tangará-de-dorso-verde
Bangsia rothschildi	tangará-de-peito-dourado
Bangsia melanochlamys	tangará-preto-e-dourado
Lophospingus griseocristatus	tentilhão-soldadinho-cinzento
Lophospingus pusillus	tentilhão-soldadinho-do-chaco
Neothraupis fasciata	tangará-picanço
Diuca diuca	tentilhão-diuca
Gubernatrix cristata	cardeal-amarelo
Stephanophorus diadematus	tangará-diademado
Cissopis leverianus	tangará-pega
Schistochlamys melanopis	tangará-de-face-preta
Schistochlamys ruficapillus	tangará-canela
Paroaria coronata	cardeal-de-crista-vermelha
Paroaria dominicana	cardeal-nordestino
Paroaria baeri	cardeal-de-testa-vermelha
Paroaria capitata	cardeal-de-bico-amarelo
Paroaria nigrogenis	cardeal-mascarado
Paroaria gularis	cardeal-amazónico
Ixothraupis varia	tangará-pontilhado
Ixothraupis rufigula	tangará-de-garganta-ruiva
Ixothraupis punctata	tangará-pintalgado
Ixothraupis guttata	tangará-manchado
Ixothraupis xanthogastra	tangará-de-barriga-amarela
Chalcothraupis ruficervix	tangará-de-nuca-dourada
Poecilostreptus cabanisi	tangará-de-chiapas
Poecilostreptus palmeri	tangará-platinado
Thraupis episcopus	tangará-azulejo
Thraupis sayaca	tangará-saiaca
Thraupis glaucocolpa	tangará-glauco
Thraupis cyanoptera	tangará-d'ombros-azuis
Thraupis abbas	tangará-d'asa-amarela
Thraupis ornata	tangará-d'ombros-dourados
Thraupis palmarum	tangará-das-palmeiras
Stilpnia cyanoptera	tangará-de-cabeça-preta
Stilpnia whitelyi	tangará-de-whitely
Stilpnia viridicollis	tangará-prateado
Stilpnia phillipsi	tangará-de-sira
Stilpnia argyrofenges	tangará-cor-de-palha
Stilpnia heinei	tangará-de-coroa-preta
Stilpnia larvata	tangará-de-cabeça-dourada
Stilpnia cyanicollis	tangará-de-pescoço-azul
Stilpnia nigrocincta	tangará-azul-mascarado
Stilpnia peruviana	tangará-de-dorso-preto
Stilpnia preciosa	tangará-de-dorso-castanho
Stilpnia meyerdeschauenseei	tangará-de-coroa-verde
Stilpnia vitriolina	tangará-do-mato
Stilpnia cayana	tangará-isabel

Stilpnia cucullata	tangará-granadino
Tangara vassorii	tangará-azul-e-preto
Tangara nigroviridis	tangará-de-lantejoulas
Tangara dowii	tangará-de-faces-salpicadas
Tangara fucosa	tangará-de-nuca-verde
Tangara cyanotis	tangará-de-sobrancelha-azul
Tangara rufigenis	tangará-de-faces-ruivas
Tangara labradorides	tangará-verde-metálico
Tangara gyrola	tangará-de-cabeça-baia
Tangara lavinia	tangará-d'asa-ruiva
Tangara chrysotis	tangará-d'orelhas-douradas
Tangara xanthocephala	tangará-de-coroa-açafrão
Tangara parzudakii	tangará-de-faces-vermelhas
Tangara johannae	tangará-de-bigodes-azuis
Tangara schrankii	tangará-verde-e-dourado
Tangara arthus	tangará-dourado
Tangara florida	tangará-esmeralda
Tangara icterocephala	tangará-de-garganta-prateada
Tangara fastuosa	tangará-de-sete-cores
Tangara seledon	tangará-de-cabeça-turquesa
Tangara cyanocephala	tangará-de-pescoço-vermelho
Tangara desmaresti	tangará-de-desmarest
Tangara cyanoventris	tangará-de-pontas-douradas
Tangara inornata	tangará-cinzento
Tangara mexicana	tangará-turquesa
Tangara brasiliensis	tangará-de-barriga-branca
Tangara chilensis	tangará-do-paraíso
Tangara callophrys	tangará-opalino
Tangara velia	tangará-diamante