AVES DO MUNDO

UMA LISTA ILUSTRADA

VOLUME 1 - NÃO PASSERIFORMES

5ª EDIÇÃO
IOC 15.2

AVES DO MUNDO PT

Struthionidae Avestruzes

Aves de grandes dimensões, sendo na verdade as aves vivas mais pesadas de todo o planeta. Põem os maiores ovos de qualquer espécie terrestre (não extinta). Não voam, mas conseguem correr a 70 km/h, o que faz delas as aves mais rápidas em terra. São frequentemente criadas para consumo humano, tanto pela carne, como pelas penas.

Espécies: 2

Distribuição: África subsariana



Figura 1 - avestruz-somali *Struthio molybdophanes*

(Foto: Luís Custódia – Quénia)

Struthio camelus	avestruz-comum
Struthio molybdophanes	avestruz-somali

Rheidae **Nandus**

Os nandus são as maiores aves da América do Sul, sendo incapazes de voar, mas excelentes corredores. Ocupam habitats abertos e secos desde o Nordeste brasileiro até à Patagónia. São os machos de nandu que preparam o ninho, incubam os ovos e acompanham as crias no seu crescimento, ao contrário do que acontece na grande maioria das aves.

Espécies: 2

Distribuição: Metade sul da América do Sul



Figura 2 - nandu-pequeno *Rhea pennata*

(Foto: Luís Custódia – Argentina)

Rhea americana	nandu-comum
Rhea pennata	nandu-pequeno

Apterygidae Kiwis

Considerados as aves nacionais da Nova Zelândia, os kiwis fazem lembrar mamíferos, com a sua plumagem densa e acastanhada, incapacidade de voar e um olfacto extremamente apurado. Alimentam-se de invertebrados que procuram no solo com o seu bico longo e sensível. Os kiwis são também as aves que põem os maiores ovos do mundo em proporção à sua dimensão. Todas as espécies se encontram ameaçadas pela destruição de habitat e introdução de mamíferos alóctones.

Espécies: 5

Distribuição: Nova Zelândia



Figura 3 - kiwi-malhado-pequeno *Apteryx owenii*

(Foto: Adam Riley / rockjumperbirding.com – Nova Zelândia)

Apteryx australis	kiwi-do-sul
Apteryx mantelli	kiwi-do-norte
Apteryx rowi	kiwi-de-okarito
Apteryx owenii	kiwi-malhado-pequeno
Apteryx maxima	kiwi-malhado-grande

Casuariidae Casuares e Emu

Estas são aves de grandes dimensões e sem capacidade de voo. As sua cabeça e parte do pescoço são desprovidos de penas e apresentam a pele colorida. O emu é omnívoro e ocupa zonas abertas da Austrália, enquanto os casuares são frugívoros e ocorrem em florestas tropicais da Papua e do norte da Austrália. Os casuares são as únicas aves que usam infra-sons para comunicação.

Espécies: 4

Distribuição: Austrália e Papua



Figura 4 - casuar-do-sul *Casuarius casuarius*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Casuarius casuarius	casuar-do-sul
Casuarius bennetti	casuar-anão
Casuarius unappendiculatus	casuar-do-norte
Dromaius novaehollandiae	emu

Embora capazes de voar, os tinamus são aves crípticas e de hábitos terrestres, mais frequentemente detectadas pelos seus fortes chamamentos. Tal como nos nandus, são os machos que estão principalmente envolvidos no cuidado do ninho e das crias. As fêmeas põem ovos reluzentes e com uma grande variedade de cores.

Espécies: 46

Distribuição: América do Sul e Central



Figura 5 - tinamu-grande *Tinamus major*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Tinamus tao	tinamu-cinzento
Tinamus solitarius	tinamu-solitário
Tinamus osgoodi	tinamu-preto
Tinamus major	tinamu-grande
Tinamus guttatus	tinamu-pintalgado
Nothocercus bonapartei	tinamu-serrano
Nothocercus julius	tinamu-de-peito-ruivo
Nothocercus nigrocapillus	tinamu-de-capuz
Crypturellus berlepschi	tinamu-escuro
Crypturellus cinereus	tinamu-sombrio

Crypturellus soui	tinamu-pequeno
Crypturellus ptaritepui	tinamu-dos-tepuis
Crypturellus obsoletus	tinamu-castanho
Crypturellus undulatus	tinamu-ondulado
Crypturellus transfasciatus	tinamu-de-sobrancelha
Crypturellus strigulosus	tinamu-relógio
Crypturellus duidae	tinamu-de-patas-cinzentas
Crypturellus erythropus	tinamu-de-patas-vermelhas
Crypturellus noctivagus	tinamu-de-patas-amarelas
Crypturellus atrocapillus	tinamu-de-barrete
Crypturellus cinnamomeus	tinamu-do-bosque
Crypturellus boucardi	tinamu-ardósia
Crypturellus kerriae	tinamu-do-chocó
Crypturellus variegatus	tinamu-variegado
Crypturellus brevirostris	tinamu-ferruginoso-oriental
Crypturellus bartletti	tinamu-ferruginoso-ocidental
Crypturellus parvirostris	tinamu-de-bico-curto
Crypturellus casiquiare	tinamu-do-cassiquiare
Crypturellus tataupa	tinamu-tataupá
Rhynchotus rufescens	tinamu-d'asa-ruiva
Rhynchotus maculicollis	tinamu-boliviano
Nothoprocta taczanowskii	tinamu-de-taczanowski
Nothoprocta ornata	tinamu-adornado
Nothoprocta perdicaria	tinamu-chileno
Nothoprocta cinerascens	tinamu-do-mato
Nothoprocta pentlandii	tinamu-andino
Nothoprocta curvirostris	tinamu-do-páramo
Nothura boraquira	tinamu-de-barriga-branca
Nothura minor	tinamu-mineiro
Nothura darwinii	tinamu-de-darwin
Nothura maculosa	tinamu-malhado
Taoniscus nanus	tinamu-anão
Eudromia elegans	tinamu-elegante
Eudromia formosa	tinamu-do-chaco
Tinamotis pentlandii	tinamu-da-puna
Tinamotis ingoufi	tinamu-patagónico

Anhimidae Anhumas

As anhumas são aves herbívoras de grande dimensão, que podem ser avistadas nas margens de rios, lagos e zonas pantanosas. Têm um aspecto bizarro e algo pré-histórico, devido ao contraste da sua pequena cabeça com as patas possantes e ao esporão que apresentam na articulação da asa, usado em lutas territoriais.

Espécies: 3

Distribuição: América do Sul



Figura 6 - anhuma-do-sul *Chauna torquata*

(Foto: Tiago Guerreiro - Brasil)

Anhima cornuta	anhuma-cornuda
Chauna chavaria	anhuma-do-norte
Chauna torquata	anhuma-do-sul

Anseranatidae **Ganso-pega**

Este ganso tem um aspecto distintivo, com as suas pernas compridas, que denunciam a sua pertença a uma família diferente de todos os outros gansos, os quais estão na família Anatidae. Esta espécie é herbívora, ocorrendo em zonas húmidas de água doce. Nidifica em colónias de grandes dimensões.

Espécies: 1

Distribuição: Austrália e Papua



Figura 7 - ganso-pega *Anseranas semipalmata*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Anseranas semipalmata ganso-pega

Anatidae Patos, Gansos e Cisnes

Esta família de aves aquáticas inclui os patos, os gansos e os cisnes. Estas aves conseguem nadar, flutuar na superfície da água e, nalguns casos, mergulhar. A maioria das espécies é herbívora e muitas são migradoras. Algumas espécies foram domesticadas pelo Homem e muitas outras são caçadas para alimentação ou por desporto. Pelo menos cinco espécies extinguiram-se desde 1600.

Espécies: 174

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida



Figura 8 - dendrocisne-de-barriga-preta *Dendrocygna autumnalis*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Dendrocygna viduata	dendrocisne-de-faces-brancas
Dendrocygna autumnalis	dendrocisne-de-barriga-preta
Dendrocygna guttata	dendrocisne-malhado
Dendrocygna arborea	dendrocisne-arbóreo
Dendrocygna bicolor	dendrocisne-bicolor
Dendrocygna eytoni	dendrocisne-australiano
Dendrocygna arcuata	dendrocisne-nómada
Dendrocygna javanica	dendrocisne-javanês
Thalassornis leuconotus	pato-de-dorso-branco

Cereopsis novaehollandiae	ganso-cinzento-australiano
Branta bernicla	ganso-de-faces-pretas
Branta ruficollis	ganso-de-peito-ruivo
Branta sandvicensis	ganso-havaiano
Branta canadensis	ganso-do-canadá
Branta leucopsis	ganso-de-faces-brancas



Figura 9 - ganso-de-faces-brancas *Branta leucopsis*

(Foto: José Frade – Finlândia)

Branta hutchinsii	ganso-palrador
Anser indicus	ganso-de-cabeça-listada
Anser canagicus	ganso-imperador
Anser rossii	ganso-de-ross
Anser caerulescens	ganso-das-neves
Anser anser	ganso-bravo
Anser cygnoides	ganso-chinês
Anser fabalis	ganso-campestre
Anser brachyrhynchus	ganso-de-bico-curto
Anser serrirostris	ganso-da-tundra
Anser albifrons	ganso-grande-de-testa-branca
Anser erythropus	ganso-pequeno-de-testa-branca
Coscoroba coscoroba	cisne-de-coscoroba
Cygnus atratus	cisne-preto

Cygnus melancoryphus	cisne-de-pescoço-preto
Cygnus olor	cisne-mudo
Cygnus buccinator	cisne-trombeteiro
Cygnus columbianus	cisne-pequeno
Cygnus cygnus	cisne-bravo
Stictonetta naevosa	pato-pedrês
Hymenolaimus malacorhynchos	pato-azul-maori
Tachyeres patachonicus	pato-vapor-voador
Tachyeres pteneres	pato-vapor-de-magalhães
Tachyeres brachypterus	pato-vapor-das-malvinas
Tachyeres leucocephalus	pato-vapor-de-cabeça-branca
Merganetta armata	pato-das-torrentes
Plectropterus gambensis	pato-ferrão
Sarkidiornis sylvicola	pato-de-carúncula-americano
Sarkidiornis melanotos	pato-de-carúncula-afroasiático
Cyanochen cyanoptera	ganso-d'asa-azul
Alopochen aegyptiaca	ganso-do-egipto
Alopochen mauritiana	ganso-das-maurícias
Alopochen kervazoi	ganso-da-reunião
Neochen jubata	ganso-do-orinoco
Chloephaga melanoptera	ganso-andino
Chloephaga picta	ganso-patagónico
Chloephaga hybrida	ganso-papa-algas
Chloephaga poliocephala	ganso-de-cabeça-cinzenta
Chloephaga rubidiceps	ganso-de-cabeça-ruiva
Radjah radjah	tadorna-da-oceânia
Tadorna tadorna	tadorna-branca
Tadorna ferruginea	tadorna-ferrugínea
Tadorna cana	tadorna-sul-africana
Tadorna tadornoides	tadorna-australiana
Tadorna variegata	tadorna-maori
Tadorna cristata	tadorna-de-crista
Malacorhynchus membranaceus	pato-d'orelhas-rosadas
Salvadorina waigiuensis	pato-da-papua
Cairina moschata	pato-mudo
Asarcornis scutulata	pato-d'asa-branca
Pteronetta hartlaubii	pato-de-hartlaub
Aix sponsa	pato-carolino
Aix galericulata	pato-mandarim
Chenonetta jubata	pato-de-crina
Nettapus auritus	ganso-pigmeu-africano
Nettapus coromandelianus	ganso-pigmeu-asiático
Nettapus pulchellus	ganso-pigmeu-australiano
Amazonetta brasiliensis	marrequinha-brasileira
Callonetta leucophrys	marrequinha-de-coleira
Lophonetta specularioides	pato-de-poupa-andino
Speculanas specularis	pato-de-lunetas
Sibirionetta formosa	marrequinha-formosa

Spatula querquedula	marreco
Spatula hottentota	marrequinha-de-bico-azul
Spatula puna	marrequinha-da-puna



Figura 10 - marrequinha-da-puna *Spatula puna*

(Foto: João Pereira - Peru)

Spatula versicolor	marrequinha-multicolor
Spatula platalea	pato-trombeteiro-ruivo
Spatula cyanoptera	marrequinha-canela
Spatula discors	pato-d'asa-azul
Spatula smithii	pato-trombeteiro-do-cabo
Spatula rhynchotis	pato-trombeteiro-da-oceânia
Spatula clypeata	pato-trombeteiro-comum
Mareca strepera	frisada
Mareca falcata	pato-falcado
Mareca penelope	piadeira-europeia
Mareca sibilatrix	piadeira-patagónica
Mareca americana	piadeira-americana
Mareca marecula	piadeira-de-amesterdão
Anas sparsa	pato-preto-africano
Anas undulata	pato-de-bico-amarelo
Anas melleri	pato-malgaxe
Anas superciliosa	pato-de-sobrancelhas
Anas laysanensis	pato-de-laysan

Anas wyvilliana	pato-havaiano
Anas luzonica	pato-filipino
Anas poecilorhyncha	pato-de-bico-pintado-indiano
Anas zonorhyncha	pato-de-bico-pintado-chinês
Anas platyrhynchos	pato-real
Anas fulvigula	pato-da-flórida
Anas rubripes	pato-sombrio
Anas diazi	pato-mexicano
Anas capensis	marrequinha-do-cabo
Anas bahamensis	arrabio-de-faces-brancas
Anas erythrorhyncha	marrequinha-de-bico-vermelho
Anas georgica	arrabio-de-bico-amarelo
Anas eatoni	arrabio-de-eaton
Anas acuta	arrabio-comum
Anas crecca	marrequinha-eurasiática
Anas carolinensis	marrequinha-americana
Anas flavirostris	marrequinha-de-bico-amarelo
Anas andium	marrequinha-andina
Anas gibberifrons	marrequinha-das-sundas
Anas albogularis	marrequinha-das-andamão
Anas theodori	marrequinha-das-maurícias
Anas gracilis	marrequinha-cinzenta
Anas castanea	marrequinha-castanha
Anas bernieri	marrequinha-malgaxe
Anas chlorotis	marrequinha-maori
Anas aucklandica	marrequinha-das-auckland
Anas nesiotis	marrequinha-das-campbell
Marmaronetta angustirostris	pardilheira
Rhodonessa caryophyllacea	pato-de-cabeça-rosa
Netta rufina	pato-de-bico-vermelho
Netta peposaca	zarro-patagónico
Netta erythrophthalma	zarro-meridional
Aythya valisineria	zarro-grande
Aythya americana	zarro-americano
Aythya ferina	zarro-comum
Aythya australis	zarro-australiano
Aythya innotata	zarro-malgaxe
Aythya baeri	zarro-de-baer
Aythya nyroca	zarro-castanho
Aythya novaeseelandiae	zarro-maori
Aythya collaris	zarro-de-colar
Aythya fuligula	zarro-negrinha

Aythya marila	zarro-bastardo
Aythya affinis	zarro-pequeno
Polysticta stelleri	êider-de-steller
Somateria fischeri	êider-de-lunetas
Somateria spectabilis	êider-real
Somateria mollissima	êider-comum
Histrionicus histrionicus	pato-arlequim
Camptorhynchus labradorius	pato-do-labrador
Melanitta perspicillata	negrola-de-lunetas
Melanitta fusca	negrola-d'asa-branca
Melanitta deglandi	negrola-ocidental
Melanitta stejnegeri	negrola-siberiana
Melanitta nigra	negrola-preta
Melanitta americana	negrola-americana
Clangula hyemalis	pato-rabilongo
Bucephala albeola	pato-de-touca-branca
Bucephala clangula	pato-d'olho-dourado
Bucephala islandica	pato-islandês
Mergellus albellus	merganso-pequeno
Lophodytes cucullatus	merganso-capuchinho



Figura 11 - merganso-pequeno *Mergellus albellus*

(Foto: José Frade – Finlândia)

Mergus australis	merganso-das-auckland
Mergus octosetaceus	merganso-brasileiro
Mergus merganser	merganso-grande
Mergus serrator	merganso-de-poupa
Mergus squamatus	merganso-chinês
Heteronetta atricapilla	marrequinha-de-cabeça-preta
Nomonyx dominicus	pato-mascarado
Oxyura jamaicensis	pato-de-rabo-alçado-americano
Oxyura ferruginea	pato-de-rabo-alçado-andino
Oxyura vittata	pato-de-rabo-alçado-patagónico
Oxyura australis	pato-de-rabo-alçado-australiano
Oxyura maccoa	pato-de-rabo-alçado-africano
Oxyura leucocephala	pato-de-rabo-alçado-europeu
Biziura lobata	pato-de-rabo-alçado-almiscarado




Figura 12 - tadorna-branca *Tadorna tadorna*

(Foto: José Frade – Portugal)

Estas aves omnívoras de média dimensão habitam principalmente em florestas tropicais. Preparam cuidadosamente montículos de matéria orgânica onde enterram os ovos, sendo a incubação feita pelo calor da matéria circundante e não pelos progenitores. *Megapodius* significa "pés gigantes", aludindo aos seus fortes pés e patas, que as crias usam para quebrar a casca do ovo ao eclodir.

Espécies: 21

Distribuição: Filipinas, Austrália e parte do arquipélago indo-malaio



Figura 13 - peru-do-mato-australiano *Alectura lathami*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Alectura lathami	peru-do-mato-australiano
Aepypodius arfakianus	peru-do-mato-de-cabeça-azul
Aepypodius bruijnii	peru-do-mato-de-waigeo
Talegalla cuvieri	peru-do-mato-de-bico-vermelho
Talegalla fuscirostris	peru-do-mato-de-bico-preto
Talegalla jobiensis	peru-do-mato-de-patas-vermelhas
Leipoa ocellata	peru-do-mato-ocelado
Macrocephalon maleo	peru-do-mato-de-capacete
Eulipoa wallacei	frango-do-mato-das-molucas

Megapodius pritchardii	frango-do-mato-de-tonga
Megapodius laperouse	frango-do-mato-micronésio
Megapodius nicobariensis	frango-do-mato-de-nicobar
Megapodius cumingii	frango-do-mato-filipino
Megapodius bernsteinii	frango-do-mato-das-sula
Megapodius tenimberensis	frango-do-mato-das-tanimbar
Megapodius freycinet	frango-do-mato-escuro
Megapodius geelvinkianus	frango-do-mato-de-biak
Megapodius eremita	frango-do-mato-eremita
Megapodius layardi	frango-do-mato-de-vanuatu
Megapodius decollatus	frango-do-mato-da-papua
Megapodius reinwardt	frango-do-mato-de-reinwardt

Cracidae Chachalacas, Guanos e Mutuns

As aves desta família, embora geralmente não muito vistosas, são análogas aos faisões do Velho Mundo, percorrendo as florestas da América tropical em busca de frutos, sementes e folhas. Também como no caso dos faisões, são historicamente caçadas para consumo humano, tendo isso contribuído para a sua timidez e para o grave estatuto de conservação em que muitas espécies se encontram.

Espécies: 57

Distribuição: América do Sul e Central



Figura 14 - chachalaca-de-cabeça-cinzenta *Ortalis cinereiceps*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Ortalis vetula	chachalaca-do-norte
Ortalis cinereiceps	chachalaca-de-cabeça-cinzenta
Ortalis garrula	chachalaca-d'asa-castanha
Ortalis ruficauda	chachalaca-de-crisso-ruivo
Ortalis erythroptera	chachalaca-de-cabeça-ruiva
Ortalis wagleri	chachalaca-de-barriga-ruiva
Ortalis poliocephala	chachalaca-mexicana
Ortalis canicollis	chachalaca-do-chaco
Ortalis leucogastra	chachalaca-de-barriga-branca

Ortalis guttata	chachalaca-pintada
Ortalis araucuan	chachalaca-nordestina
Ortalis squamata	chachalaca-escamosa
Ortalis columbiana	chachalaca-colombiana
Ortalis motmot	chachalaca-pequena
Ortalis ruficeps	chachalaca-paraense
Ortalis superciliaris	chachalaca-de-sobrancelhas
Penelope argyrotis	guano-de-cauda-barrada
Penelope barbata	guano-barbudo
Penelope ortoni	guano-do-chocó
Penelope montagnii	guano-andino
Penelope marail	guano-guianense
Penelope superciliaris	guano-d'orlas-ruivas
Penelope dabbenei	guano-de-faces-vermelhas
Penelope purpurascens	guano-de-crista



Figura 15 - guano-de-crista *Penelope purpurascens*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Penelope perspicax	guano-do-cauca
Penelope albipennis	guano-d'asa-branca
Penelope jacquacu	guano-amazónico
Penelope obscura	guano-de-patas-escuras
Penelope bridgesi	guano-dos-yungas

Penelope pileata	guano-de-coroa-branca
Penelope ochrogaster	guano-de-barriga-castanha
Penelope jacucaca	guano-de-sobrancelhas
Pipile pipile	guano-de-trinidade
Pipile cumanensis	guano-de-garganta-azul
Pipile grayi	guano-de-garganta-branca
Pipile cujubi	guano-de-garganta-vermelha
Pipile jacutinga	guano-de-testa-preta
Aburria aburri	guano-carunculado
Chamaepetes unicolor	guano-preto
Chamaepetes goudotii	guano-asa-de-foice
Penelopina nigra	guano-das-montanhas
Oreophasis derbianus	guano-cornudo
Nothocrax urumutum	mutum-nocturno
Mitu tomentosum	mutum-do-norte
Mitu salvini	mutum-de-barriga-branca
Mitu tuberosum	mutum-cavalo
Mitu mitu	mutum-nordestino
Pauxi pauxi	mutum-de-elmo
Pauxi unicornis	mutum-boliviano
Pauxi koepckeae	mutum-de-sira
Crax rubra	mutum-grande
Crax alberti	mutum-de-bico-azul
Crax daubentoni	mutum-colombiano
Crax alector	mutum-venezuelano
Crax globulosa	mutum-carunculado
Crax fasciolata	mutum-do-cerrado
Crax blumenbachii	mutum-de-bico-vermelho

As pintadas, também chamadas fracas, são aves galináceas, que apresentam a cabeça total ou parcialmente despida de penas. Nidificam no solo e alimentam-se de sementes e insectos. Vivem geralmente em pequenos bandos. Embora esta família seja endémica do continente africano, uma das espécies (a pintada-da-guiné) foi introduzida como ave doméstica noutros continentes, para fins alimentares ou para controlo de insectos.

Espécies: 8

Distribuição: África subsariana

Agelastes meleagrides	pintada-de-peito-branco
Agelastes niger	pintada-preta
Numida meleagris	pintada-da-guiné
Guttera plumifera	pintada-de-penacho
Guttera verreauxi	pintada-de-verreaux
Guttera pucherani	pintada-de-crista
Guttera edouardi	pintada-meridional
Acryllium vulturinum	pintada-vulturina



Figura 16 - pintada-vulturina *Acryllium vulturinum*

(Foto: Gonçalo Elias - Etiópia)

Odontophoridae Perdizes e Codornizes do Novo Mundo

Estas pequenas aves galináceas, algumas delas com cristas e adornos vistosos, alimentam-se de frutos, sementes e insectos. Surgem numa grande variedade de habitats, movimentando-se em grupo ao nível do solo. Aqui se incluem as perdizes e codornizes do Novo Mundo, assim como duas espécies de perdizes africanas, todas elas formando uma linhagem evolutiva que agora se sabe ser distinta dos fasianídeos.

Espécies: 34

Distribuição: Américas (principalmente) e África tropical (duas espécies)

Ptilopachus petrosus	perdiz-das-rochas
Ptilopachus nahani	perdiz-de-nahan
Dendrortyx barbatus	perdiz-barbuda
Dendrortyx macroura	perdiz-rabilonga
Dendrortyx leucophrys	perdiz-coroada
Oreortyx pictus	codorniz-serrana
Callipepla squamata	codorniz-escamosa
Callipepla douglasii	codorniz-elegante
Callipepla californica	codorniz-da-califórnia
Callipepla gambelii	codorniz-de-elmo
Philortyx fasciatus	codorniz-barrada
Colinus virginianus	codorniz-virginiana
Colinus nigrogularis	codorniz-de-garganta-preta
Colinus leucopogon	codorniz-de-barriga-pintada
Colinus cristatus	codorniz-de-crista
Odontophorus gujanensis	codorniz-amazónica
Odontophorus capueira	codorniz-d'asa-ponteada
Odontophorus melanotis	codorniz-d'orelhas-pretas
Odontophorus erythrops	codorniz-de-testa-ruiva
Odontophorus atrifrons	codorniz-de-testa-preta
Odontophorus hyperythrus	codorniz-castanha
Odontophorus melanonotus	codorniz-de-dorso-escuro
Odontophorus speciosus	codorniz-de-peito-ruivo
Odontophorus dialeucos	codorniz-do-tacarcuna
Odontophorus strophium	codorniz-de-garganta-branca
Odontophorus columbianus	codorniz-venezuelana
Odontophorus leucolaemus	codorniz-de-peito-preto
Odontophorus balliviani	codorniz-mascarada



Figura 17 - codorniz-pintada *Odontophorus guttatus*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Odontophorus stellatus	codorniz-estrelada
Odontophorus guttatus	codorniz-pintada
Dactylortyx thoracicus	codorniz-cantora
Cyrtonyx montezumae	codorniz-asteca
Cyrtonyx ocellatus	codorniz-ocelada
Rhynchortyx cinctus	codorniz-de-faces-ruivas

Phasianidae Perdizes, Tetrazes e afins

Esta diversa família, bem conhecida da maioria das pessoas, inclui muitas espécies domesticadas pela sua carne e ovos, como o galo-vermelho, outras amplamente caçadas, como a codorniz-comum, e outras valorizadas como aves ornamentais, como é o caso do pavão-azul. Alimentam-se de sementes, folhas e invertebrados ao nível do solo. Na maioria delas, o dimorfismo sexual é pronunciado e os machos apresentam plumagem ricamente colorida e ornamentada.

Espécies: 189

Distribuição: América do Norte e Central, Europa, África, Ásia e Australásia

Xenoperdix udzungwensis	perdiz-das-udzungwa
Caloperdix oculeus	perdiz-ferrugínea
Rollulus rouloul	perdiz-de-crista
Melanoperdix niger	perdiz-preta
Arborophila torqueola	perdiz-mascarada
Arborophila rufipectus	perdiz-do-sujuão



Figura 18 - perdiz-mascarada *Arborophila torqueola*

(Foto: Shelley Rutkin – China)

Arborophila mandellii	perdiz-de-peito-castanho
Arborophila gingica	perdiz-de-fuquiém
Arborophila rufogularis	perdiz-de-garganta-ruiva
Arborophila rubrirostris	perdiz-de-bico-vermelho
Arborophila diversa	perdiz-siamesa
Arborophila cambodiana	perdiz-cambojana
Arborophila ardens	perdiz-de-ainão
Arborophila crudigularis	perdiz-da-formosa
Arborophila atrogularis	perdiz-de-faces-brancas
Arborophila brunneopectus	perdiz-de-dorso-barrado
Arborophila davidi	perdiz-de-pescoço-laranja
Arborophila hyperythra	perdiz-do-bornéu
Arborophila campbelli	perdiz-malaia
Arborophila rolli	perdiz-batak
Arborophila sumatrana	perdiz-de-samatra
Arborophila javanica	perdiz-javanesa
Arborophila orientalis	perdiz-oriental
Lerwa lerwa	perdiz-das-neves
Ithaginis cruentus	faisão-cruento
Tragopan melanocephalus	tragopã-de-dorso-cinzento
Tragopan satyra	tragopã-sátiro
Tragopan blythii	tragopã-de-barriga-branca
Tragopan temminckii	tragopã-de-faces-azuis
Tragopan caboti	tragopã-de-peito-branco
Tetraophasis obscurus	perdiz-faisão-de-verreaux
Tetraophasis szechenyii	perdiz-faisão-de-szechenyi
Lophophorus impejanus	monal-de-cauda-ruiva
Lophophorus sclateri	monal-de-cauda-branca
Lophophorus lhuysii	monal-de-cauda-azul
Pucrasia macrolopha	faisão-koklass
Meleagris gallopavo	peru-bravo
Meleagris ocellata	peru-ocelado
Bonasa umbellus	tetraz-de-colar
Tetrastes bonasia	galinha-montesa
Tetrastes sewerzowi	galinha-chinesa
Centrocercus urophasianus	galo-grande-das-artemísias
Centrocercus minimus	galo-pequeno-das-artemísias
Dendragapus obscurus	tetraz-sombrio
Dendragapus fuliginosus	tetraz-fuliginoso
Tympanuchus phasianellus	galo-rabilongo-das-pradarias
Tympanuchus cupido	galo-grande-das-pradarias
Tympanuchus pallidicinctus	galo-pequeno-das-pradarias
Lagopus leucura	lagópode-de-cauda-branca
Lagopus scotica	lagópode-escocês
Lagopus lagopus	lagópode-ruivo
Lagopus muta	lagópode-cinzento
Falcipennis falcipennis	tetraz-siberiano



Figura 19 - tetraz-real *Tetrao urogallus*

(Foto: José Frade – Finlândia)

Canachites canadensis	tetraz-canadiano
Tetrao urogallus	tetraz-real
Tetrao urogalloides	tetraz-de-bico-preto
Lyrurus tetrix	tetraz-lira
Lyrurus mlokosiewiczi	tetraz-do-cáucaso
Rhizothera longirostris	perdiz-bicuda
Rhizothera dulitensis	perdiz-do-dulit
Perdix hodgsoniae	perdiz-do-tibete
Perdix perdix	perdiz-cinzenta
Perdix dauurica	perdiz-dáurica
Syrmaticus soemmerringii	faisão-ferrugíneo
Syrmaticus reevesii	faisão-venerado
Syrmaticus mikado	faisão-mikado
Syrmaticus ellioti	faisão-de-elliot
Syrmaticus humiae	faisão-de-hume
Chrysolophus pictus	faisão-dourado
Chrysolophus amherstiae	faisão-de-lady-amherst
Phasianus colchicus	faisão-de-colar
Phasianus versicolor	faisão-verde
Catreus wallichii	faisão-de-penacho
Crossoptilon harmani	faisão-orelhudo-cinzento
Crossoptilon crossoptilon	faisão-orelhudo-branco
Crossoptilon mantchuricum	faisão-orelhudo-castanho
Crossoptilon auritum	faisão-orelhudo-azul

Lophura edwardsi	faisão-de-edwards
Lophura swinhoii	faisão-de-swinhoe
Lophura bulweri	faisão-de-bulwer
Lophura leucomelanos	faisão-kalij
Lophura nycthemera	faisão-prateado
Lophura erythrophthalma	faisão-de-cauda-ruiva-malaio
Lophura pyronota	faisão-de-cauda-ruiva-do-bornéu
Lophura diardi	faisão-siamês
Lophura inornata	faisão-desornado
Lophura rufa	faisão-nobre-malaio
Lophura ignita	faisão-nobre-do-bornéu
Rheinardia ocellata	argos-vietnamita
Rheinardia nigrescens	argos-malaio
Argusianus argus	argos-real
Afropavo congensis	pavão-congolês
Pavo cristatus	pavão-azul
Pavo muticus	pavão-verde
Tropicoperdix chloropus	perdiz-de-pernas-verdes
Tropicoperdix charltonii	perdiz-de-colar-castanho
Tropicoperdix graydoni	perdiz-de-sabá
Haematortyx sanguiniceps	perdiz-de-cabeça-vermelha
Galloperdix spadicea	perdiz-esporada-vermelha



Figura 20 - faisão-ocelado-malaio *Polyplectron malacense*

(Foto: Eric Forsyth - Malásia)

Galloperdix lunulata	perdiz-esporada-pintada
Galloperdix bicalcarata	perdiz-esporada-do-ceilão
Polyplectron napoleonis	faisão-ocelado-de-palawan
Polyplectron schleiermacheri	faisão-ocelado-do-bornéu
Polyplectron malacense	faisão-ocelado-malaio
Polyplectron germaini	faisão-ocelado-castanho
Polyplectron katsumatae	faisão-ocelado-de-ainão
Polyplectron bicalcaratum	faisão-ocelado-cinzento
Polyplectron inopinatum	faisão-ocelado-montês
Polyplectron chalcurum	faisão-ocelado-bronzeado
Bambusicola fytchii	perdiz-do-bambu-montesa
Bambusicola thoracicus	perdiz-do-bambu-chinesa
Bambusicola sonorivox	perdiz-do-bambu-da-formosa
Gallus varius	galo-verde
Gallus gallus	galo-vermelho
Gallus sonneratii	galo-cinzento
Gallus lafayettii	galo-do-ceilão
Peliperdix lathami	francolim-de-latham
Ortygornis sephaena	francolim-de-crista
Ortygornis pondicerianus	francolim-cinzento
Ortygornis gularis	francolim-palustre
Francolinus pintadeanus	francolim-perlado
Francolinus francolinus	francolim-preto
Francolinus pictus	francolim-pintado
Campocolinus coqui	francolim-das-pedras
Campocolinus albogularis	francolim-de-garganta-branca
Campocolinus schlegelii	francolim-de-schlegel
Scleroptila streptophora	francolim-de-colar
Scleroptila levaillantii	francolim-d'asa-vermelha
Scleroptila finschi	francolim-de-finsch
Scleroptila psilolaema	francolim-etíope
Scleroptila elgonensis	francolim-do-elgon
Scleroptila afra	francolim-d'asa-cinzenta
Scleroptila gutturalis	francolim-do-orange
Scleroptila shelleyi	francolim-de-shelley
Scleroptila whytei	francolim-de-whyte
Tetraogallus tibetanus	galo-das-neves-do-tibete
Tetraogallus altaicus	galo-das-neves-altaico
Tetraogallus caucasicus	galo-das-neves-do-cáucaso
Tetraogallus caspius	galo-das-neves-do-cáspio
Tetraogallus himalayensis	galo-das-neves-dos-himalaias
Ammoperdix griseogularis	perdiz-assobiadeira
Ammoperdix heyi	perdiz-do-deserto
Synoicus ypsilophorus	codorniz-australiana
Synoicus monorthonyx	codorniz-da-papua
Synoicus chinensis	codorniz-chinesa
Synoicus adansonii	codorniz-azul
Margaroperdix madagarensis	perdiz-malgaxe

Coturnix coturnix	codorniz-comum
Coturnix japonica	codorniz-japonesa
Coturnix delegorguei	codorniz-arlequim
Coturnix coromandelica	codorniz-pluvial
Coturnix pectoralis	codorniz-dos-restolhos
Coturnix novaezelandiae	codorniz-maori
Alectoris barbara	perdiz-moura
Alectoris melanocephala	perdiz-árabe
Alectoris rufa	perdiz-vermelha
Alectoris chukar	perdiz-chucar
Alectoris graeca	perdiz-grega
Alectoris philbyi	perdiz-de-garganta-preta
Alectoris magna	perdiz-magna
Perdicula asiatica	codorniz-de-garganta-ferrugínea
Perdicula argoondah	codorniz-das-rochas
Perdicula erythrorhyncha	codorniz-de-bico-vermelho
Perdicula manipurensis	codorniz-de-manipur
Ophrysia superciliosa	perdiz-dos-himalaias
Pternistis hartlaubi	francolim-de-hartlaub
Pternistis camerunensis	francolim-camaronês
Pternistis nobilis	francolim-nobre
Pternistis castaneicollis	francolim-de-nuca-castanha
Pternistis erckelii	francolim-de-erckel



Figura 21 - francolim-de-nuca-castanha *Pternistis castaneicollis*

(Foto: Gonçalo Elias - Etiópia)

Pternistis ochropectus	francolim-jibutiano
Pternistis swierstrai	francolim-da-montanha
Pternistis ahantensis	francolim-de-ahanta
Pternistis griseostriatus	francolim-de-riscas-cinzentas
Pternistis jacksoni	francolim-de-jackson
Pternistis adspersus	francolim-de-bico-vermelho
Pternistis capensis	francolim-do-cabo
Pternistis natalensis	francolim-de-natal
Pternistis hildebrandti	francolim-de-hildebrandt
Pternistis bicalcaratus	francolim-biesporado
Pternistis squamatus	francolim-escamoso
Pternistis icterorhynchus	francolim-de-bico-amarelo
Pternistis clappertoni	francolim-de-clapperton
Pternistis harwoodi	francolim-de-harwood
Pternistis swainsonii	francolim-de-swainson
Pternistis leucoscepus	francolim-de-pescoço-amarelo
Pternistis rufopictus	francolim-de-peito-cinzento
Pternistis afer	francolim-de-pescoço-vermelho



Figura 22 - peru-bravo *Meleagris gallopavo*

(Foto: Pedro Nicolau – E.U.A.)

Caprimulgidae Noitibós

De hábitos essencialmente crepusculares ou nocturnos, os noitibós são aves de média dimensão que se alimentam de insectos. Nidificam no solo e passam o dia em repouso. À noite gostam de pousar nas estradas, o que faz com que sejam vítimas frequentes de atropelamento. O nome genérico *Caprimulgus* significa 'chupa-cabras', estando relacionado com uma crença antiga: a de que estas aves se alimentavam do leite das cabras.

Espécies: 98

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Eurostopodus argus	noitibó-malhado
Eurostopodus mystacalis	noitibó-de-garganta-branca
Eurostopodus nigripennis	noitibó-das-salomão
Eurostopodus exul	noitibó-da-nova-caledónia
Eurostopodus diabolicus	noitibó-satânico
Eurostopodus papuensis	noitibó-da-papua
Eurostopodus archboldi	noitibó-de-archbold
Lyncornis temminckii	noitibó-orelhudo-malaio
Lyncornis macrotis	noitibó-orelhudo-grande



Figura 23 - noitibó-norte-americano *Chordeiles minor*

(Foto: Paul Bourdin - Irlanda)

Gactornis enarratus	noitibó-de-colar-ruivo
Chordeiles nacunda	noitibó-caminhante
Chordeiles pusillus	noitibó-anão
Chordeiles rupestris	noitibó-das-praias
Chordeiles acutipennis	noitibó-d'asa-fina
Chordeiles minor	noitibó-norte-americano
Chordeiles gundlachii	noitibó-das-antilhas
Lurocalis semitorquatus	noitibó-de-cauda-curta
Lurocalis rufiventris	noitibó-de-barriga-ruiva
Nyctiprogne leucopyga	noitibó-de-cauda-barrada
Nyctiprogne vielliardi	noitibó-baiano
Nyctipolus nigrescens	noitibó-das-rochas
Nyctipolus hirundinaceus	noitibó-da-caatinga
Nyctidromus albicollis	noitibó-pauraque
Nyctidromus anthonyi	noitibó-de-guaiaquil
Setopagis heterura	noitibó-de-todd
Setopagis parvula	noitibó-pequeno
Setopagis maculosa	noitibó-guianense
Tepuiornis whitelyi	noitibó-dos-tepuis
Eleothreptus anomalus	noitibó-do-paraná
Eleothreptus candicans	noitibó-d'asa-branca
Systellura longirostris	noitibó-de-manchas-brancas
Quechuavis decussata	noitibó-peruano
Uropsalis segmentata	noitibó-cauda-de-andorinha
Uropsalis lyra	noitibó-lira
Hydropsalis cayennensis	noitibó-de-cauda-branca
Hydropsalis climacocerca	noitibó-de-escada
Hydropsalis torquata	noitibó-tesoura
Hydropsalis forcipata	noitibó-tesourão
Antiurus maculicaudus	noitibó-de-cauda-pintada
Siphonorhis brewsteri	noitibó-dominicano-pequeno
Siphonorhis americana	noitibó-jamaicano
Nyctiphrynus rosenbergi	noitibó-do-chocó
Nyctiphrynus mcleodii	noitibó-asteca
Nyctiphrynus yucatanicus	noitibó-do-iucatão
Nyctiphrynus ocellatus	noitibó-ocelado
Phalaenoptilus nuttallii	noitibó-de-nuttall
Antrostomus carolinensis	noitibó-carolino
Antrostomus rufus	noitibó-ruivo
Antrostomus cubanensis	noitibó-cubano
Antrostomus ekmani	noitibó-dominicano-grande
Antrostomus salvini	noitibó-de-colar-pardo
Antrostomus badius	noitibó-guatemalteco
Antrostomus sericocaudatus	noitibó-cauda-de-seda
Antrostomus ridgwayi	noitibó-de-colar-pálido
Antrostomus vociferus	noitibó-cantor-norte-americano
Antrostomus arizonae	noitibó-cantor-mexicano
Antrostomus noctitherus	noitibó-porto-riquenho

Antrostomus saturatus	noitibó-sombrio
Veles binotatus	noitibó-bimaculado
Caprimulgus ruficollis	noitibó-de-nuca-vermelha
Caprimulgus indicus	noitibó-da-selva
Caprimulgus jotaka	noitibó-cinzento
Caprimulgus phalaena	noitibó-de-palau
Caprimulgus europaeus	noitibó-europeu
Caprimulgus fraenatus	noitibó-escuro
Caprimulgus rufigena	noitibó-de-faces-ruivas
Caprimulgus aegyptius	noitibó-do-deserto
Caprimulgus mahrattensis	noitibó-de-sykes
Caprimulgus nubicus	noitibó-núbio
Caprimulgus eximius	noitibó-dourado
Caprimulgus atripennis	noitibó-marajá
Caprimulgus macrurus	noitibó-de-cauda-larga
Caprimulgus meesi	noitibó-de-mees
Caprimulgus ritae	noitibó-timorense
Caprimulgus andamanicus	noitibó-das-andamão
Caprimulgus manillensis	noitibó-filipino
Caprimulgus celebensis	noitibó-de-celebes
Caprimulgus donaldsoni	noitibó-dos-espinheiros
Caprimulgus pectoralis	noitibó-de-pescoço-dourado
Caprimulgus poliocephalus	noitibó-da-montanha
Caprimulgus asiaticus	noitibó-indiano
Caprimulgus madagascariensis	noitibó-malgaxe



Figura 24 - noitibó-da-savana *Caprimulgus affinis*

(Foto: Paul Bourdin – Filipinas)

Caprimulgus natalensis	noitibó-de-natal
Caprimulgus solala	noitibó-de-nechisar
Caprimulgus inornatus	noitibó-saheliano
Caprimulgus stellatus	noitibó-estrelado
Caprimulgus affinis	noitibó-da-savana
Caprimulgus griseatus	noitibó-grisalho
Caprimulgus tristigma	noitibó-sardento
Caprimulgus concretus	noitibó-de-bonaparte
Caprimulgus pulchellus	noitibó-de-salvadori
Caprimulgus prigoginei	noitibó-das-itombwe
Caprimulgus batesi	noitibó-de-bates
Caprimulgus climacurus	noitibó-rabilongo
Caprimulgus clarus	noitibó-de-cauda-fina
Caprimulgus fossii	noitibó-moçambicano
Caprimulgus longipennis	noitibó-porta-estandarte
Caprimulgus vexillarius	noitibó-de-balanceiros



Figura 25 - noitibó-moçambicano *Caprimulgus fossii*

(Foto: António Martins – Angola)

Steatornithidae **Guácharo**

Esta curiosa ave partilha a morfologia e os hábitos nocturnos com os noitibós, mas nidifica colonialmente em grutas e, em vez de insectos, alimenta-se de frutas. Para esse propósito, percorre longas distâncias e utiliza sentidos muito apurados - visão, olfacto e uma capacidade única nas aves, a ecolocação (tal como nos morcegos). A sua dieta rica em frutas oleosas é a razão pela qual as crias eram em tempos capturadas e delas se extraía óleo para lâmpadas. Esta é a origem do nome "oilbird" em inglês.

Espécies: 1

Distribuição: Noroeste da América do Sul



Figura 26 - guácharo *Steatornis caripensis*

(Foto: Lars Petersson – Equador)

Steatornis caripensis guácharo

Nyctibiidae Nictíbios

Os nictíbios são aves nocturnas e insectívoras, parentes próximos dos noitibós, que habitam florestas tropicais das Américas. Ao contrário dos noitibós, escolhem poisos expostos em ramos ou árvores mortas, posicionando-se verticalmente e utilizando a sua plumagem críptica para se fazerem passar por parte desse ramo ou tronco. Estas aves emitem também fortes e características vocalizações.

Espécies: 7

Distribuição: América do Sul e Central



Figura 27 - nictíbio-grande *Nyctibius grandis*

(Foto: Shelley Rutkin - Panamá)

Phyllaemulor bracteatus	nictíbio-ruivo
Nyctibius grandis	nictíbio-grande
Nyctibius aethereus	nictíbio-rabilongo
Nyctibius jamaicensis	nictíbio-jamaicano
Nyctibius griseus	nictíbio-comum
Nyctibius maculosus	nictíbio-andino
Nyctibius leucopterus	nictíbio-d'asa-branca

Podargidae Bocas-de-sapo

Os bocas-de-sapo são aves nocturnas de média dimensão e coloração críptica que habitam principalmente em florestas. Com o seu bico largo e poderoso, alimentam-se de insectos mas também ocasionalmente vertebrados. Ao contrário dos noitibós, caçam a partir de um poleiro, de onde detectam presas no solo ou nas árvores, voando depois para as capturar.

Espécies: 16

Distribuição: Ásia (sul e sudeste), arquipélago indo-malaio e Austrália



Figura 28 - boca-de-sapo-filipino *Batrachostomus septimus*

(Foto: Paul Bourdin – Filipinas)

Podargus ocellatus	boca-de-sapo-ocelado
Podargus papuensis	boca-de-sapo-da-papua
Podargus strigoides	boca-de-sapo-australiano

Rigidipenna inexpectata	boca-de-sapo-das-salomão
Batrachostomus auritus	boca-de-sapo-orelhudo
Batrachostomus harterti	boca-de-sapo-do-dulit
Batrachostomus septimus	boca-de-sapo-filipino
Batrachostomus stellatus	boca-de-sapo-estrelado
Batrachostomus moniliger	boca-de-sapo-do-ceilão
Batrachostomus hodgsoni	boca-de-sapo-rabilongo
Batrachostomus poliolophus	boca-de-sapo-de-samatra
Batrachostomus mixtus	boca-de-sapo-do-bornéu
Batrachostomus javensis	boca-de-sapo-javanês
Batrachostomus affinis	boca-de-sapo-de-blyth
Batrachostomus chaseni	boca-de-sapo-de-palawan
Batrachostomus cornutus	boca-de-sapo-cornudo



Figura 29 - boca-de-sapo-australiano *Podargus strigoides*

(Foto: Alan Stringer – Austrália)

Aegothelidae — Noitibós-coruja

Estas aves nocturnas efectivamente parecem uma mistura entre um noitibó e uma pequena coruja. Ocorrem em florestas, à excepção de uma das espécies australianas, que ocupa também matos secos. São aves insectívoras, que capturam as suas presas a partir de um poleiro na vegetação. O noitibó-coruja-da-nova-caledónia, endémico dessa ilha e criticamente ameaçado, foi redescoberto em 1995, não tendo sido avistado desde o século XIX.

Espécies: 10

Distribuição: Austrália, Papua e ilhas circundantes

Aegotheles insignis	noitibó-coruja-grande
Aegotheles tatei	noitibó-coruja-estrelado
Aegotheles crinifrons	noitibó-coruja-das-molucas
Aegotheles wallacii	noitibó-coruja-de-wallace
Aegotheles albertisi	noitibó-coruja-montês
Aegotheles savesi	noitibó-coruja-da-nova-caledónia
Aegotheles bennettii	noitibó-coruja-listado
Aegotheles affinis	noitibó-coruja-das-arfak
Aegotheles terborghi	noitibó-coruja-de-karimui
Aegotheles cristatus	noitibó-coruja-australiano



Figura 30 - noitibó-coruja-australiano *Aegotheles cristatus*

(Foto: Hannah Fairbairn – Austrália)

Hemiprocnidae Andorinhões-arborícolas

Como o nome indica, estes andorinhões distinguem-se dos seus primos na família Apodidae pela capacidade de pousar em árvores, não passando tanto tempo da sua vida no ar. Vivem em zonas arborizadas, onde se alimentam de insectos em voo. No ninho, incubam os ovos com o corpo em posição vertical, tornando a localização do ninho menos evidente para predadores.

Espécies: 4

Distribuição: sul e sudeste da Ásia, estendendo-se até à Papua



Figura 31 - andorinhão-arborícola-pequeno *Hemiprocne comata*

(Foto: Lara Groß – Malásia)

Hemiprocne coronata	andorinhão-arborícola-coroado
Hemiprocne longipennis	andorinhão-arborícola-d'asa-longa
Hemiprocne comata	andorinhão-arborícola-pequeno
Hemiprocne mystacea	andorinhão-arborícola-de-bigodes

Apodidae Andorinhões

Os andorinhões são aves de hábitos aéreos, que passam grande parte da sua vida no ar. Conseguem alimentar-se em voo, abrindo o bico para capturar as suas presas. O voo é muito rápido e em certas espécies pode superar os 160 km/h. Com as suas longas asas em forma de foice podem fazer as lembrar as andorinhas, no entanto em termos taxonómicos são mais próximos dos colibris.

Espécies: 109

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Cypseloides cherriei	andorinhão-de-loros-brancos
Cypseloides cryptus	andorinhão-de-queixo-branco
Cypseloides storeri	andorinhão-de-testa-branca
Cypseloides fumigatus	andorinhão-sombrio
Cypseloides rothschildi	andorinhão-de-rothschild
Cypseloides niger	andorinhão-escuro
Cypseloides lemosi	andorinhão-de-peito-branco
Cypseloides senex	andorinhão-do-iguaçu
Streptoprocne phelpsi	andorinhão-dos-tepuis
Streptoprocne rutila	andorinhão-de-coleira-ruiva
Streptoprocne zonaris	andorinhão-de-coleira-branca



Figura 32 - andorinhão-de-coleira-branca *Streptoprocne zonaris*

(Foto: José Frade – Equador)

Streptoprocne biscutata	andorinhão-de-coleira-interrompida
Streptoprocne semicollaris	andorinhão-de-nuca-branca
Hydrochous gigas	andorinhão-gigante
Collocalia affinis	andorinhão-de-pés-emplumados
Collocalia marginata	andorinhão-de-lução
Collocalia isonota	andorinhão-dos-cumes
Collocalia sumbawae	andorinhão-das-pequenas-sundas
Collocalia neglecta	andorinhão-timorense
Collocalia esculenta	andorinhão-lustroso
Collocalia uropygialis	andorinhão-satinado
Collocalia dodgei	andorinhão-do-bornéu
Collocalia linchi	andorinhão-das-cavernas
Collocalia natalis	andorinhão-da-ilha-de-natal
Collocalia troglodytes	andorinhão-pigmeu
Aerodramus elaphrus	andorinhão-das-seicheles
Aerodramus francicus	andorinhão-das-mascarenhas
Aerodramus unicolor	andorinhão-malabar
Aerodramus mearnsi	andorinhão-filipino
Aerodramus infuscatus	andorinhão-das-molucas
Aerodramus hirundinaceus	andorinhão-montês
Aerodramus spodiopygius	andorinhão-cintado
Aerodramus terraereginae	andorinhão-australiano
Aerodramus brevirostris	andorinhão-dos-himalaias
Aerodramus vulcanorum	andorinhão-vulcânico
Aerodramus whiteheadi	andorinhão-de-whitehead
Aerodramus nuditarsus	andorinhão-de-tarso-nu
Aerodramus orientalis	andorinhão-de-mayr
Aerodramus salangana	andorinhão-das-sundas
Aerodramus vanikorensis	andorinhão-uniforme
Aerodramus amelis	andorinhão-de-mindanau
Aerodramus pelewensis	andorinhão-de-palau
Aerodramus bartschi	andorinhão-das-marianas
Aerodramus inquietus	andorinhão-das-carolinas
Aerodramus leucophaeus	andorinhão-polinésio
Aerodramus sawtelli	andorinhão-de-atiu
Aerodramus ocistus	andorinhão-das-marquesas
Aerodramus maximus	andorinhão-de-ninho-preto
Aerodramus fuciphagus	andorinhão-de-ninho-branco
Aerodramus papuensis	andorinhão-tridáctilo
Schoutedenapus myoptilus	andorinhão-de-xoa
Mearnsia picina	andorinhão-espinhoso-filipino
Mearnsia novaeguineae	andorinhão-espinhoso-da-papua
Zoonavena grandidieri	andorinhão-malgaxe
Zoonavena thomensis	andorinhão-de-são-tomé
Zoonavena sylvatica	andorinhão-indiano
Telacanthura ussheri	andorinhão-de-ussher
Telacanthura melanopygia	andorinhão-de-ituri
Rhaphidura leucopygialis	andorinhão-de-rabo-prateado



Figura 33 - andorinhão-indiano *Zoonavena sylvatica*

(Foto: Lars Petersson – Índia)

Rhaphidura sabini	andorinhão-de-sabine
Neafrapus cassini	andorinhão-de-cassin
Neafrapus boehmi	andorinhão-de-böhm
Hirundapus caudacutus	andorinhão-mongol
Hirundapus cochinchinensis	andorinhão-de-dorso-prateado
Hirundapus giganteus	andorinhão-de-dorso-castanho
Hirundapus celebensis	andorinhão-púrpura
Chaetura cinereiventris	andorinhão-d'uropígio-cinzento
Chaetura spinicaudus	andorinhão-d'uropígio-branco
Chaetura martinica	andorinhão-de-martinica
Chaetura fumosa	andorinhão-costa-riquenho
Chaetura egregia	andorinhão-d'uropígio-pálido
Chaetura pelagica	andorinhão-de-rabo-espinhoso
Chaetura vauxi	andorinhão-de-vaux
Chaetura chapmani	andorinhão-de-chapman
Chaetura andrei	andorinhão-de-cauda-fuliginosa
Chaetura meridionalis	andorinhão-de-sick
Chaetura brachyura	andorinhão-de-cauda-curta
Aeronautes saxatalis	andorinhão-de-garganta-branca
Aeronautes montivagus	andorinhão-de-pontas-brancas
Aeronautes andecolus	andorinhão-andino
Tachornis phoenicobia	andorinhão-das-palmeiras-das-antilhas

Tachornis furcata	andorinhão-das-palmeiras-venezuelano
Tachornis squamata	andorinhão-das-palmeiras-amazónico
Panyptila sanctihieronymi	andorinhão-tesoura-grande
Panyptila cayennensis	andorinhão-tesoura-pequeno
Cypsiurus parvus	andorinhão-das-palmeiras-africano
Cypsiurus gracilis	andorinhão-das-palmeiras-malgaxe
Cypsiurus balasiensis	andorinhão-das-palmeiras-asiático
Tachymarptis melba	andorinhão-real
Tachymarptis aequatorialis	andorinhão-malhado
Apus alexandri	andorinhão-de-cabo-verde
Apus apus	andorinhão-preto
Apus unicolor	andorinhão-da-serra
Apus niansae	andorinhão-de-nyanza
Apus pallidus	andorinhão-pálido
Apus barbatus	andorinhão-africano
Apus balstoni	andorinhão-de-balston
Apus sladeniae	andorinhão-de-fernando-pó
Apus berliozi	andorinhão-de-berlioz



Figura 34 - andorinhão-asiático *Apus pacificus*

(Foto: Lars Petersson - Japão)

Apus bradfieldi	andorinhão-de-bradfield
Apus pacificus	andorinhão-asiático
Apus leuconyx	andorinhão-de-cauda-forcada
Apus cooki	andorinhão-de-cook

Apus acuticauda	andorinhão-de-dorso-escuro
Apus affinis	andorinhão-pequeno
Apus nipalensis	andorinhão-doméstico
Apus horus	andorinhão-das-barreiras
Apus caffer	andorinhão-cafre
Apus batesi	andorinhão-camaronês



Figura 35 - andorinhão-pequeno *Apus affinis*

(Foto: José Frade – Marrocos)

Trochilidae Colibris

Os colibris formam a terceira família de aves mais numerosa, incluindo também a ave mais pequena do mundo, o colibri-abelha (com cerca de 2 g). Estas carismáticas aves, de plumagem iridescente, cores garridas e ornamentos extraordinários, habitam uma grande diversidade de habitats das Américas. São extremamente activos e ágeis, para garantir acesso às flores de onde obtêm a sua fonte de alimento principal, o néctar.

Espécies: 367

Distribuição: Américas

Topaza pella	colibri-topázio
Topaza pyra	colibri-de-fogo
Florisuga mellivora	colibri-de-nuca-branca
Florisuga fusca	colibri-preto
Eutoxeres aquila	bico-de-foice-de-pontas-brancas
Eutoxeres condamini	bico-de-foice-de-pontas-amareladas
Ramphodon naevius	eremita-bico-de-serra
Glaucis dohrnii	eremita-de-espírito-santo
Glaucis aeneus	eremita-bronze
Glaucis hirsutus	eremita-de-peito-ruivo
Threnetes ruckeri	eremita-barbudo-ocidental
Threnetes leucurus	eremita-barbudo-oriental
Threnetes niger	eremita-barbudo-guianense
Anopetia gounellei	eremita-de-cauda-larga
Phaethornis squalidus	eremita-de-garganta-fusca
Phaethornis rupurumii	eremita-do-rupununi
Phaethornis longuemareus	eremita-pequeno
Phaethornis aethopygus	eremita-do-tapajós
Phaethornis idaliae	eremita-anão
Phaethornis nattereri	eremita-canela
Phaethornis atrimentalis	eremita-de-garganta-preta
Phaethornis striigularis	eremita-de-garganta-riscada
Phaethornis griseogularis	eremita-de-garganta-cinzenta
Phaethornis ruber	eremita-avermelhado
Phaethornis stuarti	eremita-de-sobrancelha
Phaethornis subochraceus	eremita-ocre
Phaethornis augusti	eremita-de-cabeça-cinzenta
Phaethornis pretrei	eremita-do-planalto
Phaethornis eurynome	eremita-escamoso
Phaethornis anthophilus	eremita-pálido
Phaethornis hispidus	eremita-de-barba-branca
Phaethornis yaruqui	eremita-do-chocó
Phaethornis guy	eremita-verde
Phaethornis syrmatophorus	eremita-de-barriga-fulva

Phaethornis koepckeae	eremita-de-koepcke
Phaethornis philippii	eremita-bico-de-agulha
Phaethornis bourcieri	eremita-de-bico-direito
Phaethornis mexicanus	eremita-mexicano
Phaethornis longirostris	eremita-de-bico-comprido



Figura 36 - eremita-de-bico-comprido *Phaethornis longirostris*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Phaethornis superciliosus	eremita-rabilongo
Phaethornis malaris	eremita-de-bico-grosso
Doryfera ludovicae	bico-de-lança-grande
Doryfera johannae	bico-de-lança-pequeno
Schistes albogularis	colibri-adaga-ocidental
Schistes geoffroyi	colibri-adaga-oriental
Augastes scutatus	colibri-de-gravata-mineiro
Augastes lumachella	colibri-de-gravata-baiano
Colibri delphinae	colibri-castanho
Colibri thalassinus	colibri-mexicano
Colibri cyanotus	colibri-d'orelhas-pequeno
Colibri coruscans	colibri-d'orelhas-grande
Colibri serrirostris	colibri-d'orelhas-oriental
Androdon aequatorialis	colibri-de-bico-denteado
Heliactin bilophus	colibri-chifre-de-ouro
Heliothryx barroti	colibri-de-coroa-púrpura
Heliothryx auritus	colibri-de-bochechas-azuis
Polytmus guainumbi	colibri-de-bico-curvo

Polytmus milleri	colibri-dos-tepuis
Polytmus theresiae	colibri-verde
Avocettula recurvirostris	colibri-alfaiate-amazónico
Chrysolampis mosquitus	colibri-rubi



Figura 37 - colibri-rubi *Chrysolampis mosquitus*

(Foto: Luis Panamá Perugachi – Colômbia)

Anthracothorax mango	colibri-jamaicano
Anthracothorax viridigula	colibri-de-gravata-dos-mangais
Anthracothorax prevostii	colibri-de-gravata-verde
Anthracothorax veraguensis	colibri-de-veragua
Anthracothorax nigricollis	colibri-de-gravata-preta
Anthracothorax dominicus	colibri-das-antilhas
Anthracothorax aurulentus	colibri-porto-riquenho-dourado
Anthracothorax viridis	colibri-porto-riquenho-verde
Eulampis holosericeus	colibri-caribenho-verde

Eulampis jugularis	colibri-caribenho-roxo
Heliangelus mavors	colibri-de-garganta-laranja
Heliangelus amethysticollis	colibri-anjo-ametista
Heliangelus clarisse	colibri-de-longuemare
Heliangelus spencei	colibri-de-mérida
Heliangelus strophianus	colibri-peitoral
Heliangelus exortis	colibri-turmalina
Heliangelus micraster	colibri-chama
Heliangelus viola	colibri-anjo-violeta
Heliangelus regalis	colibri-real
Sephanoides sephaniodes	colibri-austral
Sephanoides fernandensis	colibri-de-joão-fernandes
Discosura conversii	colibri-espinhoso-verde
Discosura popelairii	colibri-de-filamentos
Discosura langsdorffi	colibri-espinhoso-de-peito-preto
Discosura letitiae	colibri-espinhoso-acobreado
Discosura longicaudus	colibri-de-bandeirinhas
Lophornis ornatus	colibri-de-leque-canela
Lophornis gouldii	colibri-de-leque-pintalgado
Lophornis magnificus	colibri-de-leque-barrado
Lophornis brachylophus	colibri-de-guerrero
Lophornis delattrei	colibri-de-crista-ruiva
Lophornis stictolophus	colibri-de-crista-pintada
Lophornis chalybeus	colibri-de-leque-verde-oriental
Lophornis verreauxii	colibri-de-leque-verde-ocidental
Lophornis pavoninus	colibri-pavão
Lophornis helenae	colibri-de-crista-preta
Lophornis adorabilis	colibri-de-crista-branca
Phlogophilus hemileucurus	colibri-de-pontas-brancas-equatoriano
Phlogophilus harterti	colibri-de-pontas-brancas-peruano
Adelomyia melanogenys	colibri-pintalgado
Aglaiocercus kingii	silfo-de-cauda-azul
Aglaiocercus coelestis	silfo-de-cauda-violeta
Aglaiocercus berlepschi	silfo-venezuelano
Sappho sparganurus	colibri-cometa-dourado
Polyonymus caroli	colibri-cometa-bronze
Taphrolesbia griseiventris	colibri-cometa-cinzento
Oreotrochilus estella	colibri-da-puna
Oreotrochilus leucopleurus	colibri-de-flancos-brancos
Oreotrochilus chimborazo	colibri-equatoriano
Oreotrochilus cyanolaemus	colibri-do-cerro-de-arcos
Oreotrochilus stolzmanni	colibri-de-stolzmann
Oreotrochilus melanogaster	colibri-de-peito-preto
Oreotrochilus adela	colibri-de-cochabamba
Opisthoprora euryptera	colibri-alfaiate-andino
Lesbia victoriae	colibri-rabilongo-grande
Lesbia nuna	colibri-rabilongo-pequeno
Ramphomicron dorsale	colibri-agulha-de-santa-marta



Figura 38 - colibri-equatoriano *Oreotrochilus chimborazo*

(Foto: Luis Panamá Perugachi – Equador)

Ramphomicron microrhynchum	colibri-agulha-comum
Chalcostigma heteropogon	colibri-bico-de-espinho
Chalcostigma herrani	colibri-arco-íris
Chalcostigma ruficeps	colibri-de-barrete
Chalcostigma olivaceum	colibri-oliváceo
Chalcostigma stanleyi	colibri-de-manto-azul
Oxypogon stuebelii	colibri-de-poupa-do-nevado
Oxypogon cyanolaemus	colibri-de-poupa-de-santa-marta
Oxypogon lindenii	colibri-de-poupa-de-mérida
Oxypogon guerinii	colibri-de-poupa-de-bogotá
Oreonympha nobilis	colibri-barbudo
Metallura tyrianthina	metalura-púrpura
Metallura iracunda	metalura-de-perijá
Metallura williami	metalura-verde
Metallura baroni	metalura-de-azuay
Metallura odomae	metalura-da-neblina
Metallura theresiae	metalura-acobreado
Metallura eupogon	metalura-barba-de-fogo
Metallura aeneocauda	metalura-escamoso

Metallura phoebe	metalura-preto
Haplophaedia aureliae	calçadinho-esverdeado-do-norte
Haplophaedia assimilis	calçadinho-esverdeado-do-sul
Haplophaedia lugens	calçadinho-grisalho
Eriocnemis nigrivestis	calçadinho-de-peito-preto
Eriocnemis isabellae	calçadinho-do-pinche
Eriocnemis vestita	calçadinho-reluzente
Eriocnemis derbyi	calçadinho-escuro
Eriocnemis godini	calçadinho-turquesa
Eriocnemis cupreoventris	calçadinho-acobreado
Eriocnemis luciani	calçadinho-safira
Eriocnemis mosquera	calçadinho-dourado
Eriocnemis glaucopoides	calçadinho-de-testa-azul
Eriocnemis mirabilis	calçadinho-multicolor
Eriocnemis aline	calçadinho-de-peito-branco
Loddigesia mirabilis	colibri-de-espátulas
Aglaeactis cupripennis	colibri-ferruginoso
Aglaeactis castelnaudii	colibri-condecorado
Aglaeactis aliciae	colibri-de-alicia
Aglaeactis pamela	colibri-de-capuz-preto
Coeligena coeligena	inca-bronze
Coeligena wilsoni	inca-pardo
Coeligena prunellei	inca-preto
Coeligena conradii	inca-verde-de-colar



Figura 39 - inca-escuro-de-colar *Coeligena torquata*

(Foto: José Frade – Equador)

Coeligena torquata	inca-escuro-de-colar
Coeligena inca	inca-de-colar-laranja
Coeligena violifer	inca-de-garganta-violeta
Coeligena iris	inca-arco-íris
Coeligena phalerata	inca-de-cauda-branca
Coeligena orina	inca-fusco
Coeligena lutetiae	inca-d'asa-caramelo
Coeligena consita	inca-de-perijá
Coeligena bonapartei	inca-de-barriga-dourada
Coeligena eos	inca-de-cauda-dourada
Coeligena helianthea	inca-de-garganta-azul
Lafresnaya lafresnayi	colibri-aveludado
Ensifera ensifera	colibri-bico-de-espada
Pterophanes cyanopterus	colibri-d'asa-azul
Boissonneaua flavescens	colibri-de-cauda-amarelada
Boissonneaua matthewsii	colibri-de-peito-ruivo
Boissonneaua jardini	colibri-de-sete-cores
Ocreatus underwoodii	colibri-de-raquetes-nortenho
Ocreatus peruanus	colibri-de-raquetes-peruano
Ocreatus addae	colibri-de-raquetes-meridional
Urochroa bougueri	colibri-de-loros-ruivos
Urochroa leucura	colibri-de-dorso-verde
Urosticte benjamini	colibri-de-pontas-brancas-ocidental
Urosticte ruficrissa	colibri-de-pontas-brancas-oriental
Heliodoxa xanthogonys	brilhante-dos-tepuis
Heliodoxa gularis	brilhante-de-garganta-rosa
Heliodoxa branickii	brilhante-d'asa-canela
Heliodoxa schreibersii	brilhante-de-garganta-preta
Heliodoxa aurescens	brilhante-de-peito-laranja
Heliodoxa rubinoides	brilhante-de-peito-fulvo
Heliodoxa jacula	brilhante-de-testa-verde
Heliodoxa imperatrix	brilhante-imperador
Heliodoxa leadbeateri	brilhante-de-testa-violeta
Heliodoxa rubricauda	colibri-de-cauda-rubi
Patagona peruviana	colibri-gigante-do-norte
Patagona gigas	colibri-gigante-do-sul
Sternoclyta cyanopectus	colibri-de-barra-violeta
Hylonympha macrocerca	colibri-tesoura-azul
Eugenes fulgens	colibri-de-rivoli
Eugenes spectabilis	colibri-magnifico
Panterpe insignis	colibri-garganta-de-fogo
Heliomaster longirostris	colibri-de-bico-comprido
Heliomaster constantii	colibri-de-constant
Heliomaster squamosus	colibri-de-peito-riscado
Heliomaster furcifer	colibri-de-barba-azul
Lampornis hemileucus	colibri-de-garganta-violeta
Lampornis clemenciae	colibri-de-garganta-azul
Lampornis amethystinus	colibri-de-garganta-ametista



Figura 40 - colibri-de-garganta-púrpura *Lampornis calolaemus*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Lampornis viridipallens	colibri-de-garganta-verde
Lampornis sybillae	colibri-de-peito-verde
Lampornis calolaemus	colibri-de-garganta-púrpura
Lampornis castaneoventris	colibri-de-talamanca
Lamprolaima rhami	colibri-de-garganta-grená
Calliphlox amethystina	colibri-ametista
Myrtis fanny	colibri-de-coleira-roxa
Rhodopis vesper	colibri-dos-oásis
Myrmia micrura	colibri-de-cauda-curta
Thaumastura cora	colibri-tesoura-cinzento
Philodice bryantae	colibri-de-garganta-magenta
Philodice mitchellii	colibri-de-mitchell
Eulidia yarrellii	colibri-de-arica
Microstilbon burmeisteri	colibri-de-cauda-estreita
Chaetocercus mulsant	colibri-de-mulsant
Chaetocercus bombus	colibri-abelhão
Chaetocercus heliodor	colibri-de-heliodoro
Chaetocercus astreans	colibri-pequeno-de-santa-marta
Chaetocercus berlepschi	colibri-de-esmeraldas
Chaetocercus jourdanii	colibri-de-jourdan
Tilmatura dupontii	colibri-de-cauda-brilhante
Doricha enicura	colibri-de-cauda-fina
Doricha eliza	colibri-tesourinha

Calothorax lucifer	colibri-luminoso
Calothorax pulcher	colibri-belo
Archilochus alexandri	colibri-de-garganta-preta
Archilochus colubris	colibri-de-garganta-rubi
Mellisuga minima	colibri-verbena
Mellisuga helenae	colibri-abelha
Nesophlox evelynae	colibri-das-bahamas
Nesophlox lyrura	colibri-de-inagua
Calypte anna	colibri-de-anna
Calypte costae	colibri-de-costa
Selasphorus calliope	colibri-calíope
Selasphorus rufus	colibri-ruivo
Selasphorus sasin	colibri-de-allen
Selasphorus platycercus	colibri-de-cauda-larga
Selasphorus heloisa	colibri-de-heloísa
Selasphorus ellioti	colibri-de-elliot
Selasphorus flammula	colibri-dos-vulcões



Figura 41 - colibri-dos-vulcões *Selasphorus flammula*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Selasphorus scintilla	colibri-cintilante
Selasphorus ardens	colibri-de-garganta-ardente
Phaeoptila sordida	colibri-escuro
Riccordia ricordii	esmeralda-cubana
Riccordia bracei	esmeralda-de-brace
Riccordia swainsonii	esmeralda-dominicana

Riccordia maugaeus	esmeralda-porto-riquenha
Riccordia bicolor	colibri-bicolor
Cynanthus latirostris	colibri-de-bico-largo
Cynanthus lawrencei	colibri-de-três-marias
Cynanthus doubledayi	colibri-de-doubleday
Cynanthus auriceps	esmeralda-mexicana
Cynanthus forficatus	esmeralda-de-cozumel
Cynanthus canivetii	esmeralda-de-canivet
Chlorostilbon assimilis	esmeralda-dos-jardins
Chlorostilbon melanorhynchus	esmeralda-ocidental
Chlorostilbon gibsoni	esmeralda-de-bico-vermelho
Chlorostilbon mellisugus	esmeralda-de-cauda-azul
Chlorostilbon olivaresi	esmeralda-de-chiribiquete
Chlorostilbon lucidus	esmeralda-de-bico-laranja
Chlorostilbon russatus	esmeralda-acobreada
Chlorostilbon stenurus	esmeralda-de-cauda-estreita
Chlorostilbon alice	esmeralda-de-cauda-verde
Chlorostilbon poortmani	esmeralda-de-cauda-curta
Basilinna leucotis	colibri-d'orelhas-brancas
Basilinna xantusii	colibri-de-xantus
Pampa curvipennis	asa-de-sabre-mexicano
Pampa pampa	asa-de-sabre-de-cauda-larga
Pampa excellens	asa-de-sabre-de-cauda-comprida
Pampa rufa	asa-de-sabre-ruivo
Abeillia abeillei	colibri-de-garganta-esmeralda
Klais guimeti	colibri-de-cabeça-violeta
Orthorhyncus cristatus	colibri-de-crista-das-antilhas
Anthocephala floriceps	colibri-florido-de-santa-marta
Anthocephala berlepschi	colibri-florido-de-tolima
Stephanoxis lalandi	colibri-de-crista-verde
Stephanoxis loddigesii	colibri-de-crista-violeta
Campylopterus largipennis	asa-de-sabre-cinzento
Campylopterus calcirupicola	asa-de-sabre-do-cerrado
Campylopterus diamantinensis	asa-de-sabre-de-diamantina
Campylopterus hyperythrus	asa-de-sabre-do-roraima
Campylopterus ensipennis	asa-de-sabre-de-cauda-branca
Campylopterus falcatus	asa-de-sabre-lazúli
Campylopterus phainopeplus	asa-de-sabre-de-santa-marta
Campylopterus hemileucurus	asa-de-sabre-violeta
Campylopterus duidae	asa-de-sabre-do-duida
Campylopterus villaviscensio	asa-de-sabre-do-napo
Chalybura urochrysia	colibri-de-cauda-bronze
Chalybura buffonii	colibri-de-buffon
Thalurania colombica	colibri-coroado
Thalurania furcata	colibri-tesoura-verde
Thalurania watertonii	colibri-de-dorso-violeta
Thalurania glaucopis	colibri-de-testa-violeta
Microchera albocoronata	colibri-de-coroa-branca



Figura 42 - asa-de-sabre-violeta *Campylopterus hemileucurus*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Microchera cupreiceps	esmeralda-de-coroa-cobreada
Microchera chionura	esmeralda-de-cauda-branca
Goldmania violiceps	colibri-de-goldman
Goldmania bella	colibri-do-pirre
Eupherusa ridgwayi	colibri-ninfa
Eupherusa poliocerca	colibri-de-cauda-branca
Eupherusa cyanophrys	colibri-de-oaxaca
Eupherusa eximia	colibri-de-cauda-raiada
Eupherusa nigriventris	colibri-de-barriga-preta
Phaeochroa cuvierii	colibri-de-peito-escamoso
Leucippus fallax	colibri-ocre
Thaumasius baeri	colibri-de-tumbes
Thaumasius taczanowskii	colibri-de-garganta-pintalgada
Taphrospilus hypostictus	colibri-de-pintas-verdes
Eupetomena macroura	colibri-cauda-de-andorinha
Eupetomena cirrochloris	colibri-cinzento
Talaphorus chlorocercus	colibri-das-margens
Trochilus polytmus	colibri-rabilongo-de-bico-vermelho
Trochilus scitulus	colibri-rabilongo-de-bico-preto
Ramosomyia violiceps	colibri-de-coroa-violeta
Ramosomyia viridifrons	colibri-de-testa-verde
Ramosomyia wagneri	colibri-de-flancos-canela
Saucerottia cyanocephala	colibri-de-coroa-azul

Saucerottia hoffmanni	colibri-de-hoffmann
Saucerottia beryllina	colibri-berílio
Saucerottia cyanura	colibri-de-cauda-azul
Saucerottia edward	colibri-de-edward
Saucerottia saucerottei	colibri-de-barriga-metálica
Saucerottia cyanifrons	colibri-de-testa-índigo
Saucerottia castaneiventris	colibri-de-barriga-castanha
Saucerottia viridigaster	colibri-de-barriga-verde
Saucerottia cupreicauda	colibri-de-cauda-cobreada
Saucerottia tobaci	colibri-de-tobago
Amazilia rutila	colibri-canela
Amazilia yucatanensis	colibri-do-iucatão
Amazilia tzacatl	colibri-de-cauda-ruiva
Amazilia luciae	colibri-hondurenho
Amazilis amazilia	colibri-amazília
Uranomitra franciae	colibri-de-peito-branco-andino



Figura 43 - colibri-de-peito-branco-andino *Uranomitra franciae*

(Foto: José Frade – Equador)

Chrysuronia goudoti	colibri-de-goudot
Chrysuronia oenone	colibri-de-cauda-dourada
Chrysuronia versicolor	colibri-de-banda-branca
Chrysuronia boucardi	colibri-dos-mangais
Chrysuronia coeruleogularis	colibri-de-colete-azul
Chrysuronia lilliae	colibri-de-barriga-azul
Chrysuronia humboldtii	colibri-de-humboldt

Chrysuronia grayi	colibri-de-cabeça-azul
Chrysuronia brevirostris	colibri-de-peito-branco-guianense
Chrysuronia leucogaster	colibri-de-peito-branco-atlântico
Leucochloris albicollis	colibri-de-garganta-branca
Chionomesa fimbriata	colibri-de-lista-branca
Chionomesa lactea	colibri-de-garganta-safira
Hylocharis sapphirina	colibri-safira
Hylocharis chrysura	colibri-dourado
Elliotomyia chionogaster	colibri-de-peito-claro
Elliotomyia viridicauda	colibri-verde-e-branco
Polyerata amabilis	colibri-de-peito-azul
Polyerata decora	colibri-de-coroa-brilhante
Polyerata rosenbergi	colibri-de-rosenberg
Chlorestes candida	colibri-de-barriga-branca
Chlorestes eliciae	colibri-de-elicia
Chlorestes cyanus	colibri-de-queixo-branco
Chlorestes julie	colibri-de-barriga-violeta
Chlorestes notata	esmeralda-de-garganta-azul



Figura 44 - brilhante-de-peito-fulvo *Heliodoxa rubinoides*

(Foto: João Pereira – Equador)

Musophagidae Turacos

Esta família, que compreende os turacos, é uma das poucas que se encontra totalmente restrita ao continente africano. O nome da família deriva de *Musophaga*, que significa 'comedor de bananas' e, na verdade, os turacos são essencialmente frugívoros, embora também consumam folhas e flores. São aves de médio porte, de hábitos arborícolas, com uma longa cauda, e a maioria das espécies tem uma plumagem com cores vivas.

Espécies: 23

Distribuição: África subsariana

Corythaeola cristata	turaco-gigante
Crinifer personatus	turaco-mascarado
Crinifer concolor	turaco-unicolor
Crinifer leucogaster	turaco-de-barriga-branca
Crinifer piscator	turaco-cinzento
Crinifer zonurus	turaco-de-cauda-barrada



Figura 45 - turaco-de-barriga-branca *Crinifer leucogaster*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Gallirex porphyreolophus	turaco-de-crista-violeta
Gallirex johnstoni	turaco-das-ruwenzori
Menelikornis ruspolii	turaco-de-ruspoli
Menelikornis leucotis	turaco-de-faces-brancas
Tauraco violaceus	turaco-violeta
Tauraco rossae	turaco-de-ross
Tauraco macrorhynchus	turaco-de-bico-amarelo
Tauraco bannermani	turaco-de-bannerman
Tauraco leucolophus	turaco-de-crista-branca
Tauraco erythrolophus	turaco-angolano
Tauraco persa	turaco-da-guiné
Tauraco livingstonii	turaco-de-livingstone
Tauraco schalowi	turaco-de-schalow
Tauraco corythaix	turaco-de-knysna
Tauraco schuettii	turaco-de-bico-preto
Tauraco fischeri	turaco-de-fischer
Tauraco hartlaubi	turaco-de-hartlaub



Figura 46 - turaco-de-ruspoli *Menelikornis ruspolii*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Otididae Abetardas e Sisões

Estas são aves terrestres de porte médio a grande, que vivem em zonas muito abertas, como sejam estepes ou planícies cerealíferas. Na maioria das espécies desta família, os machos são bastante maiores que as fêmeas e, no caso da abetarda-comum e da abetarda-gigante, os machos podem atingir os 20 kg de peso, o que faz destas as aves voadoras mais pesadas do mundo. Diversas espécies encontram-se ameaçadas, devido à caça e às alterações de habitat.

Espécies: 26

Distribuição: Europa, África, Ásia e Austrália



Figura 47 - abetarda-árabe *Ardeotis arabs*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Otis tarda	abetarda-eurasiática
Ardeotis arabs	abetarda-árabe
Ardeotis kori	abetarda-gigante
Ardeotis nigriceps	abetarda-indiana
Ardeotis australis	abetarda-australiana
Chlamydotis undulata	abetarda-hubara
Chlamydotis macqueenii	abetarda-de-macqueen
Neotis ludwigii	abetarda-de-ludwig

Neotis denhami	abetarda-de-denham
Neotis heuglinii	abetarda-somali
Neotis nuba	abetarda-núbia
Eupodotis senegalensis	sisão-senegalês



Figura 48 - sisão-senegalês *Eupodotis senegalensis*

(Foto: Luís Rodrigues – Quénia)

Eupodotis caerulescens	sisão-azulado
Heterotetrax vigorsii	sisão-do-karoo
Heterotetrax rueppelii	sisão-de-rüppell
Heterotetrax humilis	sisão-somali
Lophotis savilei	sisão-saheliano
Lophotis gindiana	sisão-etíope
Lophotis ruficrista	sisão-de-poupa-vermelha
Afrotis afra	sisão-d'asa-preta
Afrotis afraoides	sisão-d'asa-branca
Lissotis melanogaster	sisão-de-barriga-preta
Lissotis hartlaubii	sisão-de-hartlaub
Houbaropsis bengalensis	sisão-bengalense
Sypheotides indicus	sisão-pequeno-de-poupa
Tetrax tetrax	sisão-europeu

Cuculidae Cucos, Cucais e afins

O conhecido canto 'cu-cu' deu o nome não apenas ao bem conhecido cuco-canoro, mas também, por extensão, a muitos outros membros da vasta família Cuculidae. Esta inclui não apenas os cucos, mas também cucais, cuas, malcoas, koels, anis e papa-léguas. Cerca de um terço das espécies desta família tem uma estratégia de reprodução baseada no parasitismo, sendo os ovos depositados nos ninhos de outras espécies.

Espécies: 157

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Guira guira	ani-branco
Crotophaga major	ani-grande
Crotophaga ani	ani-de-bico-liso
Crotophaga sulcirostris	ani-de-bico-rugoso
Tapera naevia	cuco-riscado
Dromococcyx phasianellus	cuco-faisão
Dromococcyx pavoninus	cuco-pavão
Morococcyx erythropygus	cuco-terrestre-pequeno



Figura 49 - ani-de-bico-rugoso *Crotophaga sulcirostris*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Geococcyx californianus	papa-léguas-grande
Geococcyx velox	papa-léguas-pequeno
Neomorphus geoffroyi	cuco-terrestre-de-barriga-ruiva
Neomorphus squamiger	cuco-terrestre-escamoso
Neomorphus radiolosus	cuco-terrestre-barrado
Neomorphus rufipennis	cuco-terrestre-d'asa-ruiva
Neomorphus pucheranii	cuco-terrestre-de-bico-vermelho
Centropus milo	cucal-das-salomão
Centropus ateralbus	cucal-de-pescoço-branco
Centropus menbeki	cucal-bico-de-marfim
Centropus chalybeus	cucal-de-biak
Centropus unirufus	cucal-ruivo
Centropus chlororhynchos	cucal-do-ceilão
Centropus melanops	cucal-de-faces-pretas
Centropus steerii	cucal-de-mindoro
Centropus rectunguis	cucal-de-dedos-curtos
Centropus celebensis	cucal-de-celebes
Centropus anselli	cucal-gabonês
Centropus leucogaster	cucal-de-garganta-preta
Centropus senegalensis	cucal-senegalês
Centropus monachus	cucal-de-cabeça-azulada



Figura 50 - cucal-real *Centropus sinensis*

(Foto: Paul Bourdin – Índia)

Centropus cupreicaudus	cucal-cauda-de-cobre
Centropus superciliosus	cucal-de-sobrancelhas
Centropus burchellii	cucal-de-burchell
Centropus nigrorufus	cucal-javanês
Centropus sinensis	cucal-real
Centropus toulou	cucal-malgaxe
Centropus goliath	cucal-golias
Centropus grillii	cucal-preto
Centropus viridis	cucal-filipino
Centropus bengalensis	cucal-pequeno
Centropus violaceus	cucal-violáceo
Centropus bernsteini	cucal-de-bico-preto
Centropus spilopterus	cucal-das-kai
Centropus phasianinus	cucal-faisão
Centropus andamanensis	cucal-das-andamão
Carpococcyx radiceus	cuco-terrestre-do-bornéu
Carpococcyx viridis	cuco-terrestre-de-samatra
Carpococcyx renauldi	cuco-terrestre-indochinês
Coua delalandei	cua-de-delalande
Coua cristata	cua-de-poupa
Coua verreauxi	cua-de-verreaux
Coua caerulea	cua-azul
Coua ruficeps	cua-de-barrete-vermelho
Coua olivaceiceps	cua-de-barrete-oliváceo
Coua reynaudii	cua-de-testa-vermelha
Coua coquereli	cua-de-coquerel
Coua cursor	cua-corredor
Coua gigas	cua-gigante
Coua serriana	cua-de-peito-vermelho
Rhinortha chlorophaea	malcoa-de-raffles
Ceuthmochares aereus	malcoa-azul
Ceuthmochares australis	malcoa-verde
Taccocua leschenaultii	malcoa-insípida
Zanclostomus javanicus	malcoa-de-bico-vermelho
Rhamphococcyx calyorhynchus	malcoa-de-bico-amarelo
Phaenicophaeus curvirostris	malcoa-de-peito-castanho
Phaenicophaeus oeneicaudus	malcoa-das-mentawai
Phaenicophaeus pyrrhocephalus	malcoa-de-faces-vermelhas
Phaenicophaeus sumatranus	malcoa-vinosa
Phaenicophaeus viridirostris	malcoa-de-faces-azuis
Phaenicophaeus diardi	malcoa-lúgubre
Phaenicophaeus tristis	malcoa-de-bico-verde

Dasylophus superciliosus	malcoa-de-crista-vermelha
Dasylophus cumingi	malcoa-escamada
Clamator coromandus	cuco-d'asa-castanha
Clamator glandarius	cuco-rabilongo
Clamator levaillantii	cuco-de-levaillant
Clamator jacobinus	cuco-jacobino
Coccycua minuta	cuco-ruivo
Coccycua pumila	cuco-anão
Coccycua cinerea	cuco-cinzento
Piaya mexicana	cuco-mexicano
Piaya cayana	cuco-miador
Piaya melanogaster	cuco-de-barriga-preta
Coccyzus melacoryphus	cuco-canela
Coccyzus americanus	cuco-d'asa-vermelha
Coccyzus euleri	cuco-de-barriga-branca
Coccyzus minor	cuco-dos-mangais
Coccyzus ferrugineus	cuco-do-coco
Coccyzus erythropthalmus	cuco-de-bico-preto
Coccyzus lansbergi	cuco-de-barrete-cinzento
Coccyzus pluvialis	cuco-de-barriga-ruiva
Coccyzus rufigularis	cuco-de-garganta-ruiva
Coccyzus vetula	cuco-jamaicano
Coccyzus merlini	cuco-cubano
Coccyzus vieilloti	cuco-porto-riquenho
Coccyzus longirostris	cuco-dominicano
Pachycoccyx audeberti	cuco-de-bico-grosso
Microdynamis parva	koel-anão
Eudynamys scolopaceus	koel-ocidental
Eudynamys melanorhynchus	koel-de-bico-preto
Eudynamys orientalis	koel-oriental
Urodynamis taitensis	koel-rabilongo
Scythrops novaehollandiae	cuco-tucano
Chrysococcyx maculatus	cuco-esmeraldino-asiático
Chrysococcyx xanthorhynchus	cuco-violeta
Chrysococcyx caprius	cuco-bronzeado-africano
Chrysococcyx klaas	cuco-de-klaas
Chrysococcyx flavigularis	cuco-de-garganta-amarela
Chrysococcyx cupreus	cuco-esmeraldino-africano
Chalcites megarhynchus	cuco-de-bico-longo
Chalcites basalis	cuco-bronzeado-de-horsfield
Chalcites osculans	cuco-d'orelhas-pretas
Chalcites ruficollis	cuco-bronzeado-de-garganta-ruiva

Chalcites lucidus	cuco-verde-brilhante



Figura 51 - cuco-esmeraldino-africano *Chrysococcyx cupreus*

(Foto: Liam O'Connor – África do Sul)

Chalcites meyerii	cuco-verde-d'orelhas-brancas
Chalcites minutillus	cuco-bronzeado-pequeno
Chalcites crassirostris	cuco-bronzeado-das-molucas
Heteroscenes pallidus	cuco-pálido
Caliechthrus leucolophus	cuco-de-coroa-branca
Cacomantis castaneiventris	cuco-de-peito-castanho
Cacomantis flabelliformis	cuco-cauda-de-leque
Cacomantis sonneratii	cuco-zebra
Cacomantis merulinus	cuco-lamurioso
Cacomantis passerinus	cuco-de-barriga-cinzenta
Cacomantis sepulcralis	cuco-indonésio
Cacomantis virescens	cuco-de-celebes
Cacomantis variolosus	cuco-sarapintado
Cacomantis blandus	cuco-do-almirantado
Cacomantis addendus	cuco-das-salomão

Cacomantis aeruginosus	cuco-das-molucas
Cercococcyx mechowi	cuco-escuro
Cercococcyx olivinus	cuco-oliváceo
Cercococcyx montanus	cuco-montês
Surniculus velutinus	cuco-drongo-filipino
Surniculus lugubris	cuco-drongo-de-cauda-quadrada
Surniculus dicruroides	cuco-drongo-de-cauda-forcada
Surniculus musschenbroeki	cuco-drongo-das-molucas
Hierococcyx vagans	cuco-gavião-de-bigodes
Hierococcyx sparverioides	cuco-gavião-grande
Hierococcyx bocki	cuco-gavião-escuro
Hierococcyx varius	cuco-gavião-indiano
Hierococcyx hyperythrus	cuco-gavião-ruivo
Hierococcyx pectoralis	cuco-gavião-filipino
Hierococcyx fugax	cuco-gavião-fugidio
Hierococcyx nisicolor	cuco-gavião-assobiador
Cuculus clamosus	cuco-preto
Cuculus solitarius	cuco-de-peito-vermelho
Cuculus poliocephalus	cuco-pequeno
Cuculus crassirostris	cuco-de-celebes
Cuculus micropterus	cuco-d'asa-curta
Cuculus rochii	cuco-malgaxe
Cuculus gularis	cuco-africano
Cuculus saturatus	cuco-dos-himalaias
Cuculus optatus	cuco-oriental
Cuculus lepidus	cuco-das-sundas
Cuculus canorus	cuco-canoro
Nannococcyx psix	cuco-de-santa-helena

Mesitornithidae Mesitos

Pequena família composta por três espécies de aves terrestres, todas endémicas de Madagáscar. Estas aves não voam ou só raramente o fazem; procuram alimento no solo, sendo a sua dieta composta por sementes e insectos. Geneticamente os mesitos são próximos dos pombos e dos cortiçóis. Esta é a única família de aves com mais de duas espécies em que todos os seus membros têm actualmente um estatuto de ameaça.

Espécies: 3

Distribuição: Madagáscar

Mesitornis variegatus	mesito-de-peito-branco
Mesitornis unicolor	mesito-castanho
Monias benschi	mesito-de-bico-curvo



Figura 52 - mesito-de-bico-curvo *Monias benschi*

(Foto: Francis Argyle – Madagáscar)

Pteroclidae Cortiçóis

Os cortiçóis são aves terrestres, gregárias, que vivem no solo, em zonas pouco arborizadas, como sejam planícies, savanas e semidesertos. Têm uma plumagem críptica, que lhes permite serem confundidas com o meio envolvente. A sua dieta, composta sobretudo por sementes, é pobre em água; para se hidratarem, os cortiçóis deslocam-se diariamente a pontos de água, muitas vezes situados a grande distância, juntando-se aí em grandes bandos para beber.

Espécies: 16

Distribuição: Ásia, África incluindo Madagáscar e sul da Europa

Syrrhaptes tibetanus	cortiçol-do-tibete
Syrrhaptes paradoxus	cortiçol-das-estepes
Pterocles alchata	cortiçol-de-barriga-branca
Pterocles namaqua	cortiçol-namaqua



Figura 53 - cortiçol-namaqua *Pterocles namaqua*

(Foto: António Martins – Angola)

Pterocles exustus	cortiçol-de-barriga-castanha
Pterocles senegallus	cortiçol-malhado
Pterocles orientalis	cortiçol-de-barriga-preta
Pterocles gutturalis	cortiçol-de-garganta-amarela
Pterocles coronatus	cortiçol-coroado
Pterocles decoratus	cortiçol-de-faces-pretas
Pterocles personatus	cortiçol-malgaxe
Pterocles lichtensteinii	cortiçol-de-lichtenstein
Pterocles indicus	cortiçol-indiano
Pterocles quadricinctus	cortiçol-de-quatro-golas
Pterocles bicinctus	cortiçol-de-duas-golas
Pterocles burchelli	cortiçol-de-burchell



Figura 54 - cortiçol-de-barriga-preta *Pterocles orientalis*

(Foto: José Frade – Espanha)

Columbidae Pombos, Rolas e afins

Com mais de 350 membros, esta família é a quarta mais numerosa. Abrange os vulgares pombos, as rolas e alguns grupos afins, como os pombos-verdes e os pombos-da-fruta. Muitas espécies ocorrem apenas em ilhas, o que as torna especialmente vulneráveis – na realidade, cerca de 60 espécies desta família têm actualmente estatuto de ameaça. Desde 1600 extinguiram-se pelo menos dez espécies, incluindo o pombo-viajante e o dodó.

Espécies: 352

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Columba livia	pombo-das-rochas
Columba rupestris	pombo-das-colinas
Columba leuconota	pombo-das-neves
Columba guinea	pombo-malhado
Columba albitorques	pombo-de-colar-branco
Columba oenas	pombo-bravo
Columba eversmanni	pombo-do-turquestão
Columba oliviae	pombo-somali



Figura 55 - pombo-de-colar-branco *Columba albitorques*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Columba palumbus	pombo-torcaz
Columba trocaz	pombo-da-madeira
Columba bollii	pombo-turquesa
Columba junoniae	pombo-rabil
Columba unicincta	pombo-pálido
Columba arquatrix	pombo-d'olho-amarelo
Columba sjostedti	pombo-camaronês
Columba thomensis	pombo-de-são-tomé
Columba pollenii	pombo-das-comores
Columba hodgsonii	pombo-mosqueado
Columba albinucha	pombo-de-nuca-branca
Columba pulchricollis	pombo-cinzento
Columba elphinstonii	pombo-dos-nilgiris
Columba torringtoniae	pombo-do-ceilão
Columba punicea	pombo-púrpura
Columba argentina	pombo-prateado
Columba palumboides	pombo-das-andamão
Columba janthina	pombo-japonês
Columba versicolor	pombo-das-bonin
Columba jouyi	pombo-das-ryukyu
Columba vitiensis	pombo-metálico
Columba leucomela	pombo-de-cabeça-branca
Columba pallidiceps	pombo-de-patas-amarelas
Columba delegorguei	pombo-de-delegorgue
Columba iriditorques	pombo-de-nuca-bronzeada
Columba malherbii	pombo-de-malherbe
Aplopelia larvata	pombo-canela
Patagioenas leucocephala	pombo-de-coroa-branca
Patagioenas squamosa	pombo-de-nuca-escamosa
Patagioenas speciosa	pombo-escamoso
Patagioenas picazuro	pombo-d'asa-branca
Patagioenas corensis	pombo-d'óculos
Patagioenas maculosa	pombo-do-orvalho
Patagioenas fasciata	pombo-de-coleira-interrompida
Patagioenas araucana	pombo-chileno
Patagioenas caribaea	pombo-jamaicano
Patagioenas cayennensis	pombo-de-barriga-clara
Patagioenas flavirostris	pombo-de-bico-vermelho
Patagioenas oenops	pombo-peruano
Patagioenas inornata	pombo-unicolor
Patagioenas plumbea	pombo-plúmbeo
Patagioenas subvinacea	pombo-vinoso
Patagioenas nigrirostris	pombo-de-bico-curto
Patagioenas goodsoni	pombo-do-chocó
Nesoenas picturatus	pombo-malgaxe
Nesoenas rodericanus	pombo-de-rodrigues
Nesoenas mayeri	pombo-rosado

Streptopelia turtur	rola-brava
Streptopelia lugens	rola-escura
Streptopelia hypopyrrha	rola-camaronesa
Streptopelia orientalis	rola-oriental
Streptopelia bitorquata	rola-das-sundas
Streptopelia dusumieri	rola-de-colar-filipina
Streptopelia decaocto	rola-turca
Streptopelia xanthocycla	rola-de-colar-birmanesa
Streptopelia roseogrisea	rola-rosada
Streptopelia reichenowi	rola-de-reichenow
Streptopelia decipiens	rola-gemedora
Streptopelia semitorquata	rola-d'olho-vermelho
Streptopelia capicola	rola-do-cabo
Streptopelia vinacea	rola-vinosa
Streptopelia tranquebarica	rola-birmanesa
Spilopelia chinensis	rola-maculada



Figura 56 - rola-maculada *Spilopelia chinensis*

(Foto: Lara Groß – Malásia)

Spilopelia senegalensis	rola-do-senegal
Macropygia unchall	rola-cuco-barrada
Macropygia amboinensis	rola-cuco-de-amboíno
Macropygia doreya	rola-cuco-sultana
Macropygia emiliana	rola-cuco-das-sundas
Macropygia cinnamomea	rola-cuco-de-engano
Macropygia modiglianii	rola-cuco-das-barusan

Macropygia magna	rola-cuco-timorense
Macropygia timorlaoensis	rola-cuco-das-tanimbar
Macropygia macassariensis	rola-cuco-das-flores
Macropygia tenuirostris	rola-cuco-filipina
Macropygia phasianella	rola-cuco-castanha
Macropygia rufipennis	rola-cuco-das-andamão
Macropygia nigrirostris	rola-cuco-de-bico-preto
Macropygia mackinlayi	rola-cuco-de-mackinlay
Macropygia ruficeps	rola-cuco-pequena
Reinwardtoena reinwardti	rola-rabuda-grande
Reinwardtoena browni	rola-rabuda-bicolor
Reinwardtoena crassirostris	rola-rabuda-de-crista
Turacoena manadensis	rola-cuco-de-celebes
Turacoena sulaensis	rola-cuco-das-sula
Turacoena modesta	rola-cuco-preta
Turtur chalcospilos	rola-esmeraldina
Turtur abyssinicus	rola-saheliana
Turtur afer	rola-de-manchas-azuis
Turtur tympanistria	rola-de-garganta-branca
Turtur brehmeri	rola-de-cabeça-azul
Oena capensis	rola-rabilonga
Chalcophaps indica	rola-esmeralda-de-cabeça-cinzenta
Chalcophaps longirostris	rola-esmeralda-de-cabeça-castanha



Figura 57 - pombo-de-crista *Ocyphaps lophotes*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Chalcophaps stephani	rola-esmeralda-de-dorso-castanho
Henicophaps albifrons	pombo-bronze-de-testa-branca
Henicophaps foersteri	pombo-bronze-da-nova-bretanha
Phaps chalcoptera	pombo-bronze-comum
Phaps elegans	pombo-bronze-elegante
Phaps histrionica	pombo-bronze-arlequim
Ocyphaps lophotes	pombo-de-crista
Geophaps plumifera	pombo-espinhoso
Geophaps scripta	pombo-aborígene
Geophaps smithii	pombo-de-smith
Trugon terrestris	pombo-de-bico-grosso
Leucosarcia melanoleuca	pombo-wonga
Petrophassa rufipennis	pombo-rupestre-d'asa-ruiva
Petrophassa albipennis	pombo-rupestre-d'asa-branca
Geopelia cuneata	rola-diamante
Geopelia striata	rola-zebra-comum
Geopelia placida	rola-serena
Geopelia maugeus	rola-zebra-timorense
Geopelia humeralis	rola-de-nuca-rosácea
Columbina inca	rolinha-inca
Columbina squammata	rolinha-escamosa
Columbina passerina	rolinha-cinzenta
Columbina minuta	rolinha-pequena
Columbina buckleyi	rolinha-equatoriana
Columbina talpacoti	rolinha-corada
Columbina picui	rolinha-picuí
Columbina cruziana	rolinha-coaxante
Columbina cyanopis	rolinha-d'olho-azul
Claravis pretiosa	rolinha-azulada
Paraclaravis geoffroyi	rolinha-d'asa-púrpura
Paraclaravis mondetoura	rolinha-de-peito-castanho
Metriopelia ceciliae	rolinha-d'óculos
Metriopelia morenoi	rolinha-de-moreno
Metriopelia melanoptera	rolinha-d'asa-preta
Metriopelia aymara	rolinha-de-pintas-douradas
Uropelia campestris	rolinha-vaqueira
Starnoenas cyanocephala	rola-perdiz-cubana
Geotrygon purpurata	rola-perdiz-do-chocó
Geotrygon saphirina	rola-perdiz-safira
Geotrygon versicolor	rola-perdiz-jamaicana
Geotrygon montana	rola-perdiz-castanha
Geotrygon violacea	rola-perdiz-violeta
Geotrygon caniceps	rola-perdiz-de-testa-cinza
Geotrygon leucometopia	rola-perdiz-de-testa-branca
Geotrygon chrysia	rola-perdiz-das-caraíbas
Geotrygon mystacea	rola-perdiz-de-bigodes
Leptotrygon veraguensis	rola-de-bigodes
Leptotila verreauxi	rola-de-pontas-brancas



Figura 58 - rola-de-pontas-brancas *Leptotila verreauxi*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Leptotila megalura	rola-dos-yungas
Leptotila rufaxilla	rola-de-testa-branca
Leptotila plumbeiceps	rola-de-cabeça-cinzenta
Leptotila pallida	rola-pálida
Leptotila battyi	rola-de-dorso-castanho
Leptotila wellsi	rola-granadina
Leptotila jamaicensis	rola-jamaicana
Leptotila cassinii	rola-de-peito-cinzento
Leptotila ochraceiventris	rola-de-barriga-ocre
Leptotila conoveri	rola-de-tolima
Zentrygon carrikeri	rola-de-tuxtla
Zentrygon costaricensis	rola-costa-riquenha
Zentrygon lawrencii	rola-sombria
Zentrygon albifacies	rola-de-faces-brancas
Zentrygon frenata	rola-de-freios-do-sul
Zentrygon linearis	rola-de-freios-do-norte
Zentrygon chiriquensis	rola-de-chiriqui
Zentrygon goldmani	rola-de-coroa-ruiva
Ectopistes migratorius	pombo-viajante
Zenaida macroura	rola-carpideira
Zenaida graysoni	rola-de-socorro
Zenaida auriculata	rola-de-ouvidos
Zenaida aurita	rola-caribenha
Zenaida galapagoensis	rola-das-galápagos



Figura 59 - rola-d'asa-branca *Zenaida asiatica*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Zenaida asiatica	rola-d'asa-branca
Zenaida meloda	rola-do-pacífico
Caloenas nicobarica	pombo-de-nicobar
Caloenas maculata	pombo-verde-malhado
Gallicolumba tristigmata	pombo-terrestre-de-celebes
Gallicolumba rufigula	pombo-terrestre-de-peito-dourado
Gallicolumba luzonica	pombo-apunhalado-de-lução
Gallicolumba crinigera	pombo-apunhalado-de-mindanau
Gallicolumba platenae	pombo-apunhalado-de-mindoro
Gallicolumba keayi	pombo-apunhalado-de-negros
Gallicolumba menagei	pombo-apunhalado-das-sulu
Pampusana hoedtii	pombo-terrestre-de-wetar
Pampusana jobiensis	pombo-terrestre-de-peito-branco
Pampusana kubaryi	pombo-terrestre-das-carolinas
Pampusana erythroptera	pombo-terrestre-das-tuamotu
Pampusana xanthonura	pombo-terrestre-das-marianas
Pampusana norfolkensis	pombo-terrestre-de-norfolk
Pampusana stairi	pombo-terrestre-tímido
Pampusana sanctaecrucis	pombo-terrestre-de-santa-cruz
Pampusana ferruginea	pombo-terrestre-de-tana
Pampusana salamonis	pombo-terrestre-das-salomão
Pampusana rubescens	pombo-terrestre-das-marquesas
Pampusana beccarii	pombo-terrestre-de-peito-cinzento
Pampusana canifrons	pombo-terrestre-de-palau

Microgoura meeki	pombo-coroado-de-choiseul
Otidiphaps nobilis	pombo-faisão
Goura cristata	pombo-coroado-ocidental
Goura scheepmakeri	pombo-coroado-de-scheepmaker
Goura sclaterii	pombo-coroado-de-sclater
Goura victoria	pombo-coroado-de-vitória
Raphus cucullatus	dodô
Pezophaps solitaria	solitário-de-rodrigues
Didunculus strigirostris	pombo-dentado
Phapitreron leucotis	pombo-castanho-d'orelhas-brancas
Phapitreron amethystinus	pombo-castanho-ametista
Phapitreron cinereiceps	pombo-castanho-de-tawitawi
Phapitreron brunneiceps	pombo-castanho-de-mindanau
Treron fulvicollis	pombo-verde-de-cabeça-ruiva
Treron olax	pombo-verde-pequeno
Treron vernans	pombo-verde-de-pescoço-rosa



Figura 60 - pombo-verde-de-pescoço-rosa *Treron vernans*

(Foto: Lara Groß – Malásia)

Treron bicinctus	pombo-verde-de-pescoço-laranja
Treron pompadora	pombo-verde-do-ceilão
Treron affinis	pombo-verde-de-testa-cinzenta
Treron phayrei	pombo-verde-indochinês
Treron chloropterus	pombo-verde-das-andamão
Treron axillaris	pombo-verde-filipino

Treron aromaticus	pombo-verde-de-buru
Treron curvirostra	pombo-verde-de-bico-grosso
Treron griseicauda	pombo-verde-de-faces-cinzentas
Treron teysmannii	pombo-verde-de-sumba
Treron floris	pombo-verde-das-flores
Treron psittaceus	pombo-verde-timorense
Treron capellei	pombo-verde-grande
Treron phoenicopterus	pombo-verde-de-patas-amarelas
Treron waalia	pombo-verde-amarelo
Treron australis	pombo-verde-malgaxe
Treron griveaudi	pombo-verde-das-comores
Treron calvus	pombo-verde-africano
Treron pembaensis	pombo-verde-de-pemba
Treron sanctithomae	pombo-verde-de-são-tomé
Treron apicauda	pombo-verde-de-cauda-fina
Treron oxyurus	pombo-verde-de-samatra
Treron seimundi	pombo-verde-d'olho-azul
Treron sphenurus	pombo-verde-de-cunha
Treron sieboldii	pombo-verde-japonês
Treron permagnus	pombo-verde-das-ryukyu
Treron formosae	pombo-verde-da-formosa
Megaloprepia formosa	pombo-da-fruta-de-peito-escarlate
Megaloprepia magnifica	pombo-da-fruta-magnífico
Ramphiculus marchei	pombo-da-fruta-flamejante
Ramphiculus merrilli	pombo-da-fruta-filipino
Ramphiculus occipitalis	pombo-da-fruta-citrino
Ramphiculus fischeri	pombo-da-fruta-de-fischer
Ramphiculus jambu	pombo-da-fruta-jambu
Ramphiculus subgularis	pombo-da-fruta-de-banggai
Ramphiculus gularis	pombo-da-fruta-de-barba-castanha
Ramphiculus mangoliensis	pombo-da-fruta-das-sula
Ramphiculus leclancheri	pombo-da-fruta-de-barba-preta
Ptilinopus cinctus	pombo-da-fruta-de-dorso-preto
Ptilinopus alligator	pombo-da-fruta-de-coleira
Ptilinopus dohertyi	pombo-da-fruta-de-sumba
Ptilinopus porphyreus	pombo-da-fruta-rosáceo
Ptilinopus perlatus	pombo-da-fruta-perlado
Ptilinopus ornatus	pombo-da-fruta-ornamentado
Ptilinopus tannensis	pombo-da-fruta-de-vanuatu
Ptilinopus aurantiifrons	pombo-da-fruta-de-testa-laranja
Ptilinopus wallacii	pombo-da-fruta-de-wallace
Ptilinopus superbus	pombo-da-fruta-soberbo
Ptilinopus perousii	pombo-da-fruta-multicolor
Ptilinopus porphyraceus	pombo-da-fruta-de-tonga
Ptilinopus ponapensis	pombo-da-fruta-das-carolinas
Ptilinopus hernsheimi	pombo-da-fruta-de-kosrae
Ptilinopus pelewensis	pombo-da-fruta-de-palau
Ptilinopus rarotongensis	pombo-da-fruta-das-cook

Ptilinopus roseicapilla	pombo-da-fruta-das-marianas
Ptilinopus regina	pombo-da-fruta-real
Ptilinopus richardsii	pombo-da-fruta-de-richards
Ptilinopus chrysogaster	pombo-da-fruta-de-raiatea
Ptilinopus purpuratus	pombo-da-fruta-do-taiti
Ptilinopus chalcurus	pombo-da-fruta-de-makatea
Ptilinopus coralensis	pombo-da-fruta-das-tuamotu
Ptilinopus greyi	pombo-da-fruta-de-barriga-vermelha
Ptilinopus huttoni	pombo-da-fruta-de-rapa
Ptilinopus dupetithouarsii	pombo-da-fruta-de-coroa-branca
Ptilinopus mercierii	pombo-da-fruta-das-marquesas
Ptilinopus insularis	pombo-da-fruta-de-henderson
Ptilinopus coronulatus	pombo-da-fruta-coroado
Ptilinopus pulchellus	pombo-da-fruta-bonito
Ptilinopus monacha	pombo-da-fruta-monge
Ptilinopus rivoli	pombo-da-fruta-de-peito-branco
Ptilinopus speciosus	pombo-da-fruta-de-geelvink
Ptilinopus solomonensis	pombo-da-fruta-das-salomão
Ptilinopus viridis	pombo-da-fruta-de-peito-vinoso
Ptilinopus eugeniae	pombo-da-fruta-de-cabeça-branca



Figura 61 - pombo-da-fruta-dourado *Ptilinopus luteovirens*

(Foto: Eric Forsyth - Fiji)

Ptilinopus iozonus	pombo-da-fruta-de-barriga-laranja
Ptilinopus insolitus	pombo-da-fruta-das-bismarck
Ptilinopus hyogastrus	pombo-da-fruta-de-cabeça-cinzenta
Ptilinopus granulifrons	pombo-da-fruta-carunculado
Ptilinopus melanospilus	pombo-da-fruta-de-nuca-preta
Ptilinopus nainus	pombo-da-fruta-anão
Ptilinopus arcanus	pombo-da-fruta-de-negros
Ptilinopus victor	pombo-da-fruta-laranja
Ptilinopus luteovirens	pombo-da-fruta-dourado
Ptilinopus layardi	pombo-da-fruta-aveludado
Ptilinopus holosericea	pombo-da-fruta-da-nova-caledónia
Alectroenas nitidissimus	pombo-azul-das-maurícias
Alectroenas madagascariensis	pombo-azul-malgaxe
Alectroenas sganzini	pombo-azul-das-comores
Alectroenas pulcherrimus	pombo-azul-das-seicheles
Ducula poliocephala	pombo-imperial-filipino
Ducula forsteni	pombo-imperial-de-barriga-branca
Ducula mindorensis	pombo-imperial-de-mindoro
Ducula radiata	pombo-imperial-de-cabeça-cinzenta
Ducula carola	pombo-imperial-malhado
Ducula aenea	pombo-imperial-verde
Ducula oenothorax	pombo-imperial-de-engano
Ducula nicobarica	pombo-imperial-de-nicobar
Ducula perspicillata	pombo-imperial-de-lunetas
Ducula neglecta	pombo-imperial-de-ceram
Ducula concinna	pombo-imperial-elegante
Ducula pacifica	pombo-imperial-do-pacífico
Ducula oceanica	pombo-imperial-micronésio
Ducula aurorae	pombo-imperial-polinésio
Ducula galeata	pombo-imperial-das-marquesas
Ducula rubricera	pombo-imperial-de-cera-vermelha
Ducula myristicivora	pombo-imperial-das-especiarias
Ducula geelvinkiana	pombo-imperial-de-geelvink
Ducula rufigaster	pombo-imperial-de-cauda-púrpura
Ducula basilica	pombo-imperial-de-barriga-canela
Ducula finschii	pombo-imperial-de-finsch
Ducula chalconota	pombo-imperial-ruivo
Ducula pistrinaria	pombo-imperial-insular
Ducula rosacea	pombo-imperial-róseo
Ducula whartoni	pombo-imperial-fúnebre
Ducula pickeringii	pombo-imperial-cinzento
Ducula latrans	pombo-imperial-ladrador
Ducula brenchleyi	pombo-imperial-das-salomão
Ducula bakeri	pombo-imperial-de-vanuatu
Ducula goliath	pombo-imperial-gigante
Ducula pinon	pombo-imperial-de-pinon
Ducula melanochroa	pombo-imperial-preto
Ducula mullerii	pombo-imperial-de-colar

Ducula zoeae	pombo-imperial-de-zoe
Ducula cuprea	pombo-imperial-dos-nilgiris
Ducula badia	pombo-imperial-montês
Ducula lacernulata	pombo-imperial-de-dorso-escuro
Ducula cineracea	pombo-imperial-timorense
Ducula bicolor	pombo-imperial-bicolor
Ducula luctuosa	pombo-imperial-prateado
Ducula spilorrhoa	pombo-imperial-isabel
Ducula subflavescens	pombo-imperial-amarelado
Lopholaimus antarcticus	pombo-de-coque
Hemiphaga novaeseelandiae	pombo-maori



Figura 62 - pombo-maori *Hemiphaga novaeseelandiae*

(Foto: Lara Groß - Nova Zelândia)

Hemiphaga chathamensis	pombo-das-chatham
Cryptophaps poecilorrhoa	pombo-sombrio
Gymnophaps albertisii	pombo-montês-da-papua
Gymnophaps mada	pombo-montês-de-buru
Gymnophaps stalkeri	pombo-montês-de-ceram
Gymnophaps solomonensis	pombo-montês-das-salomão

São aves aquáticas, que apresentam algumas semelhanças com os ralídeos, a saber: o pescoço longo, o corpo esguio, a cauda larga e o bico pontiagudo. Apreciam zonas com boa cobertura e podem ser muito esquivas. Uma das três espécies, o mergulhão-sol, tem a particularidade, única entre as aves, de ter uma prega de pele por baixo de cada asa, que lhe permite acolher uma ou duas crias de cada lado e, em caso de perigo, levantar voo com elas 'a bordo'.

Espécies: 3

Distribuição: América, África e Ásia, em latitudes tropicais



Figura 63 - pés-de-barbatana-africano *Podica senegalensis*

(Foto: Bailey Musgrave – África do Sul)

Podica senegalensis	pés-de-barbatana-africano
Heliopais personatus	pés-de-barbatana-asiático
Heliornis fulica	mergulhão-sol

Anteriormente consideradas parte dos ralídeos, estudos genéticos recentes demonstraram que estas tímidas aves formam uma família à parte, mais próxima dos pés-de-barbatana. A maioria apresenta dimorfismo sexual marcado e uma clara preferência por zonas florestais, características incomuns nos ralídeos, embora também habitem zonas próximas de água dentro da floresta. Quatro das espécies são endémicas de Madagáscar e outras quatro da Papua.

Espécies: 15

Distribuição: África subsariana, Madagáscar e ilha da Papua



Figura 64 - franga-d'água-malgaxe *Sarothrura insularis*

(Foto: Francis Argyle – Madagáscar)

Mentocrex kioloides	frango-d'água-de-cabeça-cinzenta
Mentocrex beankaensis	frango-d'água-de-tsingy
Sarothrura pulchra	franga-d'água-pintada
Sarothrura elegans	franga-d'água-elegante
Sarothrura rufa	franga-d'água-de-peito-vermelho
Sarothrura lugens	franga-d'água-de-cabeça-vermelha
Sarothrura boehmi	franga-d'água-de-boehm
Sarothrura ayresi	franga-d'água-d'asa-branca

Sarothrura affinis	franga-d'água-estriada
Sarothrura insularis	franga-d'água-malgaxe
Sarothrura watersi	franga-d'água-de-bico-fino
Rallicula leucospila	franga-d'água-de-listas-brancas
Rallicula rubra	franga-d'água-ferrugínea
Rallicula forbesi	franga-d'água-de-forbes
Rallicula mayri	franga-d'água-de-mayr



Figura 65 - franga-d'água-elegante *Sarothrura elegans*

(Foto: Liam O'Connor – África do Sul)

Rallidae Galinhas-d'água, Galeirões e afins

As aves desta família lembram galináceos, mas o seu bico, as patas e os dedos são mais compridos, estando em muitos casos adaptados ao meio aquático. Habitam caniçais e vegetação densa na proximidade de água, onde podem ser de difícil detecção, mas também florestas e pradarias. São omnívoras e muitas delas migratórias, tendo esta família colonizado com sucesso várias ilhas oceânicas isoladas por todo mundo.

Espécies: 153

Distribuição: Cosmopolita, excepto Antárctida

Canirallus oculeus	frango-d'água-de-garganta-cinzenta
Anurolimnas castaneiceps	franga-d'água-de-cabeça-castanha
Pardirallus maculatus	frango-d'água-pintalgado
Pardirallus nigricans	frango-d'água-sombrio
Pardirallus sanguinolentus	frango-d'água-plúmbeo
Mustelirallus albicollis	franga-d'água-de-garganta-cinzenta
Mustelirallus cerverai	franga-d'água-de-zapata
Mustelirallus colombianus	franga-d'água-colombiana
Mustelirallus erythrops	franga-d'água-de-bico-vermelho
Amaurolimnas concolor	frango-d'água-liso
Aramides axillaris	frango-d'água-de-pescoço-ruivo



Figura 66 - frango-d'água-de-pescoço-cinzento *Aramides cajaneus*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Aramides mangle	frango-d'água-pequeno
Aramides albiventris	frango-d'água-de-barriga-branca
Aramides cajaneus	frango-d'água-de-pescoço-cinzento
Aramides wolfi	frango-d'água-moreno
Aramides ypecaha	frango-d'água-gigante
Aramides calopterus	frango-d'água-d'asa-ruiva
Aramides saracura	frango-d'água-ardósia
Rallus obsoletus	frango-d'água-da-califórnia
Rallus crepitans	frango-d'água-crepitante
Rallus tenuirostris	frango-d'água-asteca
Rallus longirostris	frango-d'água-dos-mangais
Rallus elegans	frango-d'água-real
Rallus wetmorei	frango-d'água-de-flancos-lisos
Rallus limicola	frango-d'água-virginiano
Rallus semiplumbeus	frango-d'água-de-bogotá
Rallus aequatorialis	frango-d'água-equatoriano
Rallus antarcticus	frango-d'água-austral
Rallus aquaticus	frango-d'água-europeu
Rallus indicus	frango-d'água-asiático
Rallus caerulescens	frango-d'água-africano
Rallus madagascariensis	frango-d'água-malgaxe
Crecopsis egregia	codornizão-africano
Rougetius rougetii	frango-d'água-etíope
Dryolimnas cuvieri	frango-d'água-de-garganta-branca



Figura 67 - frango-d'água-de-okinawa *Hypotaenidia okinawae*

(Foto: Eric Forsyth - Japão)

Dryolimnas augusti	frango-d'água-da-reunião
Crex crex	codornizão-europeu
Aramidopsis plateni	frango-d'água-roncador
Lewinia striata	frango-d'água-listado
Lewinia mirifica	frango-d'água-de-lução
Lewinia pectoralis	frango-d'água-de-peito-cinzento
Lewinia muelleri	frango-d'água-das-auckland
Diaphorapteryx hawkinsi	frango-d'água-de-hawkins
Gallirallus calayanensis	frango-d'água-de-calayan
Gallirallus wallacii	frango-d'água-invisível
Gallirallus australis	frango-d'água-weka



Figura 68 - frango-d'água-weka *Gallirallus australis*

(Foto: Lara Groß – Nova Zelândia)

Gallirallus castaneoventris	frango-d'água-castanho
Gallirallus lafresnayanus	frango-d'água-da-nova-caledónia
Gallirallus modestus	frango-d'água-das-chatham
Gallirallus okinawae	frango-d'água-de-okinawa
Gallirallus torquatus	frango-d'água-zebra
Gallirallus philippensis	frango-d'água-filipino
Gallirallus owstoni	frango-d'água-de-guam
Gallirallus insignis	frango-d'água-de-patas-rosadas
Gallirallus rovianae	frango-d'água-das-salomão
Gallirallus woodfordi	frango-d'água-de-woodford
Gallirallus poecilopterus	frango-d'água-das-fiji
Gallirallus sylvestris	frango-d'água-de-lord-howe

Gallirallus dieffenbachii	frango-d'água-de-dieffenbach
Gallirallus pacificus	frango-d'água-do-taiti
Gallirallus wakensis	frango-d'água-de-wake
Porphyriops melanops	galinha-d'água-pintalgada
Porzana carolina	franga-d'água-americana
Porzana porzana	franga-d'água-grande
Porzana fluminea	franga-d'água-australiana
Tribonyx ventralis	galinha-d'água-de-cauda-preta
Tribonyx mortierii	galinha-d'água-da-tasmânia
Paragallinula angulata	galinha-d'água-pequena
Gallinula tenebrosa	galinha-d'água-escura
Gallinula galeata	galinha-d'água-americana
Gallinula chloropus	galinha-d'água-comum
Gallinula nesiotis	galinha-d'água-de-tristão-da-cunha
Gallinula comeri	galinha-d'água-de-gough
Gallinula silvestris	galinha-d'água-de-makira
Gallinula pacifica	galinha-d'água-de-samoa
Fulica rufifrons	galeirão-de-escudo-vermelho
Fulica cornuta	galeirão-de-chifres
Fulica gigantea	galeirão-gigante
Fulica armillata	galeirão-de-bico-manchado
Fulica atra	galeirão-comum
Fulica cristata	galeirão-de-crista
Fulica newtonii	galeirão-das-mascarenhas



Figura 69 - caimão-americano *Porphyrio martinica*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Fulica alai	galeirão-havaiano
Fulica americana	galeirão-americano
Fulica ardesiaca	galeirão-andino
Fulica leucoptera	galeirão-d'asa-branca
Porphyrio alleni	caimão-de-allen
Porphyrio martinica	caimão-americano
Porphyrio flavirostris	caimão-celeste
Porphyrio porphyrio	caimão-europeu
Porphyrio madagascariensis	caimão-africano
Porphyrio poliocephalus	caimão-de-cabeça-cinzenta
Porphyrio indicus	caimão-de-dorso-preto
Porphyrio pulverulentus	caimão-filipino
Porphyrio melanotus	caimão-australasiano
Porphyrio albus	caimão-branco
Porphyrio paepae	caimão-das-marquesas
Porphyrio mantelli	caimão-takahe-do-norte
Porphyrio hochstetteri	caimão-takahe-do-sul
Rufirallus xenopterus	franga-d'água-de-faces-ruivas
Rufirallus leucopyrrhus	franga-d'água-de-peito-branco
Rufirallus fasciatus	franga-d'água-zebra
Rufirallus schomburgkii	franga-d'água-ocelada
Rufirallus viridis	franga-d'água-de-barrete
Coturnicops exquisitus	franga-d'água-de-swinhoe
Coturnicops noveboracensis	franga-d'água-amarelada
Laterallus notatus	franga-d'água-sarapintada
Laterallus spiloptera	franga-d'água-cinzenta
Laterallus rogersi	franga-d'água-da-inacessível
Laterallus jamaicensis	frango-d'água-escura
Laterallus spilonota	franga-d'água-das-galápagos
Laterallus flaviventer	franga-d'água-de-peito-amarelo
Laterallus exilis	franga-d'água-de-peito-cinzento
Laterallus albigularis	franga-d'água-de-garganta-branca
Laterallus ruber	franga-d'água-ruiva
Laterallus levraudi	franga-d'água-venezuelana
Laterallus melanophaius	franga-d'água-de-flancos-ruivos
Mundia elpenor	frango-d'água-de-ascensão
Aphanocrex podarces	frango-d'água-de-santa-helena
Zapornia flavirostra	franga-d'água-preta
Zapornia olivieri	franga-d'água-sakalava
Zapornia fusca	franga-d'água-de-peito-ruivo
Zapornia paykullii	franga-d'água-mandarina
Zapornia bicolor	franga-d'água-rabinegra
Zapornia akool	franga-d'água-castanha
Zapornia pusilla	franga-d'água-pequena
Zapornia astrictocarpus	franga-d'água-de-santa-helena
Zapornia parva	franga-d'água-bastarda
Zapornia tabuensis	franga-d'água-imaculada
Zapornia monasa	franga-d'água-de-kosrae

Zapornia nigra	franga-d'água-do-taiti
Zapornia atra	franga-d'água-de-henderson
Zapornia sandwichensis	franga-d'água-do-havai
Zapornia palmeri	franga-d'água-de-laysan
Rallina eurizonoides	franga-d'água-de-patas-azuis
Rallina canningi	franga-d'água-das-andamão
Rallina fasciata	franga-d'água-de-patas-vermelhas
Rallina tricolor	franga-d'água-tricolor
Gymnocrex rosenbergii	frango-d'água-de-celebes
Gymnocrex talaudensis	frango-d'água-das-talaud
Gymnocrex plumbeiventris	frango-d'água-de-barriga-cinzenta
Himantornis haematopus	frango-d'água-de-patas-vermelhas
Megacrex inepta	frango-d'água-da-papua
Poliolimnas cinereus	franga-d'água-de-sobrancelha-branca
Aenigmatolimnas marginalis	franga-d'água-raiada
Gallicrex cinerea	galo-d'água
Amaurornis phoenicurus	galinha-d'água-de-peito-branco
Amaurornis olivacea	galinha-do-mato-filipina
Amaurornis magnirostris	galinha-do-mato-das-talaud
Amaurornis isabellina	galinha-do-mato-isabelina
Amaurornis moluccana	galinha-do-mato-das-molucas
Aphanapteryx bonasia	frango-d'água-vermelho
Erythromachus leguati	frango-d'água-de-rodrigues



Figura 70 - franga-d'água-de-sobrancelha-branca *Poliolimnas cinereus*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Estas são aves de média dimensão, pernas compridas, plumagem sedosa e cabeça pequena. São principalmente frugívoras, alimentando-se ao nível do solo dentro de floresta tropical densa. Surpreendentemente, nidificam em cavidades nas árvores. São conhecidas por se aproximarem de habitações humanas, onde as suas fortes vocalizações de alarme na proximidade de predadores são valorizadas por proteger as capoeiras.

Espécies: 3

Distribuição: Bacia amazónica, na América do Sul



Figura 71 - trombeteiro-d'asa-branca *Psophia leucoptera*

(Foto: Dubi Shapiro – Peru)

Psophia crepitans	trombeteiro-d'asa-cinzenta
Psophia leucoptera	trombeteiro-d'asa-branca
Psophia viridis	trombeteiro-d'asa-verde

A silhueta esbelta dos grous e as suas belas danças de acasalamento estão bem presentes no imaginário de muitas culturas humanas. Estas aves de grande dimensão são omnívoras e ocupam habitats abertos de diversos tipos, desde zonas húmidas a desertos. Várias delas são migratórias, juntando-se em enormes bandos de muitos milhares de aves durante o inverno e a passagem migratória.

Espécies: 15

Distribuição: América do Norte, Europa, África, Ásia e Austrália



Figura 72 - grou-coroado-cinzento *Balearica regulorum*

(Foto: Lars Petersson – Quénia)

Balearica regulorum	grou-coroado-cinzento
Balearica pavonina	grou-coroado-preto
Leucogeranus leucogeranus	grou-siberiano
Antigone canadensis	grou-canadiano
Antigone vipio	grou-de-nuca-branca
Antigone antigone	grou-sarus
Antigone rubicunda	grou-brolga
Grus carunculata	grou-carunculado

Grus paradisea	grou-do-paraíso
Grus virgo	grou-pequeno
Grus japonensis	grou-da-manchúria
Grus americana	grou-americano



Figura 73 - grou-eurasiático *Grus grus*

(Foto: José Frade – Portugal)

Grus grus	grou-eurasiático
Grus monacha	grou-de-capuz
Grus nigricollis	grou-de-pescoço-preto

Aramidae **Carão**

O carão faz lembrar uma íbis à primeira vista, mas é mais próximo dos grous. É uma ave aquática, cujo bico é especializado numa alimentação quase exclusivamente à base de caracóis. A variedade de nomes locais para esta espécie resulta da grande gama de vocalizações que produz, sendo o chamamento do macho particularmente intenso.

Espécies: 1

Distribuição: América Central, do Sul e Flórida



Figura 74 - carão *Aramus guarauna*

(Foto: José Frade – Equador)

Aramus guarauna carão

Podicipedidae Mergulhões

Os mergulhões estão perfeitamente adaptados à vida na água, tendo as patas posicionadas tão atrás no corpo, que têm dificuldade em caminhar em terra. Habitam zonas húmidas de água doce, mas no inverno podem frequentar águas costeiras. Alimentam-se de animais aquáticos, tanto peixes como invertebrados, mergulhando e capturando-os na coluna de água ou no leito. Muitas das espécies encontram-se ameaçadas e três extinguiram-se no final do século XX.

Espécies: 22

Distribuição: Cosmopolita, excepto Antárctida

Tachybaptus rufolavatus	mergulhão-do-alaotra
Tachybaptus ruficollis	mergulhão-pequeno
Tachybaptus novaehollandiae	mergulhão-da-oceânia
Tachybaptus pelzelnii	mergulhão-malgaxe
Tachybaptus dominicus	mergulhão-anão
Podilymbus podiceps	mergulhão-caçador
Podilymbus gigas	mergulhão-de-atitlan
Rollandia rolland	mergulhão-d'orelhas-brancas




Figura 75 - mergulhão-de-penachos *Podiceps auritus*

(Foto: José Frade – Finlândia)

Rollandia microptera	mergulhão-do-titicaca
Poliocephalus poliocephalus	mergulhão-grisalho
Poliocephalus rufopectus	mergulhão-maori
Podiceps major	mergulhão-grande
Podiceps grisegena	mergulhão-de-pescoço-ruivo
Podiceps cristatus	mergulhão-de-crista
Podiceps auritus	mergulhão-de-penachos
Podiceps nigricollis	mergulhão-de-pescoço-preto
Podiceps andinus	mergulhão-colombiano
Podiceps occipitalis	mergulhão-prateado
Podiceps taczanowskii	mergulhão-do-junín
Podiceps gallardoi	mergulhão-de-capuz
Aechmophorus occidentalis	mergulhão-americano-ocidental
Aechmophorus clarkii	mergulhão-de-clark



Figura 76 - mergulhão-de-clark *Aechmophorus clarkii*

(Foto: Lars Petersson – E.U.A.)

Phoenicopteridae Flamingos

Estas icónicas aves de grande dimensão e tonalidades rosadas conseguem habitar zonas aquáticas de alta salinidade, hostis para muitas outras espécies, onde formam grandes colónias. O seu bico especializado permite-lhes obter por filtração o plâncton e as algas que abundam nesse tipo de habitat. São os betacarotenos presentes nessas presas que contribuem para a pigmentação da sua plumagem.

Espécies: 6

Distribuição: Caraíbas, América do Sul, África, Médio Oriente e bacia mediterrânica



Figura 77 - flamingo-rosado *Phoenicopterus roseus*

(Foto: José Frade – Portugal)

Phoenicopterus roseus	flamingo-rosado
Phoenicopterus ruber	flamingo-vermelho
Phoenicopterus chilensis	flamingo-chileno
Phoeniconaias minor	flamingo-pequeno
Phoenicoparrus andinus	flamingo-andino-grande
Phoenicoparrus jamesi	flamingo-andino-pequeno

Turnicidae Toirões

Os toirões são pequenas aves terrestres que, pelo seu aspecto, podem fazer lembrar as codornizes, embora não sejam próximos destas, sendo na verdade aparentados às limícolas. São aves de hábitos terrestres, que raramente voam. Habitam em planícies cobertas de erva e nidificam no solo. Uma das espécies desta família terá ocorrido em Portugal até meados do século XX, mas não se conhecem registos recentes da sua ocorrência.

Espécies: 18

Distribuição: África, Ásia, Oceânia e, possivelmente, sul da Europa



Figura 78 - toirão-comum *Turnix sylvaticus*

(Foto: Luís Rodrigues – Quénia)

Turnix tanki	toirão-de-patas-amarelas
Turnix maculosus	toirão-de-dorso-vermelho
Turnix suscitator	toirão-barrado
Turnix ocellatus	toirão-ocelado
Turnix sylvaticus	toirão-comum
Turnix velox	toirão-pequeno
Turnix pyrrhothorax	toirão-de-peito-ruivo
Turnix worcesteri	toirão-de-lução

Turnix everetti	toirão-de-sumba
Turnix nanus	toirão-anão
Turnix hottentottus	toirão-do-cabo
Turnix castanotus	toirão-de-dorso-castanho
Turnix olivii	toirão-de-peito-creme
Turnix varius	toirão-colorido
Turnix novaecaledoniae	toirão-da-nova-caledónia
Turnix melanogaster	toirão-de-peito-preto
Turnix nigricollis	toirão-malgaxe
Ortyxelos meiffrenii	toirão-d'asa-branca

Burhinidae Alcaravões

Estas são aves de médio porte, com plumagem de tons crípticos, com o bico forte e grandes olhos amarelos. Vivem no solo e, embora sejam geralmente considerados limícolas, a maioria das espécies de alcaravões prefere locais relativamente áridos. Têm hábitos predominantemente nocturnos. O nome genérico *Burhinus* deriva do grego e significa 'nariz-de-boi'.

Espécies: 10

Distribuição: Quase cosmopolita, ocorrendo em diversos continentes em latitudes tropicais e temperadas



Figura 79 - alcaravão-senegalês *Burhinus senegalensis*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Hesperoburhinus bistriatus	alcaravão-americano
Hesperoburhinus superciliaris	alcaravão-peruano
Esacus recurvirostris	alcaravão-grande
Esacus magnirostris	alcaravão-das-praias
Burhinus capensis	alcaravão-do-cabo
Burhinus vermiculatus	alcaravão-d'água
Burhinus grallarius	alcaravão-rabilongo
Burhinus oedicnemus	alcaravão-comum
Burhinus indicus	alcaravão-indiano
Burhinus senegalensis	alcaravão-senegalês

Pluvianellidae Borrelho-de-magalhães

O borrelho-de-magalhães é um parente relativamente distante dos verdadeiros borrelhos (*Charadriidae*), partilhando o habitat aquático com estes, mas lembrando mais uma pequena rola com patas compridas. Habita zonas húmidas e costeiras da Patagónia, onde procura invertebrados em margens lodosas ou arenosas. Usa os pés para escavar na areia ou na vasa, ou para agitar o sedimento, liquefazendo-o e ganhando assim acesso a alimento.

Espécies: 1

Distribuição: extremo sul da América do Sul



Figura 80 - borrelho-de-magalhães *Pluvianellus socialis*

(Foto: Luís Custódia – Argentina)

Pluvianellus socialis borrelho-de-magalhães

Chionidae Bicos-de-bainha

A família *Chionidae* compreende apenas duas espécies: são os bicos-de-bainha, aves de médio porte aparentadas às limícolas e geneticamente mais próximas dos alcaravões. Têm uma plumagem branca incluindo uma camada de penugem. A sua alimentação é muito oportunista: consomem invertebrados, fezes e carniça, geralmente junto à linha de maré. Também capturam ovos e crias de pinguins e corvos-marinhos e alimentos regurgitados pelos adultos.

Espécies: 2

Distribuição: Península antárctica e ilhas subantárcticas



Figura 81 - bico-de-bainha-antárctico *Chionis albus*

(Foto: Tom Schultz - Antárctida)

Chionis albus	bico-de-bainha-antárctico
Chionis minor	bico-de-bainha-de-faces-pretas

Haematopodidae Ostraceiros

Os ostraceiros são aves limícolas de médio porte com um forte bico, especialmente adaptado para abrir as conchas de bivalves. Habitam em zonas costeiras de todo o mundo, embora o ostraceiro-eurasiático se possa encontrar também em água doce, longe da costa. Nalgumas espécies, a forma do bico é até certo ponto plástica e pode mudar em poucas semanas, em função da dieta.

Espécies: 12

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Haematopus leucopodus	ostraceiro-de-magalhães
Haematopus ater	ostraceiro-castanho
Haematopus bachmani	ostraceiro-preto-americano
Haematopus palliatus	ostraceiro-americano
Haematopus meadewaldoi	ostraceiro-das-canárias
Haematopus moquini	ostraceiro-preto-africano
Haematopus ostralegus	ostraceiro-eurasiático
Haematopus finschi	ostraceiro-de-finsch
Haematopus longirostris	ostraceiro-australiano
Haematopus unicolor	ostraceiro-variável
Haematopus chathamensis	ostraceiro-das-chatham
Haematopus fuliginosus	ostraceiro-preto-australiano



Figura 82 - ostraceiro-preto-australiano *Haematopus fuliginosus*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Ibidorhynchidae Bico-de-íbis

O bico-de-íbis é uma ave limícola relativamente grande, do tamanho de um maçarico-galego. Habita em zonas remotas e frequenta principalmente rios pedregosos em zonas montanhosas ou de planalto. Pode ser encontrado em locais situados a altitudes elevadas, por vezes superando os 4000 metros acima do nível do mar. Alimenta-se de invertebrados aquáticos, que procura por entre as pedras dos rios e também captura pequenos peixes.

Espécies: 1

Distribuição: Ásia central



Figura 83 - bico-de-íbis *Ibidorhyncha struthersii*

(Foto: Adam Riley / rockjumperbirding.com - Butão)

Ibidorhyncha struthersii bico-de-íbis

Encontram-se reunidas nesta família seis espécies de pernilongos e quatro espécies de alfaiates. Todas elas são limícolas de tamanho médio, com patas, bico e pescoço longos, tendo a maioria a plumagem preta e branca. Os alfaiates têm um bico recurvado, que usam para varrer os lodos, ao passo que os pernilongos têm o bico direito. Defendem os locais de nidificação de forma muito vigorosa, em geral vocalizando intensamente.

Espécies: 10

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida



Figura 84 - pernilongo-americano *Himantopus mexicanus*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Himantopus himantopus	pernilongo-comum
Himantopus leucocephalus	pernilongo-de-nuca-preta
Himantopus mexicanus	pernilongo-americano
Himantopus melanurus	pernilongo-de-dorso-branco
Himantopus novaezelandiae	pernilongo-preto
Cladorhynchus leucocephalus	pernilongo-de-peito-ruivo
Recurvirostra avosetta	alfaiate-comum




Figura 85 - alfaiate-comum *Recurvirostra avosetta*

(Foto: José Frade – Portugal)

Recurvirostra americana	alfaiate-americano
Recurvirostra novaehollandiae	alfaiate-australiano
Recurvirostra andina	alfaiate-andino

Estas aves podem ser encontradas em zonas abertas pelo mundo fora, desde a tundra árctica até savanas tropicais. Embora de aparência diversificada, a maioria partilha um bico curto e uma forma característica de alimentação - uma série de pequenas corridas interrompidas por paragens para capturar presas ao nível do solo. Alimentam-se principalmente de invertebrados, nomeadamente insectos, minhocas e pequenos crustáceos.

Espécies: 69

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Pluvialis squatarola	tarambola-cinzenta
Pluvialis apricaria	tarambola-dourada
Pluvialis fulva	tarambola-siberiana
Pluvialis dominica	tarambola-americana
Oreopholus ruficollis	borrelho-de-garganta-ruiva
Zonibyx modestus	borrelho-de-peito-ruivo
Phegornis mitchellii	borrelho-diademado



Figura 86 - abibe-ribeirinho *Vanellus duvaucelii*

(Foto: Shelley Rutkin – Índia)

Eudromias morinellus	borrelho-ruivo
Charadrius vociferus	borrelho-de-coleira-dupla
Charadrius hiaticula	borrelho-grande-de-coleira
Charadrius semipalmatus	borrelho-semipalmado
Charadrius melodus	borrelho-assobiadeiro
Thinornis cucullatus	borrelho-de-cabeça-preta
Thinornis forbesi	borrelho-de-forbes
Thinornis tricollaris	borrelho-de-três-golas
Thinornis melanops	borrelho-de-testa-preta
Thinornis novaeseelandiae	borrelho-das-chatham
Thinornis dubius	borrelho-pequeno-de-coleira
Thinornis placidus	borrelho-de-bico-comprido
Hoploxypterus cayanus	borrelho-alvinegro
Vanellus vanellus	abibe-eurasiático
Vanellus crassirostris	abibe-de-faces-brancas
Vanellus armatus	abibe-armado
Vanellus spinosus	abibe-esporado
Vanellus duvaucelii	abibe-ribeirinho
Vanellus malabaricus	abibe-malabar
Vanellus tectus	abibe-de-cabeça-preta
Vanellus albiceps	abibe-de-coroa-branca
Vanellus lugubris	abibe-lúgubre
Vanellus melanopterus	abibe-d'asa-preta
Vanellus coronatus	abibe-coroado
Vanellus senegallus	abibe-carunculado
Vanellus melanocephalus	abibe-etíope
Vanellus superciliosus	abibe-de-peito-castanho
Vanellus cinereus	abibe-de-cabeça-cinzenta
Vanellus indicus	abibe-do-índico
Vanellus macropterus	abibe-javanês
Vanellus tricolor	abibe-tricolor
Vanellus miles	abibe-mascarado
Vanellus gregarius	abibe-sociável
Vanellus leucurus	abibe-de-cauda-branca
Vanellus chilensis	abibe-sul-americano
Vanellus resplendens	abibe-andino
Erythrogonys cinctus	borrelho-cintado
Peltohyas australis	borrelho-do-campo
Anarhynchus asiaticus	borrelho-do-cáspio
Anarhynchus veredus	borrelho-oriental
Anarhynchus atrifrons	borrelho-tibetano
Anarhynchus mongolus	borrelho-mongol
Anarhynchus leschenaultii	borrelho-do-deserto
Anarhynchus bicinctus	borrelho-de-banda-dupla



Figura 87 - borrelho-de-coleira-interrompida *Anarhynchus alexandrinus*

(Foto: José Frade – Portugal)

Anarhynchus frontalis	borrelho-de-bico-torto
Anarhynchus obscurus	borrelho-maori-do-sul
Anarhynchus wilsonia	borrelho-de-bico-grosso
Anarhynchus collaris	borrelho-de-coleira-americano
Anarhynchus montanus	borrelho-montês
Anarhynchus alticola	borrelho-da-puna
Anarhynchus falklandicus	borrelho-de-crescente-preto
Anarhynchus thoracicus	borrelho-malgaxe
Anarhynchus pecuarius	borrelho-de-kittlitz
Anarhynchus sanctaehelenae	borrelho-de-santa-helena
Anarhynchus ruficapillus	borrelho-de-capuz-vermelho
Anarhynchus nivosus	borrelho-nevoso
Anarhynchus pallidus	borrelho-de-colar-ruivo
Anarhynchus peronii	borrelho-malaio
Anarhynchus marginatus	borrelho-de-testa-branca
Anarhynchus javanicus	borrelho-javanês
Anarhynchus alexandrinus	borrelho-de-coleira-interrompida
Anarhynchus dealbatus	borrelho-de-faces-brancas

Pluvianidae **Ave-do-crocodilo**

Esta pequena limícola, de aspecto inconfundível, vive ao longo de grandes rios na África subsariana. Alimenta-se sobretudo de insectos. O nome vernáculo 'ave-do-crocodilo' baseia-se numa suposta relação simbiótica, descrita pelo historiador grego Heródoto, na qual uma ave denominada 'trochilus' limpava os dentes dos crocodilos. Embora o mito persista até hoje, nunca foram obtidas provas fotográficas desse comportamento.

Espécies: 1

Distribuição: África subsariana



Figura 88 - ave-do-crocodilo *Pluvianus aegyptius*

(Foto: Lars Petersson – Camarões)

Pluvianus aegyptius ave-do-crocodilo

Rostratulidae Narcejas-pintadas

Com as suas patas curtas e o bico longo, as narcejas-pintadas assemelham-se às narcejas verdadeiras. Distinguem-se pela sua plumagem mais escura, pelos seus grandes olhos e pelo facto de existir dimorfismo sexual ao nível da plumagem, sendo que os machos são os que apresentam as cores mais apagadas. Estas aves frequentam pauis com vegetação densa e podem ter hábitos crepusculares ou nocturnos.

Espécies: 3

Distribuição: América do Sul, África subsariana, sul da Ásia e Austrália



Figura 89 - narceja-pintada-grande *Rostratula benghalensis*

(Foto: Dallu Barry – Gâmbia)

Rostratula benghalensis	narceja-pintada-grande
Rostratula australis	narceja-pintada-australiana
Nycticryphes semicollaris	narceja-pintada-americana

Jacanidae Jaçanãs

As jaçanãs saltam à vista pelas suas patas, pés e unhas extremamente compridos, adaptados para caminhar na frágil vegetação flutuante de rios e lagoas. Estas aves alimentam-se de insectos, crustáceos e moluscos e, em certos casos, sementes de vegetação aquática. Na maioria das espécies, é o macho que é responsável pelos cuidados parentais.

Espécies: 8

Distribuição: pantropical

Hydrophasianus chirurgus	jaçanã-rabo-de-faisão
Jacana spinosa	jaçanã-centro-americana
Jacana jacana	jaçanã-sul-americana
Microparra capensis	jaçanã-pequena
Irediparra gallinacea	jaçanã-de-crista
Metopidius indicus	jaçanã-bronzeada
Actophilornis africanus	jaçanã-africana
Actophilornis albinucha	jaçanã-malgaxe



Figura 90 - jaçanã-centro-americana *Jacana spinosa*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

O errante-das-planícies, como o nome indica, ocupa planícies cobertas de vegetação herbácea nativa no interior australiano. É uma pequena ave omnívora, que voa apenas relutantemente e prefere caminhar com uma postura erecta. Tem hábitos crepusculares. Esta espécie encontra-se criticamente ameaçada, devido à conversão da vegetação nativa para cultivo ou pasto para gado.

Espécies: 1

Distribuição: interior australiano



Figura 91 - errante-das-planícies *Pedionomus torquatus*

(Foto: Alan Stringer – Austrália)

Pedionomus torquatus errante-das-planícies

Thinocoridae Agachadeiras

As agachadeiras são aves de pequena a média dimensão, com um aspecto e hábitos que lembram lagópodes ou cotovias, espécies que estão ausentes da América do Sul. São predominantemente herbívoras ou granívoras e ocorrem em zonas abertas com vegetação muito rasteira, desde os cumes dos Andes até às estepes da Patagónia. Quando levantam voo, as suas longas asas e o seu voo ágil traem o seu parentesco próximo das limícolas.

Espécies: 4

Distribuição: regiões frias da América do Sul (Andes e extremo sul do continente)



Figura 92 - agachadeira-de-barriga-ruiva *Attagis gayi*

(Foto: Luis Panamá Perugachi - Equador)

Attagis gayi	agachadeira-de-barriga-ruiva
Attagis malouinus	agachadeira-de-barriga-branca
Thinocorus orbignyianus	agachadeira-de-peito-cinzento
Thinocorus rumicivorus	agachadeira-pequena

Scolopacidae — Maçaricos, Pilritos e afins

Estas aves limícolas têm bicos de variadíssimas formas e comprimentos, adaptados a diferentes estratégias de capturar invertebrados em substratos arenosos ou lodosos. Muitas espécies são migratórias, nidificando em tundras e prados húmidos do hemisfério norte, quando os insectos são mais abundantes. O mais longo voo sem paragens conhecido numa ave terrestre é feito pela população invernante neozelandesa de fuselos, atravessando o Oceano Pacífico para nidificar no Alasca.

Espécies: 98

Distribuição: Cosmopolita, excepto Antárctida

Bartramia longicauda	maçarico-do-campo
Numenius tahitiensis	maçarico-de-coxas-arrepiadas
Numenius phaeopus	maçarico-galego-eurasiático
Numenius hudsonicus	maçarico-galego-americano
Numenius minutus	maçarico-pequeno
Numenius borealis	maçarico-esquimó
Numenius americanus	maçarico-bicudo
Numenius madagascariensis	maçarico-siberiano
Numenius tenuirostris	maçarico-de-bico-fino
Numenius arquata	maçarico-real
Limosa lapponica	fuselo
Limosa limosa	maçarico-de-bico-direito
Limosa haemastica	maçarico-café
Limosa fedoa	maçarico-marmoreado
Limnodromus semipalmatus	maçarico-das-estepes
Limnodromus scolopaceus	maçarico-de-bico-comprido
Limnodromus griseus	maçarico-de-bico-curto
Lymnocryptes minimus	narceja-galega
Scolopax minor	galinhola-americana
Scolopax rusticola	galinhola-eurasiática
Scolopax mira	galinhola-japonesa
Scolopax bukidnonensis	galinhola-filipina
Scolopax saturata	galinhola-javanesa
Scolopax rosenbergii	galinhola-da-papua
Scolopax celebensis	galinhola-de-celebes
Scolopax rochussenii	galinhola-das-molucas
Coenocorypha barrierensis	narceja-maori-do-norte
Coenocorypha iredalei	narceja-maori-do-sul
Coenocorypha pusilla	narceja-das-chatham
Coenocorypha huegeli	narceja-das-snares
Coenocorypha aucklandica	narceja-das-auckland



Figura 93 - pilrito-acuminado *Calidris acuminata*

(Fotos: Alan Stringer - Austrália)

Gallinago imperialis	narceja-imperial
Gallinago jamesoni	narceja-andina
Gallinago stricklandii	narceja-patagónica
Gallinago solitaria	narceja-solitária
Gallinago nemoricola	narceja-do-bosque
Gallinago media	narceja-real
Gallinago megala	narceja-de-swinhoe
Gallinago stenura	narceja-siberiana
Gallinago hardwickii	narceja-japonesa
Gallinago nigripennis	narceja-africana
Gallinago gallinago	narceja-comum
Gallinago delicata	narceja-de-wilson
Gallinago undulata	narceja-gigante
Gallinago nobilis	narceja-nobre
Gallinago andina	narceja-da-puna
Gallinago macrodactyla	narceja-malgaxe
Gallinago paraguaiae	narceja-sul-americana
Gallinago magellanica	narceja-de-magalhães
Phalaropus tricolor	falaropo-tricolor
Phalaropus fulicarius	falaropo-de-bico-grosso
Phalaropus lobatus	falaropo-de-bico-fino
Xenus cinereus	maçarico-sovela
Actitis hypoleucos	maçarico-das-rochas
Actitis macularius	maçarico-maculado

Tringa ochropus	maçarico-bique-bique
Tringa solitaria	maçarico-solitário
Tringa brevipes	maçarico-de-cauda-cinzenta
Tringa incana	maçarico-itinerante
Tringa stagnatilis	perna-verde-fino
Tringa glareola	maçarico-de-dorso-malhado
Tringa totanus	perna-vermelha-comum
Tringa flavipes	perna-amarela-pequeno
Tringa guttifer	perna-verde-mosqueado
Tringa semipalmata	maçarico-d'asa-branca
Tringa erythropus	perna-vermelha-escuro
Tringa nebularia	perna-verde-comum
Tringa melanoleuca	perna-amarela-grande
Prosobonia cancellata	maçarico-de-kiritimati
Prosobonia leucoptera	maçarico-do-taiti




Figura 94 - narceja-comum *Gallinago gallinago*

(Foto: Pedro Nicolau - Portugal)

Prosobonia ellisi	maçarico-de-moorea
Prosobonia parvirostris	maçarico-das-tuamotu
Arenaria interpres	rola-do-mar-comum
Arenaria melanocephala	rola-do-mar-fusca
Calidris tenuirostris	seixoeira-grande
Calidris canutus	seixoeira-comum

Calidris virgata	pilrito-surfista
Calidris pugnax	combatente
Calidris falcinellus	pilrito-de-bico-grosso
Calidris acuminata	pilrito-acuminado
Calidris himantopus	pilrito-pernilongo
Calidris ferruginea	pilrito-de-bico-comprido
Calidris temminckii	pilrito-de-temminck
Calidris subminuta	pilrito-de-dedos-compridos
Calidris ruficollis	pilrito-de-pescoço-ruivo
Calidris pygmaea	pilrito-colhereiro
Calidris subruficollis	pilrito-canela
Calidris alba	pilrito-das-praias
Calidris alpina	pilrito-comum
Calidris maritima	pilrito-escuro
Calidris ptilocnemis	pilrito-das-rochas
Calidris bairdii	pilrito-de-bico-fino
Calidris minuta	pilrito-pequeno
Calidris minutilla	pilrito-anão
Calidris fuscicollis	pilrito-d'uropígio-branco
Calidris melanotos	pilrito-de-colete
Calidris mauri	pilrito-ocidental
Calidris pusilla	pilrito-semipalmado



Figura 95 - perna-vermelha-escuro *Tringa erythropus*

(Foto – José Frade – Portugal)

Dromadidae **Caranguejeiro**

O caranguejeiro é uma ave limícola que se distingue pela sua plumagem preta e branca e, particularmente, pelo seu bico robusto, que faz lembrar o de uma andorinha-do-mar. Como o seu nome indica, alimenta-se principalmente de caranguejos. Ao contrário do que é habitual em limícolas, o caranguejeiro nidifica em cavidades escavadas em bancos de areia; as crias não são nidífugas, permanecendo no ninho alguns dias após a eclosão até conseguirem voar.

Espécies: 1

Distribuição: Zonas costeiras do oceano Índico



Figura 96 - caranguejeiro *Dromas ardeola*

(Foto: Francis Argyle – Madagáscar)

Dromas ardeola caranguejeiro

Glareolidae Corredores e Perdizes-do-mar

Esta família compreende dois grupos de aves bem distintas: as perdizes-do-mar e os corredores. As primeiras têm patas curtas, um bico muito curto e asas muito longas; quando voam, podem fazer lembrar andorinhas gigantes – alimentam-se de insectos, que capturam sobretudo em voo. Os segundos vivem principalmente em zonas áridas ou desérticas, têm hábitos crepusculares ou nocturnos e caracterizam-se por um comportamento discreto.

Espécies: 17

Distribuição: Velho Mundo, incluindo Europa, África, Madagáscar, Ásia e Austrália

Smutsornis africanus	corredor-de-duas-golas
Rhinoptilus chalcopterus	corredor-asa-de-bronze
Rhinoptilus cinctus	corredor-de-três-golas
Rhinoptilus bitorquatus	corredor-do-godavari
Cursorius coromandelicus	corredor-indiano
Cursorius temminckii	corredor-de-temminck
Cursorius rufus	corredor-de-burchell



Figura 97 - corredor-indiano *Cursorius coromandelicus*

(Foto: Paul Bourdin – Índia)

Cursorius cursor	corredor-sariano
Cursorius somalensis	corredor-somali
Glareola isabella	perdiz-do-mar-australiana
Glareola nuchalis	perdiz-do-mar-escura
Glareola cinerea	perdiz-do-mar-cinzenta
Glareola lactea	perdiz-do-mar-pequena
Glareola maldivarum	perdiz-do-mar-oriental
Glareola nordmanni	perdiz-do-mar-d'asa-preta
Glareola pratincola	perdiz-do-mar-ocidental
Glareola ocularis	perdiz-do-mar-malgaxe



Figura 98 - perdiz-do-mar-escura *Glareola nuchalis*

(Foto: Lars Petersson – Angola)

Aqui se incluem as bem conhecidas gaivotas, aves de média dimensão, mas também os mais pequenos garajaus, andorinhas-do-mar e talha-mares. Nidificam em grandes colónias e são principalmente piscívoras, mas muitas gaivotas têm uma alimentação mais oportunista. Podem ser encontrados no mar alto, em águas costeiras e em zonas húmidas de água doce, sendo que algumas espécies habitam até em montanhas ou estepes longe da costa, desde que exista alguma água nas proximidades.

Espécies: 106

Distribuição: Cosmopolita

Rynchops flavirostris	talha-mar-africano
Rynchops albicollis	talha-mar-asiático
Rynchops niger	talha-mar-americano
Gygis alba	gaivina-branca
Gygis candida	gaivina-de-bico-azul
Gygis microrhyncha	gaivina-de-bico-pequeno
Anous stolidus	nodi-castanho
Anous tenuirostris	nodi-pequeno
Anous minutus	nodi-preto
Anous albivitta	nodi-cinzento
Anous ceruleus	nodi-azul



Figura 99 - talha-mar-americano *Rynchops niger*

(Foto: Alan Stringer - Peru)

Onychoprion aleuticus	gaivina-das-aleutas
Onychoprion fuscatus	gaivina-de-dorso-preto
Onychoprion anaethetus	gaivina-de-dorso-castanho
Onychoprion lunatus	gaivina-de-dorso-cinzento
Sternula albifrons	chilreta-comum
Sternula saundersi	chilreta-de-saunders
Sternula antillarum	chilreta-americana
Sternula superciliaris	chilreta-amazónica
Sternula lorata	chilreta-peruana
Sternula nereis	chilreta-australiana
Sternula balaenarum	chilreta-da-damaralândia
Phaetusa simplex	gaivina-de-bico-grande
Gelochelidon nilotica	tagaz
Gelochelidon macrotarsa	tagaz-australiano
Hydroprogne caspia	garajau-grande
Larosterna inca	gaivina-inca
Chlidonias hybrida	gaivina-dos-pauis
Chlidonias albostriatus	gaivina-maori
Chlidonias niger	gaivina-preta
Chlidonias leucopterus	gaivina-d'asa-branca
Sterna aurantia	andorinha-do-mar-ribeirinha
Sterna forsteri	andorinha-do-mar-de-forster
Sterna trudeaui	andorinha-do-mar-de-coroa-branca
Sterna paradisaea	andorinha-do-mar-árctica
Sterna hirundinacea	andorinha-do-mar-sul-americana
Sterna vittata	andorinha-do-mar-antárctica
Sterna virgata	andorinha-do-mar-das-kerguelen
Sterna hirundo	andorinha-do-mar-comum
Sterna repressa	andorinha-do-mar-arábica
Sterna sumatrana	andorinha-do-mar-de-samatra
Sterna dougallii	andorinha-do-mar-rósea
Sterna striata	andorinha-do-mar-maori
Sterna acuticauda	andorinha-do-mar-de-barriga-preta
Thalasseus sandvicensis	garajau-comum
Thalasseus acuflavidus	garajau-de-cabot
Thalasseus elegans	garajau-elegante
Thalasseus bengalensis	garajau-bengalense
Thalasseus albididorsalis	garajau-real-africano
Thalasseus maximus	garajau-real-americano
Thalasseus bergii	garajau-de-bico-amarelo
Thalasseus bernsteini	garajau-chinês
Creagrus furcatus	gaivota-rabo-de-andorinha
Hydrocoloeus minutus	gaivota-pequena
Rhodostethia rosea	gaivota-rosada
Rissa tridactyla	gaivota-tridáctila



Figura 100 - gaivota-de-audouin *Ichthyaetus audouinii*

(Foto: Gonçalo Elias – Portugal)

Rissa brevirostris	gaivota-de-patas-vermelhas
Pagophila eburnea	gaivota-marfim
Xema sabini	gaivota-de-sabine
Saundersilarus saundersi	gaivota-de-saunders
Chroicocephalus genei	gaivota-de-bico-fino
Chroicocephalus philadelphia	guincho-americano
Chroicocephalus novaehollandiae	gaivota-australiana
Chroicocephalus bulleri	gaivota-maori
Chroicocephalus serranus	guincho-andino
Chroicocephalus maculipennis	guincho-de-cabeça-castanha
Chroicocephalus ridibundus	guincho-comum
Chroicocephalus brunnicephalus	guincho-do-tibete
Chroicocephalus cirrocephalus	gaivota-de-cabeça-cinzenta
Chroicocephalus hartlaubii	gaivota-de-hartlaub
Leucophaeus modestus	gaivota-cinzenta
Leucophaeus scoresbii	gaivota-patagónica
Leucophaeus atricilla	gaivota-risonha
Leucophaeus pipixcan	gaivota-das-pradarias
Leucophaeus fuliginosus	gaivota-das-galápagos
Ichthyaetus ichthyaetus	gaivotão-de-cabeça-preta
Ichthyaetus relictus	gaivota-relíquia
Ichthyaetus audouinii	gaivota-de-audouin



Figura 101 - garajau-de-bico-amarelo *Thalasseus bergii*

(Foto: Alan Stringer – Austrália)

Ichthyaetus melanocephalus	gaivota-de-cabeça-preta
Ichthyaetus hemprichii	gaivota-fuliginosa
Ichthyaetus leucophthalmus	gaivota-d'olho-branco
Larus pacificus	gaivotão-australiano
Larus belcheri	gaivota-caranguejeira-do-pacífico
Larus crassirostris	gaivota-japonesa
Larus atlanticus	gaivota-caranguejeira-do-atlântico
Larus heermanni	gaivota-mexicana
Larus canus	gaivota-parda
Larus brachyrhynchus	gaivota-de-bico-curto
Larus delawarensis	gaivota-de-bico-riscado
Larus livens	gaivota-de-cortez
Larus occidentalis	gaivota-ocidental
Larus cachinnans	gaivota-do-cáspio
Larus dominicanus	gaivota-dominicana
Larus argentatus	gaivota-prateada-europeia
Larus vegae	gaivota-siberiana
Larus mongolicus	gaivota-mongol

Larus michahellis	gaivota-de-patas-amarelas
Larus armenicus	gaivota-arménia
Larus marinus	gaivotão-real
Larus hyperboreus	gaivota-hiperbórea
Larus fuscus	gaivota-d'asa-escura
Larus californicus	gaivota-da-califórnia
Larus smithsonianus	gaivota-prateada-americana
Larus glaucescens	gaivota-de-bering
Larus schistisagus	gaivota-de-kamchatka
Larus glaucoides	gaivota-polar



Figura 102 - nodi-castanho *Anous stolidus*

(Foto: Alan Stringer – Austrália)

Stercorariidae Moleiros

Os moleiros são aves marinhas de tamanho médio, com uma plumagem sobretudo castanha. Têm uma alimentação variada e oportunista, em parte baseada no cleptoparasitismo: perseguem outras aves marinhas, para lhes roubarem o alimento. O nome genérico *Stercorarius* vem do latim *stercus*, que significa esterco – este nome surge porque no passado se pensava que os moleiros se alimentavam dos excrementos de outras aves.

Espécies: 7

Distribuição: Tundra e ilhas oceânicas de ambos os hemisférios; invernam em ambientes pelágicos, incluindo nos trópicos

Stercorarius longicaudus	moleiro-rabilongo
Stercorarius parasiticus	moleiro-parasítico
Stercorarius pomarinus	moleiro-pomarino
Stercorarius skua	moleiro-grande
Stercorarius chilensis	moleiro-chileno
Stercorarius antarcticus	moleiro-subantárctico
Stercorarius maccormicki	moleiro-antárctico



Figura 103 - moleiro-parasítico *Stercorarius parasiticus*

(Foto: José Frade – Noruega)

Alcidae — Airos, Tordas e afins

A família dos alcídeos reúne diversas espécies de hábitos exclusivamente marinhos, incluindo airos, tordas e papagaios-do-mar. Têm patas curtas com membranas interdigitais e uma cauda curta. Além de conseguirem voar, são excelentes mergulhadores e nadadores, mas bastante desajeitados em terra. Devido à sua postura vertical e à plumagem onde predominam o preto e o branco, podem fazer lembrar pinguins, mas não são aparentados a estas aves.

Espécies: 25

Distribuição: Oceanos e zonas costeiras do hemisfério norte



Figura 104 - airo-comum *Uria aalge*

(Foto: José Frade – Noruega)

Cerorhinca monocerata	mérgulo-cornudo
Fratercula cirrhata	papagaio-do-mar-de-penachos
Fratercula arctica	papagaio-do-mar-do-atlântico
Fratercula corniculata	papagaio-do-mar-cornudo
Ptychoramphus aleuticus	mérgulo-sombrio
Aethia pusilla	mérgulo-anão
Aethia pygmaea	mérgulo-de-bigodes
Aethia cristatella	mérgulo-de-penachos
Aethia psittacula	mérgulo-papagaio

Brachyramphus perdix	mérgulo-de-bico-longo
Brachyramphus brevirostris	mérgulo-de-bico-curto
Brachyramphus marmoratus	mérgulo-marmoreado
Cepphus grylle	airo-d'asa-branca
Cepphus carbo	airo-d'óculos
Cepphus columba	airo-columbino
Alca torda	torda-mergulheira
Pinguinus impennis	torda-gigante
Alle alle	torda-anã
Uria lomvia	airo-de-freio
Uria aalge	airo-comum
Synthliboramphus antiquus	mérgulo-ancião
Synthliboramphus wumizusume	mérgulo-japonês
Synthliboramphus scrippsi	mérgulo-da-califórnia
Synthliboramphus hypoleucus	mérgulo-de-guadalupe
Synthliboramphus craveri	mérgulo-d'asa-escura



Figura 105 - mérgulo-de-penachos *Aethia cristatella*

(Foto: Lars Petersson – E.U.A.)

Rhynochetidae Kagu

O kagu é uma ave terrestre sem capacidade de voo, endémica da Nova Caledónia, uma ilha no oceano Pacífico. De cor prateada e com uma exuberante crista, percorre as florestas e matos autóctones da ilha procurando invertebrados no solo e manta morta. Quando alarmado, abre as asas e a cauda numa postura que lembra o seu único parente não-extinto, a garça-sol da América do Sul (família seguinte).

Espécies: 1

Distribuição: Nova Caledónia



Figura 106 - kagu *Rhynochetos jubatus*

(Foto: Lara Groß – Nova Caledónia [França])

Rhynochetos jubatus kagu

Eurypygidae **Garça-sol**

Embora não seja uma garça, esta ave faz certamente lembrar uma, devido ao seu longo pescoço e ao bico longo e pontiagudo, que utiliza para capturar presas animais (tanto vertebrados como invertebrados) nas margens de rios e lagos. Nidifica em árvores e, quando alarmada, adopta uma postura destinada a assustar predadores, abrindo as asas e a cauda e mostrando um padrão colorido que faz lembrar dois grandes olhos.

Espécies: 1

Distribuição: América Central e metade norte da América do Sul



Figura 107 - garça-sol *Eurypyga helias*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Eurypyga helias garça-sol

Phaethontidae Rabos-de-palha

Estas são aves elegantes, com plumagem branca e cauda muito longa, que habitam nos mares tropicais. Nidificam em ilhas isoladas, muitas vezes em locais inacessíveis, e passam a maior parte do seu tempo a viajar pelo oceano, em busca dos peixes-voadores e das lulas, de que se alimentam. Capturam as suas presas com um mergulho. O nome genérico *Phaethon* provém do grego e significa 'sol'.

Espécies: 3

Distribuição: Ilhas oceânicas em latitudes tropicais



Figura 108 - rabo-de-palha-de-bico-vermelho *Phaethon aethereus*

(Foto: José Frade – Equador)

Phaethon aethereus	rabo-de-palha-de-bico-vermelho
Phaethon rubricauda	rabo-de-palha-de-cauda-vermelha
Phaethon lepturus	rabo-de-palha-de-bico-laranja

Gaviidae Mobelhas

Estas são aves aquáticas mergulhadoras, com um tamanho intermédio entre um pato e um ganso. São excelentes nadadoras e alimentam-se sobretudo de peixe. As suas patas, dotadas de membranas interdigitais, ajudam-nas a progredir bem na água; contudo, por estarem situadas na parte traseira do corpo, dificultam os seus movimentos em terra. As mobelhas nidificam em lagos de água doce, em latitudes elevadas, e invernam em zonas costeiras.

Espécies: 5

Distribuição: Holárctico



Figura 109 - mobelha-pequena *Gavia stellata*

(Foto: Pedro Nicolau – Noruega)

Gavia stellata	mobelha-pequena
Gavia arctica	mobelha-árctica
Gavia pacifica	mobelha-do-pacífico
Gavia immer	mobelha-grande
Gavia adamsii	mobelha-de-bico-amarelo

Spheniscidae Pinguins

Os pinguins são emblemáticos dos mares frios e altamente produtivos do hemisfério sul, chegando até a cruzar o equador nas Ilhas Galápagos. São incapazes de voar, mas as suas asas funcionam como barbatanas, tornando-os excelentes nadadores e mergulhadores, que perseguem peixes, lulas e crustáceos a alta velocidade. As suas penas são curtas e densas, formando uma camada isolante e à prova de água. Nidificam colonialmente e são monógamos.

Espécies: 19

Distribuição: Antárctida e oceano circundante, América do Sul, África austral, Austrália e Nova Zelândia

Aptenodytes patagonicus	pinguim-rei
Aptenodytes forsteri	pinguim-imperador
Pygoscelis adeliae	pinguim-de-adélia
Pygoscelis antarcticus	pinguim-de-barbicha
Pygoscelis papua	pinguim-gentoo
Eudyptula minor	pinguim-pequeno
Spheniscus mendiculus	pinguim-das-galápagos
Spheniscus humboldti	pinguim-de-humboldt



Figura 110 – pinguim-gentoo *Pygoscelis papua*

(Foto: Tom Schultz - Antárctida)

Spheniscus magellanicus	pinguim-de-magalhães
Spheniscus demersus	pinguim-do-cabo
Megadyptes antipodes	pinguim-d'olho-amarelo
Eudyptes chrysolophus	pinguim-macaroni
Eudyptes schlegeli	pinguim-real
Eudyptes moseleyi	pinguim-saltador-setentrional
Eudyptes filholi	pinguim-saltador-oriental
Eudyptes chrysocome	pinguim-saltador-ocidental
Eudyptes pachyrhynchus	pinguim-de-fiordland
Eudyptes robustus	pinguim-das-snares
Eudyptes sclateri	pinguim-de-crista-erecta



Figura 111 - pinguim-de-barbicha *Pygoscelis antarcticus*

(Foto: Tom Schultz - Antárctida)

Oceanitidae — Painhos do sul

Os painhos do sul são aves marinhas de muito pequena dimensão, medindo apenas 15 a 26 cm de comprimento. Alimentam-se no mar, patinhando com os pés na superfície da água e muitas vezes seguem os barcos ou os cetáceos. Nidificam colonialmente em ilhas e na Antárctida. Tal como sucede com outras aves marinhas, várias espécies encontram-se ameaçadas devido à introdução de predadores terrestres nos seus locais de reprodução.

Espécies: 10

Distribuição: Oceanos, sobretudo no hemisfério sul



Figura 112 - painho-casquilho *Oceanites oceanicus*

(Foto: José Frade – Portugal)

Oceanites oceanicus	painho-casquilho
Oceanites gracilis	painho-de-elliot
Oceanites pincoyae	painho-pincoya
Garrodia nereis	painho-de-dorso-cinzento
Pelagodroma marina	calca-mar
Fregetta grallaria	painho-de-barriga-branca
Fregetta tropica	painho-de-barriga-preta
Fregetta lineata	painho-da-nova-caledónia
Fregetta maoriana	painho-maori

Nesofregetta fuliginosa	painho-de-garganta-branca

Diomedeidae Albatrozes

Os albatrozes são aves oceânicas de grande dimensão, cujas longas e estreitas asas podem ultrapassar 3 metros de envergadura. Estas permitem-lhes usar voo planado, propulsionado por fortes ventos, para percorrer milhares de quilómetros em busca de peixe, lulas e crustáceos. Nidificam colonialmente em ilhas oceânicas isoladas, onde a cria única de cada casal demora quase um ano a desenvolver-se. Esta reduzida taxa de reprodução contribui para o estatuto de conservação desfavorável em que todas as espécies se encontram.

Espécies: 21

Distribuição: todos os oceanos do hemisfério sul e ainda o Pacífico Norte

Diomedea sanfordi	albatroz-real-do-norte
Diomedea epomophora	albatroz-real-do-sul
Diomedea exulans	albatroz-errante
Diomedea dabbenena	albatroz-de-tristão-da-cunha
Diomedea antipodensis	albatroz-das-antípodas
Diomedea amsterdamensis	albatroz-de-amesterdão



Figura 113 - albatroz-errante *Diomedea exulans*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Phoebastria irrorata	albatroz-das-galápagos
Phoebastria immutabilis	albatroz-de-laysan
Phoebastria nigripes	albatroz-de-patas-pretas
Phoebastria albatrus	albatroz-de-rabo-curto
Phoebetria fusca	albatroz-preto
Phoebetria palpebrata	albatroz-de-manto-claro
Thalassarche chlororhynchos	albatroz-de-nariz-amarelo
Thalassarche carteri	albatroz-de-carter
Thalassarche chrysostoma	albatroz-de-cabeça-cinzenta
Thalassarche bulleri	albatroz-de-buller
Thalassarche cauta	albatroz-arisco
Thalassarche salvini	albatroz-de-salvin
Thalassarche eremita	albatroz-das-chatham
Thalassarche melanophris	albatroz-de-sobrancelha
Thalassarche impavida	albatroz-de-campbell



Figura 114 - albatroz-das-antípodas *Diomedea antipodensis*

(Foto: Alan Stringer – Austrália)

Hydrobatidae Painhos do norte

Tal como os seus 'primos' austrais, os painhos do norte são pequenas aves pelágicas, com comprimentos que vão de 13 a 25 cm. Têm contudo asas mais longas e patas mais curtas que aqueles. Alimentam-se no mar alto e nidificam principalmente em ilhas, tendo hábitos nocturnos em terra para evitar a predação por gaivotas e fragatas. A predação e a destruição de habitat causadas pela introdução de mamíferos é um factor que ameaça várias espécies.

Espécies: 18

Distribuição: Oceanos, principalmente no hemisfério norte



Figura 115 - alma-de-mestre *Hydrobates pelagicus*

(Foto: José Frade – Portugal)

Hydrobates pelagicus	alma-de-mestre
Hydrobates furcatus	painho-cauda-d'andorinha
Hydrobates hornbyi	painho-de-colar
Hydrobates monorhis	painho-de-swinhoe
Hydrobates matsudairae	painho-de-matsudaira
Hydrobates leucorhous	painho-de-cauda-forcada
Hydrobates socorroensis	painho-de-socorro
Hydrobates cheimomnestes	painho-de-ainley
Hydrobates homochroa	painho-cinzento
Hydrobates castro	painho-da-madeira

Hydrobates monteiroi	painho-de-monteiro
Hydrobates jabejabe	painho-de-cabo-verde
Hydrobates tethys	painho-das-galápagos
Hydrobates melania	painho-preto
Hydrobates macrodactylus	painho-de-guadalupe
Hydrobates markhami	painho-escuro
Hydrobates tristrami	painho-de-tristram
Hydrobates microsoma	painho-pequeno



Figura 116 painho-da-madeira *Hydrobates castro*

(Foto: Pedro Nicolau – Madeira [Portugal])

Procellariidae Pardelas e afins

Os membros desta grande família de aves marinhas têm hábitos pelágicos, percorrendo longas distâncias pelo mar em busca de alimento ou em migração. Possuem um apurado olfacto, que lhes permite detectar concentrações de peixe e plâncton na vastidão marítima. Nidificam colonialmente em ilhas isoladas e desprovidas de predadores naturais. A introdução de mamíferos nessas ilhas e as capturas acidentais na pesca levam a que perto de metade das espécies tenham um estatuto de conservação desfavorável.

Espécies: 100

Distribuição: mares e oceanos de todo o mundo

Macronectes giganteus	pardelão-meridional
Macronectes halli	pardelão-setentrional
Fulmarus glacialis	fulmar-boreal
Fulmarus glacialoides	fulmar-austral



Figura 117 - fulmar-austral *Fulmarus glacialoides*

(Foto: Tom Schultz - Passagem de Drake / Antárctida)

Thalassoica antarctica	pardela-antárctica
Daption capense	pardela-do-cabo
Pagodroma nivea	pardela-das-neves
Halobaena caerulea	pardela-azul

Pachyptila vittata	faigão-de-bico-largo
Pachyptila salvini	faigão-de-salvin
Pachyptila macgillivrayi	faigão-de-macgillivray
Pachyptila desolata	faigão-antárctico
Pachyptila belcheri	faigão-de-bico-fino
Pachyptila turtur	faigão-de-bico-curto
Pachyptila crassirostris	faigão-de-bico-grosso
Aphrodroma brevirostris	freira-de-bico-curto
Pterodroma macroptera	freira-d'asa-grande
Pterodroma lessonii	freira-de-cabeça-branca
Pterodroma gouldi	freira-de-faces-cinzentas
Pterodroma incerta	freira-de-schlegel
Pterodroma solandri	freira-de-solander
Pterodroma magentae	freira-de-magenta
Pterodroma ultima	freira-de-murphy
Pterodroma mollis	freira-suave
Pterodroma madeira	freira-da-madeira
Pterodroma feae	freira-de-cabo-verde
Pterodroma deserta	freira-das-desertas
Pterodroma cahow	freira-das-bermudas
Pterodroma hasitata	freira-das-antilhas
Pterodroma caribbaea	freira-jamaicana
Pterodroma externa	freira-das-joão-fernandes
Pterodroma occulta	freira-de-vanuatu
Pterodroma neglecta	freira-das-kermadec
Pterodroma heraldica	freira-de-herald
Pterodroma arminjoniana	freira-da-trindade
Pterodroma atrata	freira-de-henderson
Pterodroma alba	freira-das-fénix
Pterodroma baraui	freira-de-barau
Pterodroma sandwichensis	freira-havaiana
Pterodroma phaeopygia	freira-das-galápagos
Pterodroma inexpectata	freira-malhada
Pterodroma cervicalis	freira-de-pescoço-branco
Pterodroma nigripennis	freira-d'asa-preta
Pterodroma axillaris	freira-das-chatham
Pterodroma hypoleuca	freira-das-bonin
Pterodroma leucoptera	freira-de-garganta-branca
Pterodroma brevipes	freira-de-colar
Pterodroma cookii	freira-de-cook
Pterodroma defilippiana	freira-chilena
Pterodroma longirostris	freira-de-stejneger
Pterodroma pycrofti	freira-de-pycroft
Pterodroma rupinarum	freira-de-santa-helena
Pseudobulweria aterrima	freira-da-reunião

Pseudobulweria rostrata	freira-do-taiti
Pseudobulweria becki	freira-de-beck
Pseudobulweria macgillivrayi	freira-das-fiji
Procellaria cinerea	pardela-cinzenta
Procellaria aequinoctialis	pardela-de-queixo-branco
Procellaria conspicillata	pardela-d'óculos
Procellaria parkinsoni	pardela-de-parkinson
Procellaria westlandica	pardela-de-westland
Calonectris leucomelas	cagarra-do-pacífico
Calonectris diomedea	cagarra-do-mediterrâneo
Calonectris borealis	cagarra-do-atlântico



Figura 118 - cagarra-do-atlântico *Calonectris borealis*

(Foto: José Frade – Portugal)

Calonectris edwardsii	cagarra-de-cabo-verde
Ardenna pacifica	pardela-rabilonga
Ardenna bulleri	pardela-de-dorso-cinzento
Ardenna grisea	pardela-preta
Ardenna tenuirostris	pardela-da-tasmânia
Ardenna creatopus	pardela-de-patas-rosadas
Ardenna carneipes	pardela-de-patas-claras
Ardenna gravis	pardela-de-barrete
Puffinus nativitatis	pardela-de-kiritimati
Puffinus puffinus	pardela-sombria
Puffinus yelkouan	pardela-do-mediterrâneo

Puffinus mauretanicus	pardela-balear
Puffinus bryani	pardela-de-bryan
Puffinus opisthomelas	pardela-da-califórnia
Puffinus auricularis	pardela-de-townsend
Puffinus newelli	pardela-de-newell
Puffinus myrtae	pardela-de-rapa
Puffinus gavia	pardela-agitada
Puffinus huttoni	pardela-de-hutton
Puffinus lherminieri	pardela-de-audubon
Puffinus persicus	pardela-persa
Puffinus bailloni	pardela-tropical
Puffinus subalaris	pardela-das-galápagos
Puffinus bannermani	pardela-de-bannerman
Puffinus heinrothi	pardela-de-heinroth
Puffinus assimilis	pardela-maori
Puffinus elegans	pardela-subantárctica
Puffinus baroli	pardela-pequena
Puffinus boydi	pardela-de-cabo-verde
Pelecanoides garnotii	pardela-mergulhadora-peruana
Pelecanoides magellani	pardela-mergulhadora-de-magalhães
Pelecanoides georgicus	pardela-mergulhadora-da-geórgia-do-sul
Pelecanoides urinatrix	pardela-mergulhadora-comum
Bulweria bulwerii	alma-negra-de-bulwer
Bulweria bifax	alma-negra-de-santa-helena
Bulweria fallax	alma-negra-arábica

Ciconiidae Cegonhas

As cegonhas são aves de grande porte, com patas longas e bico longo. A sua dieta é composta por matéria animal e inclui vertebrados e invertebrados. Tal como acontece com a maioria das rapinas, as cegonhas são aves planadoras, conseguindo tirar partido das correntes ascendentes na atmosfera para conseguir ganhar altura. No caso das espécies asiáticas, há várias que se encontram ameaçadas.

Espécies: 20

Distribuição: Quase cosmopolita, mas faltam em grande parte da América do Norte e nas regiões polares

Anastomus lamelligerus	cegonha-de-bico-aberto-africana
Anastomus oscitans	cegonha-de-bico-aberto-asiática
Leptoptilos crumenifer	marabu-africano
Leptoptilos javanicus	marabu-pequeno
Leptoptilos dubius	marabu-grande
Mycteria americana	cegonha-americana
Mycteria ibis	cegonha-de-bico-amarelo
Mycteria leucocephala	cegonha-pintada
Mycteria cinerea	cegonha-malaia
Jabiru mycteria	jabiru-americano




Figura 119 - marabu-africano *Leptoptilos crumenifer*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Ephippiorhynchus senegalensis	jabiru-africano
Ephippiorhynchus asiaticus	jabiru-asiático
Ciconia abdimii	cegonha-de-abdim
Ciconia episcopus	cegonha-lanuda
Ciconia stormi	cegonha-de-faces-amarelas
Ciconia nigra	cegonha-preta
Ciconia maguari	cegonha-maguari
Ciconia microscelis	cegonha-episcopal
Ciconia ciconia	cegonha-branca
Ciconia boyciana	cegonha-oriental



Figura 120 - cegonha-branca *Ciconia ciconia* e cegonha-preta *Ciconia nigra*

(Foto: Gonçalo Elias – Portugal)

Fregatidae Fragatas

As fragatas, tal como os moleiros, têm a fama de serem piratas dos mares, devido ao seu hábito de perseguirem outras aves para lhes roubarem o alimento. Contudo, também caçam o seu próprio alimento, em especial peixes voadores e lulas. São aves marinhas de grande porte, com asas e cauda longas e plumagem preta. Os machos têm uma enorme bolsa gular vermelha, que fazem inflar durante a época de reprodução, a fim de impressionar as fêmeas.

Espécies: 5

Distribuição: Águas oceânicas, em latitudes tropicais

Fregata aquila	fragata-de-ascensão
Fregata magnificens	fragata-magnífica
Fregata ariel	fragata-pequena
Fregata minor	fragata-grande
Fregata andrewsi	fragata-da-ilha-de-natal



Figura 121 - fragata-magnífica *Fregata magnificens*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Sulidae Gansos-patolas e Alcatrazes

Esta família reúne dois grupos de aves marinhas de grande porte: os alcatrazes e os gansos-patolas. São aves com asas longas e pontiagudas e um bico cónico e aguçado. Alimentam-se sobretudo de peixes e lulas, que capturam com um espectacular mergulho, como um torpedo, podendo atingir profundidades de 25 metros enquanto perseguem as suas presas debaixo de água. Frequentam mar aberto, geralmente perto da costa, e preferem nidificar em ilhas.

Espécies: 11

Distribuição: Águas oceânicas, em latitudes tropicais e temperadas



Figura 122 - alcatraz-pardo *Sula leucogaster*

(José Frade – Portugal)

Papasula abbotti	alcatraz-de-abbott
Morus bassanus	ganso-patola-do-atlântico
Morus capensis	ganso-patola-do-cabo
Morus serrator	ganso-patola-australiano
Sula sula	alcatraz-de-pés-vermelhos
Sula leucogaster	alcatraz-pardo
Sula brewsteri	alcatraz-de-cocos
Sula dactylatra	alcatraz-grande
Sula granti	alcatraz-de-nazca
Sula nebouxii	alcatraz-de-pés-azuis

Sula variegata	alcatraz-peruano

Anhingidae Mergulhões-serpente e Anhinga

Estas aves fazem lembrar corvos-marinhos, mas com um bico mais longo e pontiagudo. Tal como estes, mergulham em busca de peixe e são ágeis nadadoras. Utilizam o bico para empalar as presas, que depois trazem à superfície, atiram para o ar e engolem. Ocorrem em zonas húmidas de água doce, com águas pouco profundas e poisos disponíveis.

Espécies: 4

Distribuição: América tropical, África subsariana, Ásia tropical e Australásia

Anhinga melanogaster	mergulhão-serpente-asiático
Anhinga rufa	mergulhão-serpente-africano
Anhinga novaehollandiae	mergulhão-serpente-australiano
Anhinga anhinga	anhinga



Figura 122 - anhinga *Anhinga anhinga*

(Foto: Luís Custódia – Panamá)

Phalacrocoracidae — Corvos-marinhos

Os corvos-marinhos, cuja plumagem negra pode fazer lembrar corvídeos, são aves aquáticas de médio a grande porte, que se alimentam sobretudo de peixe. A maioria das espécies costuma abrir as asas ao sol, para as secar. Em certos países existe a tradição de domesticar os corvos-marinhos e de os treinar para pescar de forma controlada: atando um laço à garganta da ave, esta fica impedida de engolir peixes grandes, que são depois removidos pelo pescador.

Espécies: 36

Distribuição: Cosmopolita

Microcarbo pygmaeus	corvo-marinho-pigmeu
Microcarbo africanus	corvo-marinho-africano
Microcarbo coronatus	corvo-marinho-coroado
Microcarbo niger	corvo-marinho-javanês
Microcarbo melanoleucos	corvo-marinho-de-bico-curto
Poikilocarbo gaimardi	corvo-marinho-de-patas-vermelhas
Urile penicillatus	corvo-marinho-de-garganta-azul
Urile urile	corvo-marinho-de-faces-vermelhas
Urile pelagicus	corvo-marinho-pelágico
Urile perspicillatus	corvo-marinho-de-lunetas
Phalacrocorax neglectus	corvo-marinho-dos-baixios
Phalacrocorax nigrogularis	corvo-marinho-de-socotra
Phalacrocorax featherstoni	corvo-marinho-de-pitt
Phalacrocorax punctatus	corvo-marinho-de-pintas
Phalacrocorax fuscescens	corvo-marinho-da-tasmânia
Phalacrocorax varius	corvo-marinho-alvinegro
Phalacrocorax sulcirostris	corvo-marinho-preto
Phalacrocorax fuscicollis	corvo-marinho-indiano
Phalacrocorax capensis	corvo-marinho-do-cabo
Phalacrocorax capillatus	corvo-marinho-japonês
Phalacrocorax lucidus	corvo-marinho-de-peito-branco
Phalacrocorax carbo	corvo-marinho-de-faces-brancas
Gulosus aristotelis	corvo-marinho-de-crista
Nannopterum harrisi	corvo-marinho-das-galápagos
Nannopterum brasilianum	corvo-marinho-americano
Nannopterum auritum	corvo-marinho-d'orelhas
Leucocarbo magellanicus	corvo-marinho-de-magalhães
Leucocarbo bougainvilliorum	corvo-marinho-do-guano
Leucocarbo ranfurlyi	corvo-marinho-das-bounty
Leucocarbo carunculatus	corvo-marinho-maori
Leucocarbo onslowi	corvo-marinho-das-chatham
Leucocarbo chalconotus	corvo-marinho-de-otago
Leucocarbo stewarti	corvo-marinho-da-ilha-stewart



Figura 123 - corvo-marinho-de-crista *Gulosus aristotelis*

(Foto: José Frade – Noruega)

Leucocarbo colensoi	corvo-marinho-das-auckland
Leucocarbo campbelli	corvo-marinho-das-campbell
Leucocarbo atriceps	corvo-marinho-imperial

Threskiornithidae Íbis e Colhereiros

As 30 espécies de íbis e as 6 espécies de colhereiros encontram-se reunidas nesta família. São aves de médio ou grande porte, com o pescoço e as patas longas. As íbis têm plumagem preta, branca ou castanha e o bico curvado; já os colhereiros têm a plumagem branca ou rosada e o bico espalmado. Frequentam águas pouco profundas e nidificam colonialmente, geralmente em árvores, mas por vezes em ilhas no meio de zonas húmidas ou, nalguns casos, em escarpas.

Espécies: 36

Distribuição: Cosmopolita excepto regiões polares

Threskiornis aethiopicus	íbis-sagrada
Threskiornis bernieri	íbis-malgaxe
Threskiornis solitarius	íbis-da-reunião
Threskiornis melanocephalus	íbis-de-cabeça-preta
Threskiornis molucca	íbis-branca-australiana
Threskiornis spinicollis	íbis-pescoço-de-palha
Pseudibis papillosa	íbis-de-nuca-vermelha
Pseudibis davisoni	íbis-d'ombros-brancos
Pseudibis gigantea	íbis-gigante
Geronticus eremita	íbis-eremita



Figura 124 - íbis-carunculada *Bostrychia carunculata*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Geronticus calvus	íbis-calva
Nipponia nippon	íbis-japonesa
Bostrychia olivacea	íbis-olivácea
Bostrychia bocagei	íbis-de-são-tomé
Bostrychia rara	íbis-malhada
Bostrychia hagedash	íbis-hadada
Bostrychia carunculata	íbis-carunculada
Theristicus caerulescens	íbis-cinzenta
Theristicus caudatus	íbis-de-pescoço-ruivo
Theristicus melanopis	íbis-de-faces-pretas
Theristicus branickii	íbis-andina
Cercibis oxycerca	íbis-rabilonga
Mesembrinibis cayennensis	Íbis-verde
Phimosus infuscatus	íbis-de-faces-nuas
Eudocimus albus	íbis-branca-americana
Eudocimus ruber	íbis-escarlate
Plegadis falcinellus	íbis-preta
Plegadis chihi	íbis-de-faces-brancas
Plegadis ridgwayi	íbis-da-puna
Lophotibis cristata	íbis-de-poupa
Platalea leucorodia	colhereiro-comum
Platalea minor	colhereiro-pequeno
Platalea alba	colhereiro-africano
Platalea regia	colhereiro-real
Platalea flavipes	colhereiro-de-bico-amarelo
Platalea ajaja	colhereiro-rosado

Ardeidae Garças, Garçotes e afins

Os ardeídeos, vulgarmente chamados garças, são aves que têm longas patas, um longo pescoço e um longo bico em forma de arpão. Têm um porte médio a grande, mas existe uma grande variabilidade entre espécies quanto ao tamanho. A maioria frequenta zonas com água, alimentando-se de diversos tipos de vertebrados ou invertebrados aquáticos. Muitas espécies são coloniais, associando-se a outros ardeídeos ou até a outros grupos de aves aquáticas.

Espécies: 74

Distribuição: Cosmopolita excepto regiões polares

Tigriornis leucolopha	garça-tigre-africana
Tigrisoma lineatum	garça-tigre-da-floresta
Tigrisoma mexicanum	garça-tigre-mexicana



Figura 125 - garça-tigre-mexicana *Tigrisoma mexicanum*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Tigrisoma fasciatum	garça-tigre-escura
Cochlearius cochlearius	garça-de-bico-largo
Agamia agami	garça-agami
Zebrilus undulatus	garça-zebra
Botaurus stellaris	abetouro-comum

Botaurus poiciloptilus	abetouro-da-oceânia
Botaurus lentiginosus	abetouro-americano
Botaurus pinnatus	abetouro-ruivo
Botaurus involucris	garçote-de-dorso-listado
Botaurus exilis	garçote-pequeno
Botaurus flavicollis	garçote-preto
Botaurus cinnamomeus	garçote-canela
Botaurus eurhythmus	garçote-da-manchúria
Botaurus sturmii	garçote-anão
Botaurus minutus	garçote-comum
Botaurus sinensis	garçote-amarelo
Botaurus dubius	garçote-australiano
Botaurus novaezelandiae	garçote-maori
Nyctanassa violacea	goraz-coroado
Nyctanassa carcinocatactes	goraz-das-bermudas
Nycticorax nycticorax	goraz-comum
Nycticorax olsoni	goraz-de-ascensão
Nycticorax duboisi	goraz-da-reunião
Nycticorax mauritianus	goraz-das-maurícias
Nycticorax megacephalus	goraz-de-rodrigues
Nycticorax caledonicus	goraz-ruivo
Gorsachius melanolophus	garça-nocturna-malaia
Gorsachius goisagi	garça-nocturna-japonesa
Pilherodius pileatus	garça-de-barrete
Syrigma sibilatrix	garça-assobiadeira
Egretta caerulea	garça-azul-pequena
Egretta tricolor	garça-tricolor
Egretta rufescens	garça-ruiva
Egretta vinaceigula	garça-de-garganta-vermelha
Egretta ardesiaca	garça-preta
Egretta sacra	garça-sagrada
Egretta eulophotes	garça-chinesa
Egretta thula	garça-branca-americana
Egretta garzetta	garça-branca-pequena
Egretta gularis	garça-dos-recifes
Egretta picata	garça-malhada
Egretta novaehollandiae	garça-de-faces-brancas
Calherodius leuconotus	garça-nocturna-de-dorso-branco
Oroanassa magnifica	garça-nocturna-magnífica
Butorides atricapilla	garça-dos-mangais
Butorides striata	garçote-de-dorso-verde
Butorides sundevalli	garçote-das-galápagos
Butorides virescens	garçote-verde
Zonerodius heliosylus	garça-tigre-da-papua
Ardeola rufiventris	papa-ratos-de-barriga-ruiva



Figura 126 - papa-ratos-indiano *Ardeola grayii*

(Fotos: Luís Custódia – India)

Ardeola ralloides	papa-ratos-comum
Ardeola idae	papa-ratos-malgaxe
Ardeola grayii	papa-ratos-indiano
Ardeola bacchus	papa-ratos-chinês
Ardeola speciosa	papa-ratos-javanês
Ardea pacifica	garça-de-pescoço-branco
Ardea alba	garça-branca-grande
Ardea brachyrhyncha	garça-de-bico-amarelo
Ardea intermedia	garça-média
Ardea plumifera	garça-emplumada
Ardea ibis	garça-boieira-ocidental
Ardea coromanda	garça-boieira-oriental
Ardea cinerea	garça-real
Ardea herodias	garça-azul-grande
Ardea cocoi	garça-cocoi
Ardea purpurea	garça-vermelha
Ardea humbloti	garça-malgaxe
Ardea insignis	garça-de-barriga-branca
Ardea sumatrana	garça-de-bico-grande

Ardea melanocephala	garça-de-cabeça-preta
Ardea goliath	garça-gigante

Scopidae **Cabeça-de-martelo**

O cabeça-de-martelo é uma ave aquática de tamanho médio, sendo também conhecido pelos nomes de ave-martelo ou pássaro-martelo. Habita zonas de águas pouco profundas e constrói um ninho de grande dimensão. Embora no passado estivesse classificado nos Ciconiiformes, actualmente está nos Pelecaniformes; os seus parentes mais próximos são o bico-de-sapato e os pelicanos.

Espécies: 1

Distribuição: África subsariana, Madagáscar e sul da Península Arábica



Figura 127 - cabeça-de-martelo *Scopus umbretta*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Scopus umbretta cabeça-de-martelo

O bico-de-sapato, que deve o nome ao seu enorme bico que faz lembrar um sapato, é uma grande ave pernalta do tamanho de uma cegonha. O seu nome genérico *Balaeniceps* significa 'cabeça-de-baleia'. É uma ave aquática que vive em zonas húmidas de água doce, especialmente em pauis com papiro e outros tipos de vegetação emergente. Alimenta-se de vertebrados aquáticos.

Espécies: 1

Distribuição: África central e oriental



Figura 128 - bico-de-sapato *Balaeniceps rex*

(Foto: Chege wa Kariuki - Uganda)

Pelecanidae Pelicanos

A característica mais conhecida e mais diferenciadora dos pelicanos é a enorme bolsa que têm na garganta que serve não só para capturar as presas, mas também para drenar a água antes de as engolir. Estas aves, de grande porte, encontram-se ligadas ao meio aquático e têm uma distribuição alargada, sendo mais frequentes em climas quentes. Habitam em águas costeiras e interiores e nidificam colonialmente.

Espécies: 8

Distribuição: Cosmopolita excepto regiões polares



Figura 129 - pelicano-rosado *Pelecanus rufescens*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Pelecanus onocrotalus	pelicano-branco
Pelecanus rufescens	pelicano-rosado
Pelecanus philippensis	pelicano-oriental
Pelecanus crispus	pelicano-crespo
Pelecanus conspicillatus	pelicano-australiano
Pelecanus erythrorhynchos	pelicano-americano
Pelecanus occidentalis	pelicano-pardo
Pelecanus thagus	pelicano-peruano

Opisthocomidae **Cigana**

Um mistério taxonómico, esta ave é peculiar de muitas formas. Nidifica em árvores nas margens de lagos e outras águas paradas, onde se alimenta quase exclusivamente de folhas. Para as digerir, tem um papo muito desenvolvido contendo bactérias semelhantes às encontradas em mamíferos ruminantes. As crias, quando alarmadas, atiram-se à água, utilizando depois garras na articulação da asa para trepar de volta para o ninho.

Espécies: 1

Distribuição: metade norte da América do Sul



Figura 130 - cigana *Opisthocomus hoazin*

(Foto: João Pereira – Peru)

Opisthocomus hoazin cigana

Cathartidae Urubus e Condores

Os abutres do Novo Mundo partilham o estilo de vida e adaptações, embora não a origem evolutiva, com os abutres que nos são mais familiares na família Accipitridae. São aves necrófagas de grande dimensão, que se deslocam em voo planado e que dependem de um apurado sentido de olfacto e visão para encontrar alimento. As duas espécies de condores encontram-se ameaçadas.

Espécies: 7

Distribuição: Américas

Gymnogyps californianus	condor-da-califórnia
Sarcoramphus papa	urubu-rei
Vultur gryphus	condor-dos-andes
Coragyps atratus	urubu-preto



Figura 131 - urubu-preto *Coragyps atratus*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Cathartes aura	urubu-de-cabeça-vermelha
Cathartes burrovianus	urubu-de-cabeça-amarela
Cathartes melambrotus	urubu-amazónico

Sagittariidae **Secretário**

O secretário é uma ave de rapina de aspecto singular: tem um corpo de águia e umas longas pernas que fazem lembrar as de um grou, ficando assim com o aspecto de uma "rapina pernalta". Esta espécie, que é o único membro da sua família, vive na savana africana e tem uma distribuição alargada, mas as suas populações encontram-se em declínio.

Espécies: 1

Distribuição: África subsariana



Figura 132 - secretário *Sagittarius serpentarius*

(Foto: Chege wa Kariuki – Quénia)

Sagittarius serpentarius secretário

Pandionidae Águias-pesqueiras

A águia-pesqueira é uma ave de rapina de características únicas. Distingue-se de todas as outras rapinas diurnas pelo dedo exterior reversível e pela presença de espinhos na face inferior dos pés, muito úteis para segurar os peixes de que se alimenta. Embora historicamente tenha sido considerada uma única espécie, algumas autoridades taxonómicas consideram actualmente duas espécies, atribuindo o estatuto de espécie à população australiana.

Espécies: 1

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida



Figura 133 - águia-pesqueira-comum *Pandion haliaetus*

(Foto: José Frade – Portugal)

Pandion haliaetus águia-pesqueira

Accipitridae Águias, Milhafres e afins

Aqui se inclui a larga maioria das aves de rapina. Grande parte delas têm dimensão média a grande e são predadoras de outros vertebrados, utilizando os seus bicos em gancho e poderosas garras. À parte essas características, são extremamente variadas em forma, estilo de voo, preferência de habitat e grau de especialização da sua dieta. Os abutres do Velho Mundo, por exemplo, são parte desta família e exclusivamente necrófagos, enquanto o vespeiro-europeu se especializou em atacar ninhos de abelhas e vespas.

Espécies: 256

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida



Figura 134 - peneireiro-cinzento *Elanus caeruleus*

(Foto: José Frade – Portugal)

Elanus caeruleus	peneireiro-cinzento
Elanus axillaris	peneireiro-d'ombro-preto
Elanus leucurus	peneireiro-de-cauda-branca
Elanus scriptus	peneireiro-d'asa-escrita
Gampsonyx swainsonii	peneireiro-pérola
Chelictinia riocourii	peneireiro-cauda-de-andorinha
Polyboroides typus	gimnogene-pequeno
Polyboroides radiatus	gimnogene-malgaxe
Gypohierax angolensis	abutre-das-palmeiras

Gypaetus barbatus	quebra-ossos
Neophron percnopterus	abutre-do-egipto
Eutriorchis astur	águia-serpentária-malgaxe
Leptodon cayanensis	milhafre-de-cabeça-cinzenta
Leptodon forbesi	milhafre-nordestino
Chondrohierax uncinatus	milhafre-bico-de-gancho
Chondrohierax wilsonii	milhafre-cubano
Pernis apivorus	vespeiro-europeu
Pernis ptilorhynchus	vespeiro-oriental
Pernis celebensis	vespeiro-de-celebes
Pernis steerei	vespeiro-filipino
Elanoides forficatus	gavião-tesoura
Lophoictinia isura	milhafre-de-cauda-quadrada
Hamirostra melanosternon	milhafre-de-peito-preto
Aviceda cuculoides	gavião-cuco-africano
Aviceda madagascariensis	gavião-cuco-malgaxe
Aviceda jerdoni	gavião-cuco-oriental
Aviceda subcristata	gavião-cuco-australiano
Aviceda leuphotes	gavião-cuco-preto
Henicopernis longicauda	vespeiro-rabilongo
Henicopernis infuscatus	vespeiro-preto
Necrosyrtes monachus	abutre-de-capuz
Gyps africanus	grifo-africano
Gyps bengalensis	grifo-bengalense
Gyps indicus	grifo-indiano
Gyps tenuirostris	grifo-de-bico-fino
Gyps rueppelli	grifo-de-rüppell
Gyps himalayensis	grifo-dos-himalaias
Gyps fulvus	grifo-eurasiático
Gyps coprotheres	grifo-do-cabo
Sarcogyps calvus	abutre-de-cabeça-vermelha
Trigonoceps occipitalis	abutre-de-cabeça-branca
Aegypius monachus	abutre-preto
Torgos tracheliotos	abutre-real
Spilornis cheela	águia-cobreira-de-crista
Spilornis klossi	águia-cobreira-de-nicobar
Spilornis kinabaluensis	águia-cobreira-montesa
Spilornis rufipectus	águia-cobreira-de-celebes
Spilornis holospilus	águia-cobreira-filipina
Spilornis elgini	águia-cobreira-das-andamão
Pithecophaga jefferyi	águia-filipina
Terathopius ecaudatus	águia-bailarina
Circaetus cinerascens	águia-cobreira-de-cauda-branca
Circaetus fasciolatus	águia-cobreira-barrada
Circaetus spectabilis	águia-cobreira-congolesa



Figura 135 - águia-cobreira-de-crista *Spilornis cheela*

(Foto: Alan Stringer - Índia)

Circaetus beaudouini	águia-cobreira-saheliana
Circaetus pectoralis	águia-cobreira-de-peito-preto
Circaetus gallicus	águia-cobreira-eurasiática
Circaetus cinereus	águia-cobreira-castanha
Macheiramphus alcinus	gavião-morcegueiro
Harpyopsis novaeguineae	águia-da-papua
Morphnus guianensis	águia-de-crista
Harpia harpyja	harpia
Stephanoaetus coronatus	águia-coroada
Nisaetus kelaarti	águia-gavião-do-ceilão
Nisaetus nanus	águia-gavião-anã
Nisaetus nipalensis	águia-gavião-montesa
Nisaetus alboniger	águia-gavião-de-blyth
Nisaetus bartelsi	águia-gavião-javanesa
Nisaetus lanceolatus	águia-gavião-de-celebes
Nisaetus pinskeri	águia-gavião-de-pinsker

Nisaetus philippensis	águia-gavião-filipina
Nisaetus cirrhatus	águia-gavião-variável
Nisaetus floris	águia-gavião-das-flores
Spizaetus tyrannus	águia-gavião-preta
Spizaetus melanoleucus	águia-gavião-alvinegra
Spizaetus ornatus	águia-gavião-coroada
Spizaetus isidori	águia-gavião-bicolor
Lophotriorchis kienerii	águia-de-barriga-ruiva
Polemaetus bellicosus	águia-marcial
Lophaetus occipitalis	águia-de-penacho
Ictinaetus malaiensis	águia-malaia
Clanga hastata	águia-indiana
Clanga pomarina	águia-pomarina
Clanga clanga	águia-gritadeira
Hieraaetus wahlbergi	águia-de-wahlberg
Hieraaetus ayresii	águia-de-ayres



Figura 136 - águia-calçada *Hieraaetus pennatus*

(Foto: Gonçalo Elias – Portugal)

Hieraaetus pennatus	águia-calçada
Hieraaetus weiskei	águia-anã
Hieraaetus morphnoides	águia-pequena
Aquila nipalensis	águia-das-estepes
Aquila rapax	águia-fulva
Aquila adalberti	águia-imperial-ibérica

Aquila heliaca	águia-imperial-oriental
Aquila chrysaetos	águia-real
Aquila africana	águia-africana
Aquila audax	águia-audaz
Aquila gurneyi	águia-das-molucas
Aquila verreauxii	águia-preta
Aquila fasciata	águia-de-bonelli
Aquila spilogaster	águia-dominó
Harpagus bidentatus	gavião-bidentado-ruivo
Harpagus diodon	gavião-bidentado-cinzento
Kaupifalco monogrammicus	gavião-papa-lagartos
Micronisus gabar	gavião-palrador
Melierax metabates	açor-cantor-escuro
Melierax poliopterus	açor-cantor-somali
Melierax canorus	açor-cantor-pálido
Urotriorchis macrourus	gavião-rabilongo
Erythrotriorchis buergersi	açor-d'ombros-castanhos
Erythrotriorchis radiatus	açor-ruivo
Megatriorchis doriae	açor-de-doria
Microspizias superciliosus	gavião-minúsculo
Microspizias collaris	gavião-de-coleira-interrompida
Lophospiza trivirgata	açor-de-crista
Lophospiza griseiceps	açor-de-celebes
Aerospiza toussenelii	açor-de-peito-ruivo
Aerospiza tachiro	açor-africano
Aerospiza castanilius	gavião-de-flancos-ruivos
Tachyspiza badia	gavião-chicra
Tachyspiza butleri	gavião-de-nicobar
Tachyspiza brevipes	gavião-do-levante
Tachyspiza soloensis	gavião-chinês
Tachyspiza francesiae	gavião-de-frances
Tachyspiza trinotata	gavião-de-cauda-pintada
Tachyspiza novaehollandiae	açor-cinzento
Tachyspiza hiogaster	açor-variável
Tachyspiza fasciata	açor-da-oceânia
Tachyspiza melanochlamys	açor-de-dorso-preto
Tachyspiza albogularis	açor-bicolor
Tachyspiza haplochroa	açor-da-nova-caledónia
Tachyspiza rufitorques	açor-das-fiji
Tachyspiza henicogramma	açor-das-molucas
Tachyspiza luteoschistacea	açor-de-manto-ardósia
Tachyspiza imitator	açor-imitador
Tachyspiza poliocephala	açor-de-cabeça-cinzenta
Tachyspiza princeps	açor-da-nova-bretanha
Tachyspiza erythropus	gavião-de-patas-vermelhas

Tachyspiza minulla	gavião-pequeno
Tachyspiza gularis	gavião-japonês
Tachyspiza virgata	gavião-besra
Tachyspiza nanus	gavião-anão
Tachyspiza erythrauchen	gavião-das-molucas
Tachyspiza cirrocephala	gavião-de-colar
Tachyspiza brachyura	gavião-da-nova-bretanha
Tachyspiza rhodogaster	gavião-de-peito-ruivo
Accipiter madagascariensis	gavião-malgaxe
Accipiter ovampensis	gavião-do-ovambo
Accipiter nisus	gavião-europeu



Figura 137 - gavião-europeu *Accipiter nisus*

(Foto: Lara Groß - Alemanha)

Accipiter rufiventris	gavião-ruivo
Accipiter poliogaster	açor-de-barriga-cinzenta
Accipiter striatus	gavião-estriado
Accipiter chionogaster	gavião-de-peito-branco
Accipiter ventralis	gavião-andino
Accipiter erythronemius	gavião-de-coxas-ruivas
Astur cooperii	gavião-de-cooper
Astur gundlachi	gavião-cubano
Astur bicolor	gavião-bicolor
Astur chilensis	gavião-chileno
Astur melanoleucus	açor-preto

Astur henstii	açor-malgaxe
Astur gentilis	açor-eurasiático
Astur atricapillus	açor-americano
Astur meyerianus	açor-de-meyer
Megatriorchis doriae	açor-de-doria
Circus aeruginosus	tartaranhão-dos-pauis
Circus spilonotus	tartaranhão-oriental
Circus spilothorax	tartaranhão-da-papua
Circus approximans	tartaranhão-da-oceânia
Circus ranivorus	tartaranhão-africano
Circus maillardi	tartaranhão-da-reunião
Circus macrosceles	tartaranhão-malgaxe
Circus buffoni	tartaranhão-d'asa-longa
Circus assimilis	tartaranhão-malhado
Circus maurus	tartaranhão-preto
Circus cyaneus	tartaranhão-azulado
Circus hudsonius	tartaranhão-americano
Circus cinereus	tartaranhão-andino
Circus macrourus	tartaranhão-pálido
Circus melanoleucos	tartaranhão-alvinegro
Circus pygargus	tartaranhão-caçador
Milvus milvus	milhafre-real



Figura 138 - pigargo-gigante *Haliaeetus pelagicus*

(Foto: Eric Forsyth - Japão)

Milvus migrans	milhafre-preto
Haliastur sphenurus	milhafre-assobiador
Haliastur indus	milhafre-brâmane
Haliaeetus pelagicus	pigargo-gigante
Haliaeetus leucoryphus	pigargo-de-pallas
Haliaeetus albicilla	pigargo-europeu
Haliaeetus leucocephalus	pigargo-americano
Icthyophaga leucogaster	pigargo-de-barriga-branca
Icthyophaga sanfordi	pigargo-das-salomão
Icthyophaga vocifer	pigargo-africano
Icthyophaga vociferoides	pigargo-malgaxe
Icthyophaga humilis	pigargo-pequeno
Icthyophaga ichthyaetus	pigargo-de-cabeça-cinzenta
Butastur rufipennis	bútio-dos-gafanhotos
Butastur teesa	bútio-d'olho-branco
Butastur liventer	bútio-d'asa-ruiva
Butastur indicus	bútio-de-faces-cinzentas
Ictinia mississippiensis	milhafre-do-mississípi
Ictinia plumbea	milhafre-cinzento
Busarellus nigricollis	bútio-de-colar
Rostrhamus sociabilis	caracoleiro-comum
Helicolestes hamatus	caracoleiro-do-igapó
Geranospiza caerulescens	bútio-pernilongo
Cryptoleucopteryx plumbea	bútio-plúmbeo
Buteogallus schistaceus	bútio-ardósia
Buteogallus anthracinus	bútio-preto-pequeno
Buteogallus gundlachii	bútio-cubano
Buteogallus aequinoctialis	bútio-caranguejeiro
Buteogallus meridionalis	bútio-da-savana
Buteogallus lacernulatus	bútio-de-pescoço-branco
Buteogallus urubitinga	bútio-preto-grande
Buteogallus solitarius	bútio-solitário
Buteogallus coronatus	bútio-do-chaco
Morphnarchus princeps	bútio-barrado
Rupornis magnirostris	bútio-dos-caminhos
Parabuteo unicinctus	bútio-de-harris
Parabuteo leucorrhous	bútio-d'uropígio-branco
Geranoaetus albicaudatus	bútio-de-cauda-branca
Geranoaetus polyosoma	bútio-variável
Geranoaetus melanoleucus	bútio-de-peito-preto
Pseudastur polionotus	bútio-pombo
Pseudastur albicollis	bútio-branco
Pseudastur occidentalis	bútio-de-dorso-cinzento
Leucopternis semiplumbeus	bútio-semiplúmbeo



Figura 139 - bútio-dos-caminhos *Rupornis magnirostris*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Leucopternis melanops	bútio-de-mascarilha
Leucopternis kuhli	bútio-de-sobrancelha
Bermuteo avivorus	bútio-das-bermudas
Buteo plagiatus	bútio-cinzento
Buteo nitidus	bútio-de-listas-cinzentas
Buteo lineatus	bútio-d'ombros-ruivos
Buteo ridgwayi	bútio-dominicano
Buteo platypterus	bútio-d'asa-larga
Buteo albigula	bútio-de-garganta-branca
Buteo brachyurus	bútio-de-cauda-curta
Buteo solitarius	bútio-havaiano
Buteo swainsoni	bútio-de-swainson
Buteo galapagoensis	bútio-das-galápagos
Buteo albonotatus	bútio-de-cauda-barrada
Buteo jamaicensis	bútio-de-cauda-vermelha
Buteo ventralis	bútio-patagónico
Buteo regalis	bútio-ferruginoso
Buteo lagopus	bútio-calçado
Buteo hemilasius	bútio-mongol
Buteo japonicus	bútio-oriental
Buteo burmanicus	bútio-dos-himalaias
Buteo rufinus	bútio-mouro
Buteo bannermani	bútio-de-cabo-verde



Figura 140 - bútio-chacal *Buteo rufofuscus*

(Foto: Gonçalo Elias – África do Sul)

Buteo socotraensis	bútio-de-socotra
Buteo buteo	bútio-d'asa-redonda
Buteo trizonatus	bútio-da-floresta
Buteo oreophilus	bútio-montês
Buteo archeri	bútio-somali
Buteo auguralis	bútio-de-pescoço-vermelho
Buteo brachypterus	bútio-malgaxe
Buteo augur	bútio-áugure
Buteo rufofuscus	bútio-chacal

Tytonidae Corujas-das-torres e afins

A família *Tytonidae* é a mais pequena das duas famílias de rapinas nocturnas e reúne as chamadas corujas-das-torres. Estas são aves de tamanho médio, com uma cabeça grande e um disco facial em forma de coração, que recolhe ondas de som. As suas penas permitem-lhe ter um voo muito silencioso. Cerca de metade das espécies tem áreas de distribuição muito reduzidas, ocorrendo apenas em certas ilhas tropicais, e são relativamente mal conhecidas.

Espécies: 20

Distribuição: Quase cosmopolita, faltando na Antárctida e em grande parte da Ásia

Tyto tenebricosa	coruja-fuliginosa-grande
Tyto multipunctata	coruja-fuliginosa-pequena
Tyto inexspectata	coruja-de-minahassa
Tyto nigrobrunnea	coruja-de-taliabu
Tyto sororcula	coruja-das-tanimbar
Tyto manusi	coruja-de-manus
Tyto aurantia	coruja-dourada
Tyto novaehollandiae	coruja-da-oceânia
Tyto rosenbergii	coruja-de-celebes



Figura 141 - coruja-das-torres-ocidental *Tyto alba*

(Foto: José Frade – Portugal)

Tyto soumagnei	coruja-malgaxe
Tyto alba	coruja-das-torres-ocidental
Tyto furcata	coruja-da-igreja
Tyto javanica	coruja-das-torres-oriental
Tyto deroepstorffi	coruja-das-andamão
Tyto glaucops	coruja-de-face-cinza
Tyto capensis	coruja-do-cabo
Tyto longimembris	coruja-do-capim
Phodilus prigoginei	coruja-congolesa
Phodilus badius	coruja-baia-oriental
Phodilus assimilis	coruja-baia-do-ceilão



Figura 142 - coruja-do-capim *Tyto longimembris*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Strigidae Mochos, Corujas e Bufos

Esta família inclui as chamadas corujas verdadeiras, reunindo quase todas as rapinas nocturnas (mochos, corujas e bufos), excepto as corujas-das-torres e espécies próximas destas. Têm um tamanho muito variável, desde o enorme bufo-real até ao minúsculo mocho-duende, que não é maior que um pardal. Apresentam uma cabeça grande, um disco facial redondo e uma plumagem críptica. Localizam as suas presas principalmente através da audição, graças aos seus ouvidos assimétricos.

Espécies: 238

Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida

Uroglaux dimorpha	coruja-açor-da-papua
Ninox albifacies	coruja-gavião-risonha
Ninox rufa	coruja-gavião-ruiva
Ninox strenua	coruja-gavião-poderosa
Ninox connivens	coruja-gavião-ladradora
Ninox rudolfi	coruja-gavião-de-sumba
Ninox boobook	coruja-gavião-australiana
Ninox rotiensis	coruja-gavião-de-rote
Ninox fusca	coruja-gavião-timorense
Ninox plesseni	coruja-gavião-de-alor
Ninox leucopsis	coruja-gavião-da-tasmânia
Ninox novaeseelandiae	coruja-gavião-maori
Ninox japonica	coruja-gavião-japonesa
Ninox scutulata	coruja-gavião-castanha
Ninox obscura	coruja-gavião-escura
Ninox randi	coruja-gavião-chocolate
Ninox affinis	coruja-gavião-das-andamão
Ninox philippensis	coruja-gavião-de-lução
Ninox spilocephala	coruja-gavião-de-mindanau
Ninox leventisi	coruja-gavião-de-camiguin
Ninox reyi	coruja-gavião-das-sulu
Ninox rumseyi	coruja-gavião-de-cebu
Ninox spilonotus	coruja-gavião-de-romblon
Ninox mindorensis	coruja-gavião-de-mindoro
Ninox sumbaensis	coruja-gavião-pequena
Ninox burhani	coruja-gavião-das-togian
Ninox ochracea	coruja-gavião-de-celebes
Ninox ios	coruja-gavião-vermelha
Ninox hypogramma	coruja-gavião-de-halmaera
Ninox hantu	coruja-gavião-de-buru
Ninox squamipila	coruja-gavião-de-ceram
Ninox forbesi	coruja-gavião-das-tanimbar
Ninox natalis	coruja-gavião-da-ilha-de-natal



Figura 143 - coruja-gavião-maori *Ninox novaeseelandiae*

(Foto: Lara Groß – Nova Zelândia)

Ninox meeki	coruja-gavião-de-manus
Ninox theomacha	coruja-gavião-da-papua
Ninox punctulata	coruja-gavião-salpicada
Ninox odiosa	coruja-gavião-da-nova-bretanha
Ninox variegata	coruja-gavião-das-bismarck
Margarobyas lawrencii	mocho-cubano
Taenioptynx brodiei	mocho-pigmeu-de-colar
Taenioptynx sylvaticus	mocho-pigmeu-das-sundas
Micrathene whitneyi	mocho-duende
Xenoglaux loweryi	mocho-de-bigodes

Aegolius funereus	mocho-funéreo
Aegolius acadicus	mocho-serrador-nortenho
Aegolius gradyi	mocho-serrador-das-bermudas
Aegolius ridgwayi	mocho-pardo
Aegolius harrisii	mocho-canela
Athene cunicularia	mocho-buraqueiro
Athene brama	mocho-brâmane
Athene noctua	mocho-galego
Athene superciliaris	mocho-de-sobrancelhas
Athene blewitti	mocho-da-floresta
Athene jacquinoti	mocho-das-salomão-ocidentais
Athene granti	mocho-de-guadalcanal
Athene malaitae	mocho-de-malaita
Athene roseoaxillaris	mocho-de-makira
Surnia ulula	mocho-gavião



Figura 144 - mocho-gavião *Surnia ulula*

(Foto: Pedro Nicolau – Noruega)

Glaucidium passerinum	mocho-pigmeu-eurasiático
Glaucidium perlatum	mocho-pigmeu-perlado
Glaucidium tephronotum	mocho-pigmeu-de-peito-ruivo
Glaucidium sjostedti	mocho-pigmeu-de-dorso-ruivo
Glaucidium cuculoides	mocho-pigmeu-listado
Glaucidium castanopterum	mocho-pigmeu-javanês
Glaucidium radiatum	mocho-pigmeu-da-selva
Glaucidium castanotum	mocho-pigmeu-do-ceilão

Glaucidium capense	mocho-pigmeu-barrado
Glaucidium albertinum	mocho-pigmeu-albertino
Glaucidium californicum	mocho-pigmeu-americano
Glaucidium gnoma	mocho-pigmeu-serrano
Glaucidium hoskinsii	mocho-pigmeu-da-baixa-califórnia
Glaucidium cobanense	mocho-pigmeu-guatemalteco
Glaucidium costaricanum	mocho-pigmeu-costa-riquenho
Glaucidium nubicola	mocho-pigmeu-do-chocó
Glaucidium jardinii	mocho-pigmeu-andino
Glaucidium bolivianum	mocho-pigmeu-dos-yungas
Glaucidium palmarum	mocho-pigmeu-de-colima
Glaucidium sanchezi	mocho-pigmeu-de-tamaulipas
Glaucidium griseiceps	mocho-pigmeu-centro-americano
Glaucidium parkeri	mocho-pigmeu-subtropical
Glaucidium hardyi	mocho-pigmeu-amazónico
Glaucidium minutissimum	mocho-pigmeu-mínimo
Glaucidium mooreorum	mocho-pigmeu-pernambucano
Glaucidium brasilianum	mocho-pigmeu-ferruginoso



Figura 145 - mocho-pigmeu-ferruginoso *Glaucidium brasilianum*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Glaucidium peruanum	mocho-pigmeu-peruano
Glaucidium nana	mocho-pigmeu-austral
Glaucidium siju	mocho-pigmeu-cubano
Otus gurneyi	mocho-d'orelhas-gigante
Otus sagittatus	mocho-d'orelhas-de-testa-branca

Otus rufescens	mocho-d'orelhas-vermelho
Otus thilohoffmanni	mocho-d'orelhas-do-ceilão
Otus icterorhynchus	mocho-d'orelhas-de-bico-amarelo
Otus ireneae	mocho-d'orelhas-de-sokoke
Otus balli	mocho-d'orelhas-das-andamão
Otus alfredi	mocho-d'orelhas-das-flores
Otus spilocephalus	mocho-d'orelhas-montês
Otus angelinae	mocho-d'orelhas-javanês
Otus mirus	mocho-d'orelhas-de-mindanau
Otus longicornis	mocho-d'orelhas-de-lução
Otus mindorensis	mocho-d'orelhas-de-mindoro
Otus hartlaubi	mocho-d'orelhas-de-são-tomé
Otus madagascariensis	mocho-d'orelhas-de-torotoroka
Otus rutilus	mocho-d'orelhas-malgaxe
Otus mayottensis	mocho-d'orelhas-de-maiote
Otus pauliani	mocho-d'orelhas-das-comores
Otus capnodes	mocho-d'orelhas-de-anjouan
Otus moheliensis	mocho-d'orelhas-de-mohéli
Otus grucheti	mocho-d'orelhas-da-reunião
Otus sauzieri	mocho-d'orelhas-das-maurícias
Otus murivorus	mocho-d'orelhas-de-rodrigues
Otus pembaensis	mocho-d'orelhas-de-pemba
Otus scops	mocho-d'orelhas-europeu
Otus cyprius	mocho-d'orelhas-cipriota
Otus bikegila	mocho-d’orelhas-do-príncipe
Otus brucei	mocho-d'orelhas-pálido
Otus pamelae	mocho-d'orelhas-árabe
Otus senegalensis	mocho-d'orelhas-africano
Otus feae	mocho-d'orelhas-de-ano-bom
Otus socotranus	mocho-d'orelhas-de-socotra
Otus sunia	mocho-d'orelhas-oriental
Otus elegans	mocho-d'orelhas-elegante
Otus magicus	mocho-d'orelhas-das-molucas
Otus tempestatis	mocho-d'orelhas-de-wetar
Otus sulaensis	mocho-d'orelhas-das-sula
Otus beccarii	mocho-d'orelhas-de-biak
Otus manadensis	mocho-d'orelhas-de-celebes
Otus mendeni	mocho-d'orelhas-das-banggai
Otus siaoensis	mocho-d'orelhas-de-siau
Otus collari	mocho-d'orelhas-de-sangihe
Otus mantananensis	mocho-d'orelhas-de-mantanani
Otus insularis	mocho-d'orelhas-das-seicheles
Otus alius	mocho-d'orelhas-de-nicobar
Otus umbra	mocho-d'orelhas-de-simeulue
Otus enganensis	mocho-d'orelhas-de-engano
Otus mentawi	mocho-d'orelhas-das-mentawai
Otus brookii	mocho-d'orelhas-real
Otus bakkamoena	mocho-d'orelhas-indiano

Otus lettia	mocho-d'orelhas-de-colar
Otus semitorques	mocho-d'orelhas-japonês
Otus lempiji	mocho-d'orelhas-das-sundas
Otus megalotis	mocho-d'orelhas-filipino
Otus nigrorum	mocho-d'orelhas-de-negros



Figura 146 - bufo-real *Bubo bubo*

(Foto: José Frade – Portugal)

Otus everetti	mocho-d'orelhas-de-everett
Otus fuliginosus	mocho-d'orelhas-de-palawan
Otus silvicola	mocho-d'orelhas-de-wallace
Otus jolandae	mocho-d'orelhas-de-lombok
Otus podarginus	mocho-d'orelhas-de-palau
Ptilopsis leucotis	mocho-de-faces-brancas-setentrional
Ptilopsis granti	mocho-de-faces-brancas-meridional
Asio grammicus	coruja-jamaicana
Asio clamator	bufo-gritador
Asio otus	bufo-pequeno
Asio abyssinicus	bufo-abissínio
Asio madagascariensis	bufo-malgaxe
Asio stygius	bufo-sombrio
Asio flammeus	coruja-do-nabal
Asio capensis	coruja-dos-pântanos
Asio solomonensis	bufo-das-salomão
Jubula lettii	mocho-de-crina
Bubo scandiacus	bufo-das-neves
Bubo virginianus	bufo-americano
Bubo nigrescens	bufo-colombiano



Figura 147 - bufo-pescador-malaio *Ketupa ketupu*

(Foto: Lara Groß – Malásia)

Bubo nacurutu	bufo-tropical
Bubo magellanicus	bufo-andino
Bubo bubo	bufo-real
Bubo bengalensis	bufo-indiano
Bubo ascalaphus	bufo-do-deserto
Bubo capensis	bufo-do-cabo
Bubo milesi	bufo-árabe
Bubo cinerascens	bufo-cinzento
Bubo africanus	bufo-africano
Bubo vosseleri	bufo-das-usambara
Ketupa poensis	bufo-da-guiné
Ketupa leucosticta	bufo-de-cabinda
Ketupa lactea	bufo-leitoso
Ketupa shelleyi	bufo-barrado
Ketupa blakistoni	bufo-pescador-da-manchúria
Ketupa zeylonensis	bufo-pescador-castanho
Ketupa flavipes	bufo-pescador-fulvo
Ketupa ketupu	bufo-pescador-malaio
Ketupa sumatrana	bufo-malaio
Ketupa nipalensis	bufo-nepalês
Ketupa coromanda	bufo-fuliginoso
Ketupa philippensis	bufo-filipino



Figura 148 - corujinha-norte-americana *Megascops asio*

(Foto: Shelley Rutkin – E.U.A.)

Scotopelia peli	corujão-pesqueiro-de-pel
Scotopelia ussheri	corujão-pesqueiro-ruivo
Scotopelia bouvieri	corujão-pesqueiro-vermiculado
Psiloscops flammeolus	mocho-flamejado
Gymnasio nudipes	corujinha-porto-riquenha
Megascops trichopsis	corujinha-bigoduda
Megascops clarkii	corujinha-serrana
Megascops albogularis	corujinha-de-garganta-branca
Megascops choliba	corujinha-sul-americana
Megascops barbarus	corujinha-barbuda
Megascops cooperi	corujinha-do-pacífico
Megascops kennicottii	corujinha-da-califórnia
Megascops asio	corujinha-norte-americana
Megascops seductus	corujinha-do-balsas
Megascops guatemalae	corujinha-guatemalteca
Megascops koepckeae	corujinha-de-koepcke
Megascops ingens	corujinha-arruivada
Megascops petersoni	corujinha-canela
Megascops marshalli	corujinha-de-marshall
Megascops hoyi	corujinha-dos-yungas
Megascops centralis	corujinha-do-chocó
Megascops roraimae	corujinha-das-colinas
Megascops sanctaecatarinae	corujinha-catarinense
Megascops gilesi	corujinha-de-santa-marta
Megascops roboratus	corujinha-de-tumbes
Megascops watsonii	corujinha-amazónica
Megascops atricapilla	corujinha-de-barrete
Pulsatrix perspicillata	coruja-d'óculos
Pulsatrix koeniswaldiana	coruja-de-sobrancelhas-amarelas
Pulsatrix melanota	coruja-de-sobrancelhas-andina
Lophostrix cristata	coruja-de-crista
Strix seloputo	coruja-malhada
Strix ocellata	coruja-ocelada
Strix leptogrammica	coruja-castanha
Strix aluco	coruja-do-mato
Strix mauritanica	coruja-magrebina
Strix nivicolum	coruja-dos-himalaias
Strix hadorami	coruja-do-deserto
Strix butleri	coruja-de-omã
Strix occidentalis	coruja-pintalgada
Strix varia	coruja-barrada
Strix sartorii	coruja-mexicana
Strix fulvescens	coruja-fulva
Strix hylophila	coruja-de-barras-ruivas
Strix chacoensis	coruja-do-chaco
Strix rufipes	coruja-de-patas-vermelhas
Strix uralensis	coruja-dos-urais
Strix davidi	coruja-do-sujuão

Strix nebulosa	coruja-da-lapónia
Strix woodfordii	coruja-da-floresta
Strix virgata	coruja-listada
Strix nigrolineata	coruja-alvinegra
Strix huhula	coruja-preta
Strix albitarsis	coruja-de-pés-brancos



Figura 149 - coruja-da-floresta *Strix woodfordii*

(Foto: Chege wa Kariuki - Quénia)

Coliidae Rabos-de-junco

Endémicos do continente africano, os rabos-de-junco são aves com um corpo relativamente pequeno e uma cauda muito longa. Frequentam savanas e bosques pouco densos. São muito acrobáticos e muitas vezes alimentam-se de barriga para cima ou, simplesmente, penduram-se em ramos, a descansar. Conseguem até pendurar-se com uma pata, usando a outra para se alimentarem. Também conseguem rastejar pelos ramos, como se fossem ratinhos.

Espécies: 6

Distribuição: África subsariana



Figura 150 - rabo-de-junco-estriado *Colius striatus*

(Foto: Paul Bourdin – África do Sul)

Colius striatus	rabo-de-junco-estriado
Colius leucocephalus	rabo-de-junco-de-cabeça-branca
Colius castanotus	rabo-de-junco-de-dorso-vermelho
Colius colius	rabo-de-junco-de-dorso-branco
Urocolius macrourus	rabo-de-junco-de-nuca-azul
Urocolius indicus	rabo-de-junco-de-faces-vermelhas

Leptosomidae Rolieiro-cuco

Esta família tem um único membro: o rolieiro-cuco. Esta espécie, endémica de ilhas do Oceano Índico, frequenta diversos tipos de espaços arborizados, nidificando em cavidades de árvores. A sua alimentação é composta por invertebrados. Não se encontra ameaçada e parece adaptar-se bem às alterações de habitat. Além disso, em Madagáscar o rolieiro-cuco não é perseguido, havendo alguns mitos e crenças que dizem ser esta uma ave de bom presságio.

Espécies: 1

Distribuição: Madagáscar e Ilhas Comores



Figura 151 rolieiro-cuco *Leptosomus discolor*

(Foto: Adam Riley / rockjumperbirding.com - Madagáscar)

Leptosomus discolor rolieiro-cuco

Trogonidae Trogons, Quetzais e Republicanos

Os trogons e republicanos são aves de média dimensão e cauda comprida, características das florestas tropicais de várias partes do mundo. São generalistas no que toca à alimentação. Apesar da sua plumagem vistosa, normalmente pousam imóveis a coberto da vegetação, o que dificulta a sua detecção. O quetzal-resplandecente, uma ave importante na mitologia dos povos da América Central e ave nacional da Guatemala, é parte desta família.

Espécies: 47

Distribuição: pantropical

Apaloderma narina	republicano-comum
Apaloderma aequatoriale	republicano-de-faces-amarelas
Apaloderma vittatum	republicano-de-cauda-barrada
Apalharpactes reinwardtii	republicano-javanês
Apalharpactes mackloti	republicano-de-samatra
Harpactes fasciatus	republicano-malabar
Harpactes kasumba	republicano-de-nuca-vermelha
Harpactes diardii	republicano-de-diard
Harpactes ardens	republicano-filipino
Harpactes whiteheadi	republicano-montês
Harpactes orrhophaeus	republicano-canela
Harpactes duvaucelii	republicano-escarlate
Harpactes oreskios	republicano-de-barriga-laranja
Harpactes erythrocephalus	republicano-de-cabeça-vermelha
Harpactes wardi	republicano-de-ward
Euptilotis neoxenus	quetzal-d'orelhas
Pharomachrus pavoninus	quetzal-pavão
Pharomachrus auriceps	quetzal-de-cabeça-dourada
Pharomachrus mocinno	quetzal-resplandecente
Pharomachrus fulgidus	quetzal-de-pontas-brancas
Pharomachrus antisianus	quetzal-de-crista
Priotelus temnurus	trogom-cubano
Priotelus roseigaster	trogom-dominicano
Trogon clathratus	trogom-costa-riquenho
Trogon massena	trogom-de-cauda-lisa
Trogon comptus	trogom-de-cauda-azul
Trogon mesurus	trogom-equatoriano
Trogon melanurus	trogom-de-cauda-preta
Trogon melanocephalus	trogom-de-cabeça-preta
Trogon citreolus	trogom-citrino
Trogon chionurus	trogom-de-cauda-branca
Trogon bairdii	trogom-de-baird



Figura 152 - trogom-violeta *Trogon caligatus*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Trogon viridis	trogom-de-dorso-verde
Trogon caligatus	trogom-violeta
Trogon ramonianus	trogom-amazónico
Trogon violaceus	trogom-guianense
Trogon curucui	trogom-de-coroa-azul
Trogon surrucura	trogom-variado
Trogon tenellus	trogom-dourado-nortenho
Trogon cupreicauda	trogom-dourado-ocidental
Trogon rufus	trogom-dourado-amazónico
Trogon chrysochloros	trogom-dourado-atlântico
Trogon ambiguus	trogom-de-cauda-acobreada
Trogon elegans	trogom-elegante
Trogon mexicanus	trogom-mexicano
Trogon collaris	trogom-de-colar
Trogon personatus	trogom-mascarado

Upupidae Poupas

As poupas são aves coloridas, fáceis de reconhecer devido à combinação de cores da sua plumagem e ao tufo de penas (‘poupa’) que apresentam no alto da cabeça. Alimentam-se sobretudo de invertebrados e nidificam em cavidades. Durante a época dos ninhos, a glândula uropigial da fêmea e das crias permite expelir um líquido de cheiro fétido, que serve para se defenderem de predadores.

Espécies: 3

Distribuição: Europa, África e Ásia



Figura 153 - poupa-comum *Upupa epops*

(Foto: José Frade – Portugal)

Upupa epops	poupa-comum
Upupa marginata	poupa-malgaxe
Upupa antaios	poupa-gigante

Phoeniculidae Zombeteiros

Os zombeteiros são aparentados às poupas e esse facto está reflectido no seu nome inglês 'wood hoopoes'. São aves de médio porte, com plumagem escura e brilhante, que vivem nas florestas e nas savanas africanas. Têm patas curtas e caudas longas, que usam para se agarrarem aos troncos das árvores, como os pica-paus. Usam o longo bico para perscrutarem as fendas nas cascas das árvores, em busca dos invertebrados de que se alimentam.

Espécies: 9

Distribuição: África subsariana

Phoeniculus castaneiceps	zombeteiro-de-cabeça-castanha
Phoeniculus bollei	zombeteiro-de-cabeça-branca
Phoeniculus purpureus	zombeteiro-de-bico-vermelho
Phoeniculus somaliensis	zombeteiro-de-bico-preto



Figura 154 - zombeteiro-de-bico-preto *Phoeniculus somaliensis*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Phoeniculus damarensis	zombeteiro-da-damaralândia
Phoeniculus granti	zombeteiro-de-grant
Rhinopomastus aterrimus	zombeteiro-preto
Rhinopomastus cyanomelas	bico-de-cimitarra
Rhinopomastus minor	zombeteiro-pequeno

Bucerotidae — Calaus típicos

Os calaus são aves arborícolas (com excepção dos calaus-terrestres) de dimensão média a grande, com um bico espesso, longo e curvo, que faz lembrar o dos tucanos e que, nalgumas espécies, tem um casquete na mandíbula superior. São aves arborícolas, que se alimentam de fruta e também de pequenos animais. Nidificam em cavidades, onde a fêmea se sela e permanece durante meses, desde a postura até as crias conseguirem voar, sendo alimentada pelo macho através de uma pequena abertura.

Espécies: 64

Distribuição: África subsariana, sul da Ásia e Melanésia

Bucorvus abyssinicus	calau-terrestre-abissínio
Bucorvus leadbeateri	calau-terrestre-meridional
Tockus ruahae	calau-de-ruaha
Tockus kempi	calau-ocidental
Tockus damarensis	calau-da-damaralândia
Tockus rufirostris	calau-meridional
Tockus erythrorhynchus	calau-de-bico-vermelho
Tockus monteiri	calau-de-monteiro
Tockus deckeni	calau-de-von-der-decken



Figura 155 - calau-trombeteiro *Bycanistes bucinator*

(Foto: Gonçalo Elias – África do Sul)

Tockus jacksoni	calau-de-jackson
Tockus leucomelas	calau-de-bico-amarelo-meridional
Tockus flavirostris	calau-de-bico-amarelo-oriental
Lophoceros bradfieldi	calau-de-bradfield
Lophoceros alboterminatus	calau-coroado-africano
Lophoceros semifasciatus	calau-preto-ocidental
Lophoceros fasciatus	calau-preto-congolês
Lophoceros hemprichii	calau-de-hemprich
Lophoceros nasutus	calau-cinzento
Lophoceros camurus	calau-pigmeu
Lophoceros pallidirostris	calau-de-bico-pálido
Bycanistes fistulator	calau-assobiador
Bycanistes bucinator	calau-trombeteiro
Bycanistes cylindricus	calau-de-faces-castanhas
Bycanistes albotibialis	calau-de-calças-brancas
Bycanistes subcylindricus	calau-de-faces-cinzentas
Bycanistes brevis	calau-de-faces-prateadas
Ceratogymna atrata	calau-de-casquete-preto



Figura 156 - calau-malhado-grande *Buceros bicornis*

(Foto: Alan Stringer - Índia)

Ceratogymna elata	calau-de-casquete-amarelo
Horizocerus hartlaubi	calau-de-hartlaub
Horizocerus granti	calau-de-grant
Horizocerus albocristatus	calau-de-touca-branca
Horizocerus cassini	calau-de-cassin
Berenicornis comatus	calau-de-pescoço-branco
Buceros rhinoceros	calau-rinoceronte
Buceros bicornis	calau-malhado-grande
Buceros hydrocorax	calau-ruivo
Rhinoplax vigil	calau-de-elmo
Anthracoceros marchei	calau-de-palawan
Anthracoceros albirostris	calau-de-faces-brancas
Anthracoceros coronatus	calau-coroado-indiano
Anthracoceros montani	calau-das-sulu
Anthracoceros malayanus	calau-malaio
Ocyceros griseus	calau-malabar
Ocyceros gingalensis	calau-do-ceilão
Ocyceros birostris	calau-indiano
Anorrhinus tickelli	calau-ferrugíneo
Anorrhinus austeni	calau-castanho
Anorrhinus galeritus	calau-de-crista
Aceros nipalensis	calau-nepalês
Rhyticeros plicatus	calau-da-papua
Rhyticeros narcondami	calau-de-narcondam
Rhyticeros undulatus	calau-vincado
Rhyticeros everetti	calau-de-sumba
Rhyticeros subruficollis	calau-de-garganta-lisa
Rhyticeros cassidix	calau-grande-de-celebes
Rhabdotorrhinus waldeni	calau-de-panay
Rhabdotorrhinus leucocephalus	calau-de-mindanau
Rhabdotorrhinus exarhatus	calau-pequeno-de-celebes
Rhabdotorrhinus corrugatus	calau-rugoso
Penelopides manillae	calau-pequeno-das-filipinas
Penelopides mindorensis	calau-pequeno-de-mindoro
Penelopides affinis	calau-pequeno-de-mindanau
Penelopides samarensis	calau-pequeno-de-samar
Penelopides panini	calau-pequeno-de-panay

Coraciidae Rolieiros

Os rolieiros são aves de tamanho médio, assemelham-se a corvídeos na estrutura, aliás o nome genérico *Coracias* deriva do grego *korax* e deverá referir-se a um tipo de corvídeo. Apresentam plumagens com cores vivas, onde predominam os azuis intensos, os castanhos e os rosados. Todas as espécies nidificam em cavidades. O nome comum rolieiro está relacionado com o facto de algumas destas espécies fazerem acrobacias aéreas.

Espécies: 13

Distribuição: Europa, África, Ásia e Oceânia



Figura 157 - rolieiro-indiano *Coracias benghalensis*

(Foto: Alan Stringer - Índia)

Coracias naevius	rolieiro-de-sobrancelhas-brancas
Coracias benghalensis	rolieiro-indiano
Coracias affinis	rolieiro-indochinês
Coracias temminckii	rolieiro-d'asa-púrpura

Coracias spatulatus	rolieiro-de-raquetes
Coracias caudatus	rolieiro-de-peito-lilás
Coracias abyssinicus	rolieiro-abissínio
Coracias garrulus	rolieiro-europeu
Coracias cyanogaster	rolieiro-de-barriga-azul
Eurystomus gularis	rolieiro-de-garganta-azul
Eurystomus glaucurus	rolieiro-de-bico-amarelo
Eurystomus orientalis	rolieiro-oriental
Eurystomus azureus	rolieiro-das-molucas



Figura 158 - rolieiro-europeu *Coracias garrulus*

(Foto: José Freitas – Portugal)

Brachypteraciidae Rolieiros-terrestres

Esta família endémica de Madagáscar compreende cinco espécies. São aves não migradoras, do tamanho de corvídeos e aparentadas aos rolieiros, pertencendo, tal como estes, à ordem Coraciiformes. São na sua maioria aves florestais, que se alimentam de invertebrados e de pequenos répteis. Quatro das cinco espécies encontram-se ameaçadas, devido à sua distribuição restrita e à destruição de habitat.

Espécies: 5

Distribuição: Madagáscar

Brachypteracias leptosomus	rolieiro-terrestre-de-patas-curtas
Geobiastes squamiger	rolieiro-terrestre-escamoso
Atelornis pittoides	rolieiro-terrestre-de-cabeça-azul
Atelornis crossleyi	rolieiro-terrestre-de-cabeça-ruiva
Uratelornis chimaera	rolieiro-terrestre-rabilongo



Figura 159 - rolieiro-terrestre-rabilongo *Uratelornis chimaera*

(Foto: Francis Argyle – Madagáscar)

Alcedinidae Guarda-rios e Cucaburras

A maioria dos guarda-rios, como o nome indica, podem ser encontrados a "patrulhar" zonas húmidas e cursos de água pelo mundo fora, em busca de peixe, que é capturado em mergulho, com o seu grande bico em forma de lança. No entanto, várias espécies de guarda-rios e os cucaburras da Austrália são na verdade aves inteiramente terrestres, de ambientes florestais, onde usam o seu bico para capturar presas animais. As aves desta família nidificam em cavidades nas árvores ou buracos no solo.

Espécies: 117

Distribuição: Cosmopolita, excepto Antárctida e parte das regiões boreais

Actenoides monachus	guarda-rios-monge
Actenoides princeps	guarda-rios-escamado
Actenoides bougainvillei	guarda-rios-de-bigodes
Actenoides lindsayi	guarda-rios-mosqueado
Actenoides hombroni	guarda-rios-de-mindanau
Actenoides concretus	guarda-rios-de-colar-ruivo
Melidora macrorrhina	guarda-rios-bico-de-gancho
Lacedo pulchella	guarda-rios-bonito
Tanysiptera galatea	guarda-rios-comum-do-paraíso
Tanysiptera ellioti	guarda-rios-do-paraíso-de-kofiau
Tanysiptera riedelii	guarda-rios-do-paraíso-de-biak
Tanysiptera carolinae	guarda-rios-do-paraíso-de-numfor
Tanysiptera hydrocharis	guarda-rios-pequeno-do-paraíso
Tanysiptera sylvia	guarda-rios-do-paraíso-de-peito-creme
Tanysiptera nigriceps	guarda-rios-do-paraíso-de-cabeça-preta
Tanysiptera nympha	guarda-rios-ninfa-do-paraíso
Tanysiptera danae	guarda-rios-do-paraíso-de-cabeça-castanha
Cittura cyanotis	guarda-rios-lilás
Cittura sanghirensis	guarda-rios-de-sangihe
Dacelo rex	cucaburra-bico-de-pá
Dacelo tyro	cucaburra-escamosa
Dacelo gaudichaud	cucaburra-de-barriga-ruiva
Dacelo novaeguineae	cucaburra-risonha
Dacelo leachii	cucaburra-d'asa-azul
Caridonax fulgidus	guarda-rios-d'uropígio-branco
Pelargopsis capensis	guarda-rios-bico-de-cegonha
Pelargopsis melanorhyncha	guarda-rios-de-bico-grande
Pelargopsis amauroptera	guarda-rios-d'asas-castanhas
Halcyon coromanda	guarda-rios-avermelhado
Halcyon smyrnensis	guarda-rios-de-peito-branco



Figura 160 - cucaburra-risonha *Dacelo novaeguineae*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Halcyon gularis	guarda-rios-de-peito-castanho
Halcyon cyanoventris	guarda-rios-javanês
Halcyon badia	guarda-rios-de-dorso-castanho
Halcyon pileata	guarda-rios-de-touca-preta
Halcyon leucocephala	guarda-rios-de-cabeça-cinzenta
Halcyon albiventris	guarda-rios-de-cabeça-castanha
Halcyon chelicuti	guarda-rios-estriado
Halcyon malimbica	guarda-rios-de-peito-azul
Halcyon senegalensis	guarda-rios-dos-bosques
Halcyon senegaloides	guarda-rios-dos-mangais
Todiramphus nigrocyaneus	guarda-rios-índigo
Todiramphus winchelli	guarda-rios-de-loros-ruivos
Todiramphus diops	guarda-rios-azul-e-branco
Todiramphus lazuli	guarda-rios-lazúli
Todiramphus macleayii	guarda-rios-da-floresta
Todiramphus albonotatus	guarda-rios-de-manto-branco
Todiramphus leucopygius	guarda-rios-ultramarino
Todiramphus farquhari	guarda-rios-de-vanuatu
Todiramphus funebris	guarda-rios-fúnebre

Todiramphus chloris	guarda-rios-de-colar-branco
Todiramphus sordidus	guarda-rios-de-loros-brancos
Todiramphus colonus	guarda-rios-das-luisíadas
Todiramphus albicilla	guarda-rios-das-marianas
Todiramphus tristrami	guarda-rios-melanésio
Todiramphus sacer	guarda-rios-do-pacífico
Todiramphus enigma	guarda-rios-das-talaud
Todiramphus cinnamominus	guarda-rios-de-guam
Todiramphus pelewensis	guarda-rios-de-palau
Todiramphus reichenbachii	guarda-rios-de-ponapé
Todiramphus saurophagus	guarda-rios-das-praias
Todiramphus sanctus	guarda-rios-sagrado
Todiramphus recurvirostris	guarda-rios-de-samoa
Todiramphus australasia	guarda-rios-canela
Todiramphus tutus	guarda-rios-de-borabora
Todiramphus ruficollaris	guarda-rios-de-mangaia
Todiramphus veneratus	guarda-rios-do-taiti
Todiramphus gambieri	guarda-rios-de-mangareva
Todiramphus godeffroyi	guarda-rios-das-marquesas
Todiramphus pyrrhopygius	guarda-rios-de-dorso-ruivo
Syma torotoro	guarda-rios-de-bico-amarelo
Syma megarhyncha	guarda-rios-montês
Ispidina lecontei	guarda-rios-anão
Ispidina picta	guarda-rios-pigmeu-africano



Figura 161 - guarda-rios-de-bico-amarelo *Syma torotoro*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Corythornis madagascariensis	guarda-rios-pigmeu-malgaxe
Corythornis leucogaster	guarda-rios-de-barriga-branca
Corythornis cristatus	guarda-rios-de-poupa
Corythornis vintsioides	guarda-rios-malgaxe
Alcedo coerulescens	guarda-rios-cerúleo
Alcedo peninsulae	guarda-rios-de-gola-azul-malaio
Alcedo euryzona	guarda-rios-de-gola-azul-javanês
Alcedo quadribrachys	guarda-rios-resplandecente
Alcedo meninting	guarda-rios-de-faces-azuis
Alcedo atthis	guarda-rios-comum
Alcedo semitorquata	guarda-rios-cobalto
Alcedo hercules	guarda-rios-hércules
Ceyx erithaca	guarda-rios-pigmeu-de-dorso-preto
Ceyx melanurus	guarda-rios-pigmeu-filipino
Ceyx rufidorsa	guarda-rios-pigmeu-de-dorso-ruivo
Ceyx sangirensis	guarda-rios-pigmeu-de-sangihe
Ceyx fallax	guarda-rios-pigmeu-de-celebes
Ceyx lepidus	guarda-rios-pigmeu-das-molucas
Ceyx margarethae	guarda-rios-dimorfo
Ceyx wallacii	guarda-rios-pigmeu-das-sula
Ceyx cajeli	guarda-rios-pigmeu-de-buru
Ceyx solitarius	guarda-rios-pigmeu-da-papua



Figura 162 - guarda-rios-azurite *Ceyx azureus*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Ceyx dispar	guarda-rios-pigmeu-de-manus
Ceyx mulcatus	guarda-rios-pigmeu-da-nova-irlanda
Ceyx sacerdotis	guarda-rios-pigmeu-da-nova-bretanha
Ceyx meeki	guarda-rios-pigmeu-de-santa-isabel
Ceyx collectoris	guarda-rios-pigmeu-da-nova-geórgia
Ceyx nigromaxilla	guarda-rios-pigmeu-de-guadalcanal
Ceyx gentianus	guarda-rios-pigmeu-de-makira
Ceyx cyanopectus	guarda-rios-pigmeu-índigo
Ceyx argentatus	guarda-rios-argênteo-do-sul
Ceyx flumenicola	guarda-rios-argênteo-do-norte
Ceyx azureus	guarda-rios-azurite
Ceyx websteri	guarda-rios-das-bismarck
Ceyx pusillus	guarda-rios-polegarzinho
Chloroceryle aenea	guarda-rios-pigmeu-americano
Chloroceryle inda	guarda-rios-verde-e-ruivo
Chloroceryle americana	guarda-rios-verde
Chloroceryle amazona	guarda-rios-amazónico
Megaceryle lugubris	guarda-rios-pedrês
Megaceryle maxima	guarda-rios-gigante
Megaceryle torquata	guarda-rios-de-barriga-ruiva
Megaceryle alcyon	guarda-rios-cintado
Ceryle rudis	guarda-rios-malhado



Figura 163 - guarda-rios-malhado *Ceryle rudis*

(Foto: Alan Stringer - Índia)

Todidae Tódis

Os tódis são pequenas aves de cores vivas e bico longo e vermelho. Ocorrem principalmente em zonas arborizadas, distribuindo-se por várias ilhas das Caraíbas. Alimentam-se de insectos e nidificam em buracos que escavam em paredes de terra. A existência de fósseis desta família na América do Norte e Europa indica que em tempos a família terá tido uma distribuição muito mais ampla.

Espécies: 5

Distribuição: Caraíbas



Figura 164 - tódi-jamaicano *Todus todus*

(Foto: Dubi Shapiro – Jamaica)

Todus multicolor	tódi-cubano
Todus subulatus	tódi-de-bico-largo
Todus angustirostris	tódi-de-bico-fino
Todus todus	tódi-jamaicano
Todus mexicanus	tódi-porto-riquenho

Momotidae Momotos

Os momotos são aves de média dimensão facilmente identificáveis pelas longas penas da cauda, com a forma de raquetes, que se movimentam de um lado para o outro como o pêndulo de um relógio. Habitam em florestas e nidificam, como muitos outros Coraciiformes, em buracos escavados na terra. A sua alimentação é à base de insectos grandes e pequenos vertebrados.

Espécies: 14

Distribuição: América tropical

Hylomanes momotula	momoto-anão
Aspatha gularis	momoto-de-garganta-azul
Momotus mexicanus	momoto-mexicano
Momotus coeruliceps	momoto-de-coroa-azul
Momotus lessonii	momoto-coroado



Figura 165 - momoto-coroado *Momotus lessonii*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Momotus subrufescens	momoto-gritador
Momotus bahamensis	momoto-de-trinidade
Momotus momota	momoto-amazónico
Momotus aequatorialis	momoto-andino

Baryphthengus martii	momoto-ruivo
Baryphthengus ruficapillus	momoto-de-coroa-ruiva
Electron carinatum	momoto-pequeno
Electron platyrhynchum	momoto-de-bico-largo
Eumomota superciliosa	momoto-de-sobrancelha-azul



Figura 166 - momoto-de-sobrancelha-azul *Eumomota superciliosa*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Meropidae Abelharucos

Os abelharucos destacam-se pela sua plumagem colorida, com a qual embelezam florestas, savanas e outras zonas abertas com algumas árvores. Como o nome indica, têm uma predilecção por abelhas e vespas, que perseguem e caçam em voo. São capazes de remover o ferrão antes de engolir as suas presas. Nidificam colonialmente em buracos no solo ou em paredes de terra, que eles próprios escavam.

Espécies: 31

Distribuição: África, Europa, sul e sudeste asiático e Austrália

Nyctyornis amictus	abelharuco-de-barba-vermelha
Nyctyornis athertoni	abelharuco-de-barba-azul
Meropogon forsteni	abelharuco-de-barba-púrpura
Merops breweri	abelharuco-de-cabeça-preta
Merops muelleri	abelharuco-de-cabeça-azul
Merops mentalis	abelharuco-de-bigodes
Merops gularis	abelharuco-preto
Merops hirundineus	abelharuco-de-cauda-forcada
Merops pusillus	abelharuco-pequeno
Merops variegatus	abelharuco-de-peito-azul
Merops lafresnayii	abelharuco-etíope



Figura 167 - abelharuco-persa *Merops persicus*

(Foto: José Frade – Marrocos)

Merops oreobates	abelharuco-montês
Merops bulocki	abelharuco-de-garganta-vermelha
Merops bullockoides	abelharuco-de-testa-branca
Merops revoilii	abelharuco-somali
Merops albicollis	abelharuco-de-garganta-branca
Merops boehmi	abelharuco-de-böhm
Merops viridissimus	abelharuco-verde-africano
Merops cyanophrys	abelharuco-verde-árabe
Merops orientalis	abelharuco-verde-asiático
Merops persicus	abelharuco-persa
Merops superciliosus	abelharuco-malgaxe
Merops philippinus	abelharuco-de-cauda-azul
Merops ornatus	abelharuco-australiano
Merops viridis	abelharuco-de-garganta-azul
Merops americanus	abelharuco-filipino
Merops leschenaulti	abelharuco-de-cabeça-castanha
Merops apiaster	abelharuco-europeu
Merops malimbicus	abelharuco-rosado
Merops nubicus	abelharuco-núbio
Merops nubicoides	abelharuco-carmim



Figura 168 - abelharuco-núbio *Merops nubicus*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Galbulidae Bicos-d'agulha

Como o nome indica, estas aves florestais possuem um bico longo e aguçado, que utilizam para capturar insectos ágeis e de grande dimensão em voo, como borboletas ou libélulas. São tão especializados neste tipo de presas que conseguem distinguir borboletas tóxicas, com coloração de aviso, de outras espécies que são comestíveis mas mimetizam essa coloração. Escavam o seu ninho em paredes de terra.

Espécies: 18

Distribuição: América tropical

Galbalcyrhynchus leucotis	bico-d'agulha-d'orelhas-brancas
Galbalcyrhynchus purusianus	bico-d'agulha-do-purus
Brachygalba salmoni	bico-d'agulha-de-dorso-escuro
Brachygalba goeringi	bico-d'agulha-pálido
Brachygalba lugubris	bico-d'agulha-castanho
Brachygalba albogularis	bico-d'agulha-de-faces-brancas
Jacamaralcyon tridactyla	bico-d'agulha-tridáctilo
Galbula albirostris	bico-d'agulha-de-bico-amarelo



Figura 169 - bico-d'agulha-de-testa-azulada *Galbula cyanescens*

(Foto: Tom Schultz - Peru)

Galbula cyanicollis	bico-d'agulha-de-faces-azuis
Galbula ruficauda	bico-d'agulha-de-cauda-ruiva
Galbula galbula	bico-d'agulha-de-cauda-verde
Galbula pastazae	bico-d'agulha-acobreado
Galbula tombacea	bico-d'agulha-de-queixo-branco
Galbula cyanescens	bico-d'agulha-de-testa-azulada
Galbula chalcothorax	bico-d'agulha-violáceo
Galbula leucogastra	bico-d'agulha-bronzeado
Galbula dea	bico-d'agulha-do-paraíso
Jacamerops aureus	bico-d'agulha-grande

Bucconidae Barbudos e Barbudinhos americanos

Estas aves assemelham-se aos cucaburras da Austrália, sendo algo cabeçudos, com uma cauda curta e um bico poderoso e em gancho. Caçam presas animais, desde pequenos insectos a pequenos vertebrados, por emboscada a partir de um poiso na floresta. A sua designação deve-se às penas alongadas da face, que se pensa protegerem contra picadas e mordidas das suas presas.

Espécies: 38

Distribuição: América tropical

Notharchus hyperrhynchus	barbudo-de-bico-grosso
Notharchus macrorhynchos	barbudo-guianense
Notharchus swainsoni	barbudo-de-barriga-castanha
Notharchus pectoralis	barbudo-de-peito-preto
Notharchus ordii	barbudo-de-peito-castanho
Notharchus tectus	barbudo-de-sobrancelha
Bucco macrodactylus	barbudo-de-coroa-ruiva
Bucco tamatia	barbudo-pintalgado
Bucco noanamae	barbudo-de-cabeça-cinzenta
Bucco capensis	barbudo-de-colar
Nystalus radiatus	barbudo-barrado
Nystalus chacuru	barbudo-d'orelhas-brancas
Nystalus striolatus	barbudo-estriado-oriental
Nystalus obamai	barbudo-estriado-ocidental
Nystalus maculatus	barbudo-da-caatinga
Nystalus striatipectus	barbudo-do-chaco
Hypnelus ruficollis	barbudo-de-garganta-ruiva
Hypnelus bicinctus	barbudo-de-duplo-colar
Malacoptila striata	barbudo-de-crescente
Malacoptila fusca	barbudo-raiado
Malacoptila semicincta	barbudo-de-nuca-laranja
Malacoptila fulvogularis	barbudo-de-listas-pretas
Malacoptila rufa	barbudo-de-pescoço-ruivo
Malacoptila panamensis	barbudo-panamense
Malacoptila mystacalis	barbudo-de-bigodes-americano
Micromonacha lanceolata	barbudinho-lanceolado
Nonnula rubecula	barbudinho-de-peito-fulvo
Nonnula sclateri	barbudinho-amarelado
Nonnula brunnea	barbudinho-castanho
Nonnula frontalis	barbudinho-canela
Nonnula ruficapilla	barbudinho-coroado
Nonnula amaurocephala	barbudinho-de-cabeça-ruiva
Hapaloptila castanea	barbudo-subtropical



Figura 170 - barbudo-panamense *Malacoptila panamensis*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Monasa atra	barbudo-d'asa-branca
Monasa nigrifrons	barbudo-preto
Monasa morphoeus	barbudo-de-testa-branca
Monasa flavirostris	barbudo-de-bico-amarelo
Chelidoptera tenebrosa	barbudo-andorinha

Capitonidae Capitães

Os capitães são aves coloridas da dimensão de um pardal, que frequentam a copa de florestas tropicais. O seu bico relativamente forte é útil para uma dieta à base tanto de frutas como de insectos. Pertencem à ordem dos Piciformes, tal como os pica-paus, e assim como estes são capazes de escavar cavidades nas árvores para construírem o seu ninho.

Espécies: 15

Distribuição: metade norte da América do Sul, Panamá e Costa Rica

Capito aurovirens	capitão-de-coroa-escarlate
Capito wallacei	capitão-de-banda-escarlate
Capito fitzpatricki	capitão-de-sira
Capito maculicoronatus	capitão-de-coroa-branca



Figura 171 - capitão-dourado *Capito auratus*

(Foto: Luis Panamá Perugachi - Equador)

Capito squamatus	capitão-de-testa-laranja
Capito hypoleucus	capitão-de-dorso-branco
Capito dayi	capitão-cintado
Capito brunneipectus	capitão-de-peito-castanho
Capito niger	capitão-de-pintas-pretas
Capito auratus	capitão-dourado
Capito quinticolor	capitão-de-cinco-cores
Eubucco richardsoni	capitão-de-garganta-limão
Eubucco bourcierii	capitão-de-cabeça-vermelha
Eubucco tucinkae	capitão-de-capuz-vermelho
Eubucco versicolor	capitão-multicolor



Figura 172 - capitão-de-cabeça-vermelha *Eubucco bourcierii*

(Foto: Luis Panamá Perugachi – Equador)

Semnornithidae — Capitão-tucano e Capitão-de-bico-dentado

Esta família inclui apenas duas espécies, muito semelhantes aos capitães da família anterior em morfologia e hábitos, mas que têm uma origem evolutiva mais antiga, sendo igualmente aparentados dos tucanos. Ambas as espécies habitam em florestas húmidas de montanha e têm áreas de distribuição bastante restritas.

Espécies: 2

Distribuição: Costa Rica, Panamá, Colômbia e Equador



Figura 173 - capitão-tucano *Semnornis ramphastinus*

(Foto: Luis Panamá Perugachi - Equador)

Semnornis frantzii	capitão-de-bico-dentado
Semnornis ramphastinus	capitão-tucano

Ramphastidae Tucanos, Tucaninhos e Araçaris

As aves desta família são consideradas um símbolo das florestas tropicais das Américas, pelo seu grande tamanho, pela plumagem de cores vivas e pelo longo e espesso bico. Este funciona como um radiador, permitindo que os tucanos passem muito tempo expostos ao sol na copa das árvores, sem sobreaquecer. Ocorrem principalmente em florestas, onde se alimentam principalmente de frutas, mas também de crias de outras aves. Nidificam em cavidades nas árvores.

Espécies: 39

Distribuição: América tropical

Aulacorhynchus prasinus	tucaninho-esmeralda
Aulacorhynchus albivitta	tucaninho-de-garganta-branca
Aulacorhynchus atrogularis	tucaninho-de-garganta-preta
Aulacorhynchus huallagae	tucaninho-do-huallaga
Aulacorhynchus coeruleicinctis	tucaninho-de-peito-azul
Aulacorhynchus haematopygus	tucaninho-d'uropígio-vermelho
Aulacorhynchus whitelianus	tucaninho-dos-tepuis
Aulacorhynchus derbianus	tucaninho-verde
Aulacorhynchus sulcatus	tucaninho-de-bico-sulcado
Pteroglossus viridis	araçari-verde
Pteroglossus inscriptus	araçari-de-letras
Pteroglossus bitorquatus	araçari-de-pescoço-vermelho
Pteroglossus azara	araçari-bico-de-marfim
Pteroglossus aracari	araçari-de-pescoço-preto
Pteroglossus castanotis	araçari-de-faces-castanhas
Pteroglossus pluricinctus	araçari-de-cinta-dupla
Pteroglossus torquatus	araçari-de-colar
Pteroglossus erythropygius	araçari-de-bico-pálido
Pteroglossus frantzii	araçari-de-bico-laranja
Pteroglossus beauharnaesii	araçari-de-caracóis
Pteroglossus bailloni	araçari-banana
Selenidera spectabilis	tucaninho-d'orelhas-amarelas
Selenidera piperivora	tucaninho-guianense
Selenidera reinwardtii	tucaninho-de-coleira
Selenidera nattereri	tucaninho-d'orelhas-castanhas
Selenidera gouldii	tucaninho-de-gould
Selenidera maculirostris	tucaninho-de-bico-manchado
Andigena hypoglauca	tucano-montês-de-peito-cinzento
Andigena laminirostris	tucano-montês-de-placas
Andigena cucullata	tucano-montês-de-capuz
Andigena nigrirostris	tucano-montês-de-bico-preto

Ramphastos dicolorus	tucano-bicolor
Ramphastos vitellinus	tucano-de-bico-preto
Ramphastos citreolaemus	tucano-de-peito-citrino
Ramphastos brevis	tucano-do-chocó
Ramphastos sulfuratus	tucano-de-bico-verde



Figura 174 - tucano-de-bico-verde *Ramphastos sulfuratus*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Ramphastos toco	tucano-gigante
Ramphastos tucanus	tucano-de-peito-branco
Ramphastos ambiguus	tucano-de-peito-amarelo

Os barbudos asiáticos são aves florestais, que se alimentam de insectos e frutas, em especial de figos. Regurgitam os caroços das frutas, contribuindo assim para a dispersão de sementes. Em tempos estas aves foram incluídas numa mesma família juntamente com os capitães sul-americanos e os barbaças africanos, mas hoje são considerados uma família distinta. Distribuem-se pela região oriental, com destaque para a península malaia e a Indonésia.

Espécies: 35

Distribuição: Ásia meridional

Psilopogon pyrolophus	barbudo-incandescente
Psilopogon virens	barbudo-grande
Psilopogon lagrandieri	barbudo-de-crisso-vermelho
Psilopogon zeylanicus	barbudo-de-cabeça-castanha
Psilopogon lineatus	barbudo-listado
Psilopogon viridis	barbudo-de-faces-brancas
Psilopogon faiostrictus	barbudo-de-faces-verdes
Psilopogon corvinus	barbudo-de-garganta-castanha
Psilopogon chrysopogon	barbudo-de-faces-douradas
Psilopogon rafflesii	barbudo-de-coroa-vermelha
Psilopogon mystacophanos	barbudo-de-garganta-vermelha
Psilopogon javensis	barbudo-javanês
Psilopogon flavifrons	barbudo-de-testa-amarela
Psilopogon franklinii	barbudo-de-garganta-dourada
Psilopogon auricularis	barbudo-adornado
Psilopogon oorti	barbudo-de-sobrancelhas-pretas
Psilopogon annamensis	barbudo-indochinês
Psilopogon faber	barbudo-chinês
Psilopogon nuchalis	barbudo-da-formosa
Psilopogon asiaticus	barbudo-de-garganta-azul
Psilopogon chersonesus	barbudo-de-garganta-turquesa
Psilopogon monticola	barbudo-montês
Psilopogon incognitus	barbudo-de-bigodes-asiático
Psilopogon henricii	barbudo-de-coroa-amarela
Psilopogon armillaris	barbudo-de-coroa-azul
Psilopogon pulcherrimus	barbudo-de-nuca-dourada
Psilopogon australis	barbudo-de-faces-amarelas
Psilopogon cyanotis	barbudo-de-faces-azuis
Psilopogon duvaucelii	barbudo-de-faces-pretas
Psilopogon eximius	barbudo-do-bornéu
Psilopogon rubricapillus	barbudo-do-ceilão
Psilopogon malabaricus	barbudo-malabar



Figura 175 - barbudo-latoeiro *Psilopogon haemacephalus*

(Foto: Alan Stringer - Myanmar)

Psilopogon haemacephalus	barbudo-latoeiro
Caloramphus fuliginosus	barbudo-castanho-do-bornéu
Caloramphus hayii	barbudo-castanho-malaio

Lybiidae Barbaças e Barbadinhos

Esta família, que integra a ordem dos piciformes, reúne um conjunto de espécies, de aspecto compacto e bico espesso. Em português estas aves são conhecidas pelos nomes de barbaças (espécies maiores) ou barbadinhos (espécies menores). Estes nomes derivam do facto de a maioria das espécies ter pelos junto à base do bico. Estas aves, que frequentam geralmente zonas arborizadas, alimentam-se principalmente de frutos, mas também de insectos.

Espécies: 44

Distribuição: África subsariana

Trachylaemus goffinii	barbaças-de-goffin
Trachylaemus purpuratus	barbaças-de-bico-amarelo
Trachyphonus vaillantii	barbaças-de-poupa
Trachyphonus erythrocephalus	barbaças-de-cabeça-vermelha
Trachyphonus margaritatus	barbaças-de-peito-amarelo
Trachyphonus darnaudii	barbaças-de-d'arnaud
Trachyphonus usambiro	barbaças-massai
Cryptolybia olivacea	barbaças-verde
Gymnobucco bonapartei	barbaças-de-garganta-cinzenta
Gymnobucco sladeni	barbaças-de-sladen
Gymnobucco peli	barbaças-de-cerdas-nasais
Gymnobucco calvus	barbaças-calvo
Stactolaema leucotis	barbaças-d'orelhas-brancas
Stactolaema whytii	barbaças-de-whyte
Stactolaema anchietae	barbaças-de-anchieta
Pogoniulus scolopaceus	barbadinho-malhado
Pogoniulus simplex	barbadinho-verde
Pogoniulus leucomystax	barbadinho-de-bigodes
Pogoniulus coryphaea	barbadinho-de-montanha
Pogoniulus atroflavus	barbadinho-d'uropígio-vermelho
Pogoniulus subsulphureus	barbadinho-de-garganta-amarela
Pogoniulus bilineatus	barbadinho-d'uropígio-amarelo
Pogoniulus uropygialis	barbadinho-abissínio
Pogoniulus pusillus	barbadinho-de-testa-vermelha
Pogoniulus chrysoconus	barbadinho-de-testa-amarela
Buccanodon duchaillui	barbaças-de-manchas-amarelas
Tricholaema hirsuta	barbaças-hirsuto
Tricholaema diademata	barbaças-de-testa-vermelha
Tricholaema frontata	barbaças-do-miombo
Tricholaema leucomelas	barbaças-das-acácias
Tricholaema lacrymosa	barbaças-fúnebre



Figura 176 - barbaças-etíope *Lybius undatus*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Tricholaema melanocephala	barbaças-de-cabeça-preta
Lybius undatus	barbaças-etíope
Lybius vieilloti	barbaças-de-vieillot
Lybius leucocephalus	barbaças-de-cabeça-branca
Lybius chaplini	barbaças-de-chaplin
Lybius rubrifacies	barbaças-de-faces-vermelhas
Lybius guifsobalito	barbaças-de-bico-preto
Lybius torquatus	barbaças-de-colar
Pogonornis melanopterus	barbaças-de-peito-castanho
Pogonornis minor	barbaças-de-dorso-preto
Pogonornis bidentatus	barbaças-bidentado
Pogonornis dubius	barbaças-de-peito-vermelho
Pogonornis rolleti	barbaças-de-peito-preto

Indicatoridae Indicadores

Os indicadores são parentes próximos dos pica-paus. Têm uma plumagem composta por cores discretas. O nome destas aves deriva do curioso hábito que uma ou duas espécies desenvolveram de 'indicar' aos humanos a localização das colmeias – uma vez aberta a colónia e retirado o mel, as aves alimentam-se das larvas e da cera remanescente, sendo aliás das poucas aves que consomem cera de abelha. Também se alimentam de insectos e mel.

Espécies: 16

Distribuição: África subsariana e Ásia

Prodotiscus insignis	indicador-de-cassin
Prodotiscus zambesiae	indicador-de-dorso-verde
Prodotiscus regulus	indicador-de-dorso-castanho
Melignomon zenkeri	indicador-de-zenker
Melignomon eisentrauti	indicador-de-patas-amarelas
Indicator pumilio	indicador-anão
Indicator willcocksi	indicador-de-willcocks
Indicator meliphilus	indicador-pálido
Indicator exilis	indicador-pigmeu



Figura 177 - indicador-pequeno *Indicator minor*

(Foto: Liam O'Connor – África do Sul)

Indicator minor	indicador-pequeno
Indicator maculatus	indicador-malhado
Indicator variegatus	indicador-de-garganta-malhada
Indicator xanthonotus	indicador-indiano
Indicator archipelagicus	indicador-malaio
Indicator indicator	indicador-grande
Melichneutes robustus	indicador-cauda-de-lira



Figura 178 - indicador-grande *Indicator indicator*

(Foto: Liam O'Connor – África do Sul)

Picidae Pica-paus

Os pica-paus formam uma vasta família, que inclui também os torcicolos e os chupa-seivas. Têm uma distribuição muito alargada, mas faltam na Australásia, assim como em Madagáscar e nas regiões polares. A maioria das espécies vive em zonas arborizadas e alimenta-se de invertebrados, que procuram sob a casca das árvores. Os pica-paus conseguem produzir sons não vocais martelando na madeira e usam estes sons para comunicar.

Espécies: 239

Distribuição: Europa, África, Ásia e Américas



Figura 179 - torcicolo-eurasiático *Jynx torquilla*

(Foto: José Frade – Espanha)

Jynx torquilla	torcicolo-eurasiático
Jynx ruficollis	torcicolo-de-garganta-vermelha
Picumnus innominatus	pica-pauzinho-asiático
Picumnus aurifrons	pica-pauzinho-amazónico
Picumnus lafresnayi	pica-pauzinho-de-lafresnaye
Picumnus pumilus	pica-pauzinho-do-orinoco
Picumnus exilis	pica-pauzinho-de-testa-dourada
Picumnus sclateri	pica-pauzinho-equatoriano
Picumnus squamulatus	pica-pauzinho-de-escamas-pretas

Picumnus spilogaster	pica-pauzinho-de-barriga-branca
Picumnus minutissimus	pica-pauzinho-guianense
Picumnus pygmaeus	pica-pauzinho-pintalgado
Picumnus steindachneri	pica-pauzinho-do-huallaga
Picumnus varzeae	pica-pauzinho-da-várzea
Picumnus cirratus	pica-pauzinho-barrado
Picumnus dorbignyanus	pica-pauzinho-ocelado
Picumnus temminckii	pica-pauzinho-de-faces-ocres
Picumnus albosquamatus	pica-pauzinho-de-escamas-brancas
Picumnus fuscus	pica-pauzinho-de-faces-castanhas
Picumnus rufiventris	pica-pauzinho-ruivo
Picumnus limae	pica-pauzinho-cearense
Picumnus nebulosus	pica-pauzinho-meridional
Picumnus castelnau	pica-pauzinho-de-peito-liso
Picumnus subtilis	pica-pauzinho-de-cuzco
Picumnus olivaceus	pica-pauzinho-oliváceo



Figura 180 – pica-pauzinho-oliváceo *Picumnus olivaceus*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Picumnus granadensis	pica-pauzinho-colombiano
Picumnus cinnamomeus	pica-pauzinho-canela
Verreauxia africana	pica-pau-pigmeu-africano
Sasia abnormis	pica-pau-pigmeu-ruivo
Sasia ochracea	pica-pau-pigmeu-de-sobrancelha-branca
Nesoctites micromegas	pica-pau-anão-das-antilhas

Hemicircus concretus	pica-pau-atarracado
Hemicircus canente	pica-pau-canente
Melanerpes candidus	pica-pau-branco
Melanerpes lewis	pica-pau-de-lewis
Melanerpes herminieri	pica-pau-de-guadalupe
Melanerpes portoricensis	pica-pau-porto-riquenho
Melanerpes erythrocephalus	pica-pau-de-cabeça-vermelha



Figura 181 - pica-pau-de-cabeça-vermelha *Melanerpes erythrocephalus*

(Foto: Paul Bourdin – E.U.A.)

Melanerpes formicivorus	pica-pau-das-bolotas
Melanerpes cruentatus	pica-pau-de-penachos-amarelos
Melanerpes flavifrons	pica-pau-de-testa-amarela
Melanerpes chrysauchen	pica-pau-de-nuca-dourada
Melanerpes pulcher	pica-pau-do-magdalena
Melanerpes pucherani	pica-pau-centro-americano
Melanerpes cactorum	pica-pau-dos-cactos
Melanerpes striatus	pica-pau-dominicano
Melanerpes radiolatus	pica-pau-jamaicano
Melanerpes chrysogenys	pica-pau-de-faces-amarelas
Melanerpes hypopolius	pica-pau-do-balsas
Melanerpes pygmaeus	pica-pau-do-iucatão

Melanerpes rubricapillus	pica-pau-de-coroa-vermelha
Melanerpes uropygialis	pica-pau-do-deserto
Melanerpes hoffmannii	pica-pau-de-hoffmann
Melanerpes aurifrons	pica-pau-de-testa-dourada
Melanerpes carolinus	pica-pau-carolino
Melanerpes superciliaris	pica-pau-das-antilhas
Sphyrapicus thyroideus	chupa-seiva-preto
Sphyrapicus varius	chupa-seiva-de-barriga-amarela
Sphyrapicus nuchalis	chupa-seiva-de-nuca-vermelha
Sphyrapicus ruber	chupa-seiva-de-peito-ruivo
Xiphidiopicus percussus	pica-pau-verde-cubano
Pardipicus nivosus	pica-pau-das-térmitas
Pardipicus caroli	pica-pau-d'orelhas-castanhas
Geocolaptes olivaceus	pica-pau-terrestre
Campethera punctuligera	pica-pau-ponteado
Campethera bennettii	pica-pau-de-bennett
Campethera scriptoricauda	pica-pau-tanzaniano
Campethera nubica	pica-pau-núbio



Figura 182 - pica-pau-núbio *Campethera nubica*

(Foto: Chege wa Kariuki - Quénia)

Campethera abingoni	pica-pau-de-cauda-dourada
Campethera mombassica	pica-pau-de-mombaça
Campethera notata	pica-pau-de-knysna
Campethera maculosa	pica-pau-de-costas-douradas

Campethera tullbergi	pica-pau-de-tullberg
Campethera taeniolaema	pica-pau-zebrado
Yungipicus temminckii	pica-pau-de-celebes
Yungipicus nanus	pica-pau-de-touca-castanha
Yungipicus canicapillus	pica-pau-de-barrete-cinzento
Yungipicus maculatus	pica-pau-pequeno-filipino
Yungipicus ramsayi	pica-pau-das-sulu
Yungipicus moluccensis	pica-pau-das-sundas
Yungipicus kizuki	pica-pau-kizuki
Picoides tridactylus	pica-pau-tridáctilo
Picoides dorsalis	pica-pau-de-dorso-barrado
Picoides arcticus	pica-pau-de-dorso-preto
Dendrocoptes dorae	pica-pau-árabe
Dendrocoptes auriceps	pica-pau-de-testa-castanha
Dendrocoptes medius	pica-pau-médio
Leiopicus mahrattensis	pica-pau-marata
Chloropicus namaquus	pica-pau-de-bigodes
Chloropicus xantholophus	pica-pau-de-crista-amarela
Chloropicus pyrrhogaster	pica-pau-ventre-de-fogo
Dendropicos elachus	pica-pau-saheliano
Dendropicos poecilolaemus	pica-pau-de-peito-malhado
Dendropicos abyssinicus	pica-pau-abissínio
Dendropicos fuscescens	pica-pau-cardeal
Dendropicos gabonensis	pica-pau-gabonês
Dendropicos lugubris	pica-pau-lúgubre
Dendropicos stierlingi	pica-pau-de-stierling
Dendropicos elliotii	pica-pau-de-elliot
Dendropicos goertae	pica-pau-de-peito-cinzento
Dendropicos spodocephalus	pica-pau-etíope
Dendropicos griseocephalus	pica-pau-de-cabeça-cinzenta
Dendropicos obsoletus	pica-pau-de-dorso-castanho
Dryobates nuttallii	pica-pau-galego-da-califórnia
Dryobates scalaris	pica-pau-galego-mexicano
Dryobates pubescens	pica-pau-galego-americano
Dryobates cathpharius	pica-pau-galego-oriental
Dryobates pernyii	pica-pau-galego-de-colar
Dryobates minor	pica-pau-galego-eurasiático
Veniliornis passerinus	pica-pau-pequeno-sul-americano
Veniliornis frontalis	pica-pau-dos-yungas
Veniliornis spilogaster	pica-pau-de-pintas-brancas
Veniliornis mixtus	pica-pau-axadrezado
Veniliornis lignarius	pica-pau-austral
Veniliornis callonotus	pica-pau-de-dorso-escarlate
Veniliornis dignus	pica-pau-de-barriga-amarela
Veniliornis nigriceps	pica-pau-barrado

Veniliornis sanguineus	pica-pau-sanguíneo
Veniliornis kirkii	pica-pau-d'uropígio-vermelho
Veniliornis affinis	pica-pau-de-manchas-vermelhas
Veniliornis chocoensis	pica-pau-do-chocó
Veniliornis cassini	pica-pau-de-colar-dourado
Veniliornis maculifrons	pica-pau-d'orelhas-amarelas
Leuconotopicus borealis	pica-pau-de-faces-brancas
Leuconotopicus fumigatus	pica-pau-pardo
Leuconotopicus arizonae	pica-pau-do-arizona
Leuconotopicus stricklandi	pica-pau-de-strickland
Leuconotopicus villosus	pica-pau-cabeludo
Leuconotopicus albolarvatus	pica-pau-de-cabeça-branca
Dendrocopos hyperythrus	pica-pau-de-barriga-ruiva
Dendrocopos macei	pica-pau-de-peito-fulvo
Dendrocopos analis	pica-pau-de-peito-sardento
Dendrocopos atratus	pica-pau-de-peito-estriado
Dendrocopos darjellensis	pica-pau-de-darjeeling
Dendrocopos himalayensis	pica-pau-dos-himalaias
Dendrocopos assimilis	pica-pau-de-sinde
Dendrocopos syriacus	pica-pau-sírio
Dendrocopos leucopterus	pica-pau-d'asa-branca
Dendrocopos major	pica-pau-malhado
Dendrocopos noguchii	pica-pau-de-okinawa
Dendrocopos leucotos	pica-pau-de-dorso-branco
Piculus simplex	pica-pau-d'asa-ruiva
Piculus callopterus	pica-pau-panamense
Piculus leucolaemus	pica-pau-de-garganta-branca
Piculus litae	pica-pau-de-lita
Piculus flavigula	pica-pau-de-garganta-amarela
Piculus chrysochloros	pica-pau-verde-e-dourado
Piculus aurulentus	pica-pau-de-sobrancelha-amarela
Colaptes rubiginosus	pica-pau-oliváceo
Colaptes aeruginosus	pica-pau-bronzeado
Colaptes auricularis	pica-pau-de-coroa-cinzenta
Colaptes rivolii	pica-pau-de-manto-carmim
Colaptes atricollis	pica-pau-peruano
Colaptes punctigula	pica-pau-de-peito-sarapintado
Colaptes melanochloros	pica-pau-verde-barrado
Colaptes auratus	pica-pau-mosqueado
Colaptes mexicanoides	pica-pau-guatemalteco
Colaptes chrysoides	pica-pau-da-califórnia
Colaptes oceanicus	pica-pau-bermudense
Colaptes fernandinae	pica-pau-cubano
Colaptes pitius	pica-pau-chileno



Figura 183 - pica-pau-andino *Colaptes rupicola*

(Foto: João Pereira - Peru)

Colaptes rupicola	pica-pau-andino
Colaptes campestris	pica-pau-do-campo
Celeus loricatus	pica-pau-canela
Celeus undatus	pica-pau-ondulado
Celeus castaneus	pica-pau-avelã
Celeus elegans	pica-pau-elegante
Celeus lugubris	pica-pau-louro
Celeus flavescens	pica-pau-de-cabeça-amarela
Celeus ochraceus	pica-pau-ocráceo
Celeus flavus	pica-pau-amarelo
Celeus spectabilis	pica-pau-de-cabeça-ruiva
Celeus obrieni	pica-pau-do-parnaíba
Celeus torquatus	pica-pau-de-colar-preto
Celeus galeatus	pica-pau-de-capacete
Dryocopus schulzii	pica-pau-de-faixa-branca
Dryocopus lineatus	pica-pau-listado
Dryocopus pileatus	pica-pau-grande-americano
Dryocopus javensis	pica-pau-de-barriga-branca
Dryocopus hodgei	pica-pau-das-andamão
Dryocopus martius	pica-pau-preto
Campephilus pollens	pica-pau-poderoso
Campephilus splendens	pica-pau-esplêndido
Campephilus haematogaster	pica-pau-de-barriga-vermelha

Campephilus rubricollis	pica-pau-de-pescoço-vermelho
Campephilus robustus	pica-pau-robusto
Campephilus melanoleucos	pica-pau-de-crista-vermelha
Campephilus guatemalensis	pica-pau-de-bico-pálido
Campephilus gayaquilensis	pica-pau-de-guaiaquil
Campephilus leucopogon	pica-pau-de-dorso-creme
Campephilus magellanicus	pica-pau-de-magalhães
Campephilus principalis	pica-pau-de-bico-marfim
Campephilus imperialis	pica-pau-imperial
Chrysophlegma miniaceum	pica-pau-vermelhão
Chrysophlegma mentale	pica-pau-de-garganta-axadrezada
Chrysophlegma flavinucha	pica-pau-grande-de-nuca-amarela
Picus chlorolophus	pica-pau-pequeno-de-nuca-amarela
Picus puniceus	pica-pau-d'asa-carmesim
Picus viridanus	pica-pau-lanceolado
Picus vittatus	pica-pau-rendado
Picus xanthopygaeus	pica-pau-de-garganta-listada
Picus squamatus	pica-pau-escamoso



Figura 184 - pica-pau-incandescente-indiano *Dinopium benghalense*

(Foto: Alan Stringer - Índia)

Picus awokera	pica-pau-japonês
Picus viridis	pica-pau-verde-europeu
Picus sharpei	pica-pau-verde-ibérico
Picus vaillantii	pica-pau-mourisco
Picus rabieri	pica-pau-de-colar-vermelho
Picus erythropygius	pica-pau-de-cabeça-preta
Picus canus	pica-pau-cinzento
Picus dedemi	pica-pau-de-samatra
Dinopium shorii	pica-pau-incandescente-dos-himalaias
Dinopium javanense	pica-pau-incandescente-comum
Dinopium everetti	pica-pau-incandescente-filipino
Dinopium benghalense	pica-pau-incandescente-indiano
Dinopium psarodes	pica-pau-incandescente-vermelho
Chrysocolaptes validus	pica-pau-vigoroso
Chrysocolaptes lucidus	pica-pau-sultão-malhado
Chrysocolaptes haematribon	pica-pau-sultão-de-lução
Chrysocolaptes xanthocephalus	pica-pau-sultão-de-faces-amarelas
Chrysocolaptes erythrocephalus	pica-pau-sultão-de-cabeça-vermelha
Chrysocolaptes strictus	pica-pau-sultão-javanês
Chrysocolaptes guttacristatus	pica-pau-sultão-grande
Chrysocolaptes socialis	pica-pau-sultão-do-malabar
Chrysocolaptes stricklandi	pica-pau-sultão-do-ceilão
Chrysocolaptes festivus	pica-pau-sultão-de-dorso-branco
Gecinulus grantia	pica-pau-do-bambu-nortenho
Gecinulus viridis	pica-pau-do-bambu-meridional
Gecinulus rafflesii	pica-pau-incandescente-de-raffles
Blythipicus rubiginosus	pica-pau-bordô
Blythipicus pyrrhotis	pica-pau-d'orelhas-vermelhas
Micropternus brachyurus	pica-pau-ferrugíneo
Meiglyptes grammithorax	pica-pau-d'uropígio-bege
Meiglyptes tristis	pica-pau-triste
Meiglyptes jugularis	pica-pau-dominó
Meiglyptes tukki	pica-pau-tukik
Mulleripicus fulvus	pica-pau-fuliginoso-de-celebes
Mulleripicus funebris	pica-pau-filipino-nortenho
Mulleripicus fuliginosus	pica-pau-filipino-meridional
Mulleripicus pulverulentus	pica-pau-ardósia

Com as suas pernas altas e plumas compridas na face, estas espécies parecem ser o equivalente do secretário nas savanas e florestas secas da América do Sul. Sabe-se agora que são parentes próximos dos falcões. Tal como o secretário, as seriemas alimentam-se principalmente de presas animais. Não são excelentes voadoras, preferindo correr. Constroem um ninho volumoso de ramos no alto de arbustos ou pequenas árvores.

Espécies: 2

Distribuição: parte central da América do Sul



Figura 185 - seriema-de-patas-vermelhas *Cariama cristata*

(Foto: Tiago Guerreiro – Brasil)

Cariama cristata	seriema-de-patas-vermelhas
Chunga burmeisteri	seriema-de-patas-pretas

Os falcões e caracaras pertencem a uma linhagem evolutiva muito distante das restantes aves de rapina. Os falcões são aves de asas e cauda longas e voo ágil, que usam para perseguir e caçar variadas presas animais. Aqui se inclui o animal mais rápido do mundo, o falcão-peregrino, que consegue alcançar mais de 320 km/h em voo picado. As caracaras das Américas distinguem-se pelas asas mais arredondadas e pele nua na cabeça, sendo também mais omnívoras na sua dieta.

Espécies: 65

Distribuição: cosmopolita, excepto Antárctida

Spiziapteryx circumcincta	falcão-pigmeu-do-chaco
Caracara lutosa	caracara-de-guadalupe
Caracara plancus	caracara-de-crista
Ibycter americanus	caracara-vespeiro
Daptrius ater	caracara-preto
Daptrius chimachima	caracara-de-cabeça-amarela
Daptrius chimango	caracara-unicolor
Daptrius australis	caracara-austral
Daptrius carunculatus	caracara-do-páramo
Daptrius megalopterus	caracara-andino



Figura 186 - caracara-de-cabeça-amarela *Daptrius chimachima*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Daptrius albogularis	caracara-de-garganta-branca
Herpetotheres cachinnans	falcão-risonho
Micrastur ruficollis	falcão-de-pescoço-castanho
Micrastur plumbeus	falcão-plúmbeo
Micrastur gilvicollis	falcão-amazónico
Micrastur mintoni	falcão-críptico
Micrastur mirandollei	falcão-de-dorso-cinzento
Micrastur semitorquatus	falcão-de-coleira-interrompida
Micrastur buckleyi	falcão-de-buckley
Polihierax semitorquatus	falcão-pigmeu-africano
Microhierax caerulescens	falconete-de-colar
Microhierax fringillarius	falconete-de-coxas-pretas
Microhierax latifrons	falconete-de-testa-branca
Microhierax erythrogenys	falconete-filipino
Microhierax melanoleucos	falconete-alvinegro
Neohierax insignis	falcão-pigmeu-asiático
Falco naumanni	peneireiro-das-torres
Falco tinnunculus	peneireiro-de-dorso-malhado
Falco rupicolus	peneireiro-africano
Falco newtoni	peneireiro-malgaxe
Falco punctatus	peneireiro-das-maurícias
Falco duboisi	peneireiro-da-reunião
Falco araeus	peneireiro-das-seicheles
Falco moluccensis	peneireiro-das-molucas
Falco cenchroides	peneireiro-australiano
Falco sparverius	peneireiro-americano
Falco rupicoloides	peneireiro-d'olho-branco
Falco alopex	peneireiro-vulpino
Falco ardosiaceus	peneireiro-ardósia
Falco dickinsoni	peneireiro-de-dickinson
Falco zoniventris	peneireiro-listado
Falco chicquera	falcão-de-nuca-vermelha
Falco vespertinus	falcão-de-pés-vermelhos
Falco amurensis	falcão-do-amur
Falco eleonorae	falcão-da-rainha
Falco concolor	falcão-sombrio
Falco femoralis	falcão-de-colete
Falco columbarius	esmerilhão
Falco rufigularis	falcão-morcegueiro
Falco deiroleucus	falcão-de-peito-laranja
Falco subbuteo	ógea-eurasiática
Falco cuvierii	ógea-africana
Falco severus	ógea-oriental
Falco longipennis	ógea-australiana
Falco novaeseelandiae	falcão-maori
Falco berigora	falcão-berigora
Falco hypoleucos	falcão-cinzento
Falco subniger	falcão-preto

Falco biarmicus	falcão-lanário
Falco jugger	falcão-caçador



Figura 187 - falcão-caçador *Falco jugger*

(Foto: Lars Petersson – Índia)

Falco cherrug	falcão-sacre
Falco rusticolus	falcão-gerifalte
Falco mexicanus	falcão-das-pradarias
Falco peregrinus	falcão-peregrino
Falco fasciinucha	falcão-taita

Estes papagaios, todos eles com nomes da língua maori da Nova Zelândia, partilham entre si o facto de estarem fortemente ameaçados, devido a predação por mamíferos introduzidos nestas ilhas. O seu principal habitat é a floresta nativa, embora a kea ocorra em regiões alpinas na ilha do sul. São omnívoros, à excepção do kakapo, que se alimenta apenas de material vegetal. A kea é capaz de utilizar ferramentas e conhecida pela sua inteligência.

Espécies: 4

Distribuição: Nova Zelândia (e uma espécie extinta na ilha de Norfolk)



Figura 188 - kea *Nestor notabilis*

(Foto: Jessica Stringer – Nova Zelândia)

Strigops habroptilus	kakapo
Nestor notabilis	kea
Nestor meridionalis	kaká-neozelandês
Nestor productus	kaká-de-norfolk

As catatuas são bem conhecidas como animais domésticos, mas na sua região de origem são uma presença constante em muitos tipos de habitats, incluindo zonas urbanas. Alimentam-se de frutos e sementes, razão pela qual são consideradas pragas agrícolas em certas regiões. Nidificam em cavidades, mas não são capazes de as escavar, dependendo de árvores nativas onde estas se formam naturalmente, já que não existem pica-paus na região.

Espécies: 22

Distribuição: Austrália, Papua e ilhas orientais do arquipélago indo-malaio

Zanda funerea	catatua-preta-de-cauda-amarela
Zanda baudinii	catatua-preta-de-bico-comprido
Zanda latirostris	catatua-preta-de-bico-curto
Calyptorhynchus banksii	catatua-preta-de-cauda-vermelha
Calyptorhynchus lathami	catatua-preta-lustrosa
Nymphicus hollandicus	caturra
Probosciger aterrimus	catatua-das-palmeiras
Callocephalon fimbriatum	catatua-gang-gang



Figura 189 - catatua-gang-gang *Callocephalon fimbriatum*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Eolophus roseicapilla	catatua-galah
Cacatua leadbeateri	catatua-rosada
Cacatua haematuropygia	catatua-filipina
Cacatua goffiniana	catatua-das-tanimbar
Cacatua ducorpsii	catatua-das-salomão
Cacatua pastinator	catatua-ocidental
Cacatua sanguinea	catatua-sanguínea
Cacatua tenuirostris	catatua-de-bico-longo
Cacatua alba	catatua-branca
Cacatua ophthalmica	catatua-d'olho-azul
Cacatua moluccensis	catatua-das-molucas
Cacatua sulphurea	catatua-pequena-de-crista-amarela
Cacatua citrinocristata	catatua-de-crista-laranja
Cacatua galerita	catatua-grande-de-crista-amarela



Figura 190 - catatua-rosada *Cacatua leadbeateri*

(Foto: Alan Stringer – Austrália)

Psittacidae — Papagaios, Periquitos e afins (África e Novo Mundo)

Os papagaios e periquitos das Américas e de África são espécies móveis, sociais e bastante ruidosas, que nidificam em cavidades, tal como os seus primos da família *Psittaculidae*. A maioria tem uma coloração verde, que lhes permite camuflarem-se nos ambientes florestais que ocupam. São principalmente granívoros e frugívoros. Algumas espécies reúnem-se para consumir argila de paredes de terra, que se pensa neutralizar toxinas vegetais ingeridas durante a alimentação.

Espécies: 181

Distribuição: América do Sul e Central, África subsariana

Psittacus erithacus	papagaio-cinzento
Psittacus timneh	papagaio-timneh
Poicephalus gulielmi	papagaio-de-testa-vermelha
Poicephalus flavifrons	papagaio-de-faces-amarelas
Poicephalus fuscicollis	papagaio-de-pescoço-castanho
Poicephalus robustus	papagaio-do-cabo
Poicephalus meyeri	papagaio-de-meyer



Figura 191 - papagaio-de-barriga-ruiva *Poicephalus rufiventris*

(Foto: Gonçalo Elias – Etiópia)

Poicephalus rueppellii	papagaio-de-rüppell
Poicephalus cryptoxanthus	papagaio-de-cabeça-castanha
Poicephalus crassus	papagaio-de-niamniam
Poicephalus senegalus	papagaio-do-senegal
Poicephalus rufiventris	papagaio-de-barriga-ruiva
Touit batavicus	periquito-de-cauda-lilás
Touit huetii	periquito-d'ombros-vermelhos
Touit costaricensis	periquito-de-testa-vermelha
Touit dilectissimus	periquito-de-testa-azul
Touit purpuratus	periquito-d'uropígio-azul
Touit melanonotus	periquito-de-dorso-castanho
Touit surdus	periquito-de-cauda-dourada
Touit stictopterus	periquito-d'asa-pintalgada
Psilopsiagon aymara	periquito-aimara
Psilopsiagon aurifrons	periquito-andino-pequeno
Bolborhynchus lineola	periquito-barrado
Bolborhynchus ferrugineifrons	periquito-de-loros-ruivos
Bolborhynchus orbygnesius	periquito-andino-grande
Nannopsittaca panychlora	periquito-dos-tepuis
Nannopsittaca dachilleae	periquito-do-manu
Myiopsitta monachus	periquito-monge



Figura 192 - periquito-monge *Myiopsitta monachus*

(Foto: Pedro Nicolau – Espanha)

Myiopsitta luchsi	periquito-das-escarpas
Brotogeris sanctithomae	periquito-de-testa-amarela
Brotogeris tirica	periquito-liso
Brotogeris versicolurus	periquito-d'asa-branca
Brotogeris chiriri	periquito-d'asa-amarela
Brotogeris pyrrhoptera	periquito-de-faces-cinzentas
Brotogeris jugularis	periquito-de-queixo-laranja
Brotogeris cyanoptera	periquito-d'asa-cobalto
Brotogeris chrysoptera	periquito-d'asa-dourada
Pionopsitta pileata	papagaio-de-barrete-ruivo
Triclaria malachitacea	papagaio-de-barriga-azul
Pyrilia haematotis	papagaio-de-cabeça-parda
Pyrilia pyrilia	papagaio-de-cabeça-dourada
Pyrilia pulchra	papagaio-de-faces-rosadas
Pyrilia barrabandi	papagaio-de-faces-laranja
Pyrilia caica	papagaio-de-nuca-dourada
Pyrilia aurantiocephala	papagaio-calvo
Pyrilia vulturina	papagaio-abutre
Hapalopsittaca amazonina	papagaio-ferruginoso
Hapalopsittaca fuertesi	papagaio-d'asa-índigo
Hapalopsittaca pyrrhops	papagaio-equatoriano
Hapalopsittaca melanotis	papagaio-d'asa-preta
Pionus fuscus	papagaio-fusco
Pionus sordidus	papagaio-de-bico-vermelho
Pionus maximiliani	papagaio-de-cabeça-escamosa
Pionus tumultuosus	papagaio-de-faces-manchadas
Pionus seniloides	papagaio-de-barrete-branco
Pionus menstruus	papagaio-de-cabeça-azul
Pionus senilis	papagaio-de-coroa-branca
Pionus chalcopterus	papagaio-d'asa-bronze
Graydidascalus brachyurus	papagaio-de-cauda-curta
Alipiopsitta xanthops	papagaio-do-cerrado
Amazona festiva	papagaio-da-várzea
Amazona vinacea	papagaio-de-peito-roxo
Amazona tucumana	papagaio-de-tucumão
Amazona pretrei	papagaio-d'óculos-vermelhos
Amazona agilis	papagaio-de-bico-preto
Amazona albifrons	papagaio-de-testa-branca
Amazona collaria	papagaio-jamaicano
Amazona leucocephala	papagaio-cubano
Amazona ventralis	papagaio-dominicano
Amazona vittata	papagaio-porto-riquenho
Amazona finschi	papagaio-de-coroa-lilás
Amazona autumnalis	papagaio-de-loros-vermelhos
Amazona lilacina	papagaio-lilás
Amazona diadema	papagaio-diademado
Amazona viridigenalis	papagaio-de-coroa-vermelha
Amazona xantholora	papagaio-do-iucatão



Figura 193 - papagaio-de-testa-branca *Amazona albifrons*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Amazona dufresniana	papagaio-de-faces-azuis
Amazona rhodocorytha	papagaio-de-sobrancelha-vermelha
Amazona arausiaca	papagaio-de-colar-vermelho
Amazona versicolor	papagaio-de-santa-lúcia
Amazona oratrix	papagaio-de-cabeça-amarela
Amazona auropalliata	papagaio-de-nuca-amarela
Amazona ochrocephala	papagaio-de-coroa-amarela
Amazona barbadensis	papagaio-d'ombros-amarelos
Amazona aestiva	papagaio-de-testa-turquesa
Amazona mercenarius	papagaio-de-nuca-escamosa
Amazona farinosa	papagaio-moleiro
Amazona kawalli	papagaio-de-kawall
Amazona imperialis	papagaio-imperial
Amazona brasiliensis	papagaio-de-cauda-vermelha
Amazona amazonica	papagaio-d'asa-laranja
Amazona guildingii	papagaio-de-são-vincente
Forpus modestus	periquito-de-bico-escuro
Forpus cyanopygius	periquito-mexicano
Forpus crassirostris	periquito-ribeirinho
Forpus spengeli	periquito-d'asa-turquesa
Forpus xanthopterygius	periquito-d'asa-azul
Forpus passerinus	periquito-d'uropígio-verde
Forpus conspicillatus	periquito-d'óculos



Figura 194 - periquito-do-pacífico *Forpus coelestis*

(Foto: Paul Bourdin - Equador)

Forpus coelestis	periquito-do-pacífico
Forpus xanthops	periquito-de-cabeça-amarela
Pionites melanocephalus	papagaio-de-barrete-preto
Pionites leucogaster	papagaio-de-barriga-branca
Deroptyus accipitrinus	papagaio-de-leque-vermelho
Pyrrhura cruentata	periquitão-sanguíneo
Pyrrhura devillei	periquitão-asa-de-fogo
Pyrrhura frontalis	periquitão-de-barriga-castanha
Pyrrhura lepida	periquitão-paraense
Pyrrhura perlata	periquitão-de-barriga-vermelha
Pyrrhura molinae	periquitão-de-faces-verdes
Pyrrhura pfrimeri	periquitão-goiano
Pyrrhura griseipectus	periquitão-cearense
Pyrrhura leucotis	periquitão-d'orelhas-brancas
Pyrrhura subandina	periquitão-subandino
Pyrrhura caeruleiceps	periquitão-de-perijá
Pyrrhura picta	periquitão-de-testa-azul
Pyrrhura emma	periquitão-venezuelano
Pyrrhura amazonum	periquitão-de-santarém
Pyrrhura lucianii	periquitão-do-purus
Pyrrhura roseifrons	periquitão-de-testa-rosa
Pyrrhura viridicata	periquitão-de-santa-marta

Pyrrhura egregia	periquitão-dos-tepuis
Pyrrhura melanura	periquitão-de-cauda-castanha
Pyrrhura orcesi	periquitão-de-el-oro
Pyrrhura albipectus	periquitão-de-pescoço-branco
Pyrrhura rupicola	periquitão-de-barrete
Pyrrhura calliptera	periquitão-de-peito-castanho
Pyrrhura hoematotis	periquitão-d'orelhas-vermelhas
Pyrrhura rhodocephala	periquitão-de-cabeça-rosa
Pyrrhura hoffmanni	periquitão-d'asa-amarela
Enicognathus ferrugineus	periquito-austral
Enicognathus leptorhynchus	periquito-de-bico-fino
Cyanoliseus patagonus	periquito-das-barreiras
Anodorhynchus hyacinthinus	arara-azul
Anodorhynchus leari	arara-índigo
Anodorhynchus glaucus	arara-glauca
Rhynchopsitta pachyrhyncha	papagaio-de-bico-grosso
Rhynchopsitta terrisi	papagaio-de-testa-castanha
Eupsittula nana	periquito-jamaicano
Eupsittula canicularis	periquito-de-testa-laranja
Eupsittula aurea	periquito-de-testa-dourada
Eupsittula pertinax	periquito-de-garganta-castanha
Eupsittula cactorum	periquito-dos-cactos
Conuropsis carolinensis	periquito-carolino
Aratinga weddellii	periquitão-de-cabeça-fusca
Aratinga nenday	periquitão-de-cabeça-preta
Aratinga solstitialis	**periquitão-sol**
Aratinga maculata	periquitão-de-peito-amarelo
Aratinga jandaya	periquitão-nordestino
Aratinga auricapillus	periquitão-de-testa-vermelha
Cyanopsitta spixii	arara-de-spix
Orthopsittaca manilatus	arara-de-barriga-ruiva
Primolius couloni	arara-de-cabeça-azul
Primolius auricollis	arara-de-colar-dourado
Primolius maracana	arara-d'asa-azul
Ara ararauna	arara-azul-e-amarela
Ara glaucogularis	arara-de-garganta-azul
Ara severus	arara-de-testa-castanha
Ara rubrogenys	arara-de-testa-vermelha
Ara tricolor	arara-cubana
Ara militaris	arara-militar
Ara ambiguus	arara-verde
Ara macao	arara-escarlate
Ara chloropterus	arara-verde-e-vermelha
Leptosittaca branickii	periquitão-de-lista-dourada
Ognorhynchus icterotis	periquitão-d'orelhas-amarelas
Guaruba guarouba	periquitão-dourado
Diopsittaca nobilis	arara-d'ombros-vermelhos
Thectocercus acuticaudatus	periquitão-de-cabeça-azul



Figura 195 - arara-escarlate *Ara macao*

(Foto: José Frade – Costa Rica)

Psittacara holochlorus	periquitão-verde
Psittacara brevipes	periquitão-de-socorro
Psittacara strenuus	periquitão-do-pacífico
Psittacara wagleri	periquitão-de-testa-escarlate
Psittacara frontatus	periquitão-das-cordilheiras
Psittacara mitratus	periquitão-mitrado
Psittacara erythrogenys	periquitão-de-máscara-vermelha
Psittacara finschi	periquitão-de-testa-carmim
Psittacara leucophthalmus	periquitão-d'olho-branco
Psittacara euops	periquitão-cubano
Psittacara chloropterus	periquitão-dominicano
Psittacara maugei	periquitão-porto-riquenho

Psittaculidae — Papagaios, Periquitos e afins (Velho Mundo)

Esta família contém a maioria dos papagaios e periquitos do Velho Mundo, incluindo os inseparáveis de África e uma grande diversidade de espécies da Oceânia. Nidificam em cavidades nas árvores e por isso frequentam zonas florestais ou pelo menos com árvores dispersas. Tal como na família anterior, são frugívoros e granívoros, mas algumas espécies têm adaptações únicas para se alimentar de néctar e pólen (os lóris) ou de invertebrados na casca de árvores (os papagaios-pigmeus).

Espécies: 202

Distribuição: África subsariana, Madagáscar, Ásia tropical e Oceânia

Psittrichas fulgidus	papagaio-urubu
Mascarinus mascarinus	papagaio-das-mascarenhas
Coracopsis vasa	papagaio-vasa
Coracopsis nigra	papagaio-preto
Coracopsis sibilans	papagaio-comorense
Coracopsis barklyi	papagaio-das-seicheles
Micropsitta keiensis	papagaio-pigmeu-de-touca-amarela
Micropsitta geelvinkiana	papagaio-pigmeu-de-geelvink
Micropsitta pusio	papagaio-pigmeu-de-faces-fulvas
Micropsitta meeki	papagaio-pigmeu-de-meek
Micropsitta finschii	papagaio-pigmeu-de-finsch
Micropsitta bruijnii	papagaio-pigmeu-de-peito-vermelho
Polytelis swainsonii	periquito-soberbo
Polytelis anthopeplus	periquito-regente
Polytelis alexandrae	periquito-princesa
Alisterus amboinensis	papagaio-rei-das-molucas
Alisterus chloropterus	papagaio-rei-da-papua
Alisterus scapularis	papagaio-rei-australiano
Aprosmictus jonquillaceus	papagaio-timorense
Aprosmictus erythropterus	papagaio-d'asa-vermelha
Prioniturus mada	periquito-raquete-de-buru
Prioniturus platurus	periquito-raquete-de-dorso-dourado
Prioniturus waterstradti	periquito-raquete-de-mindanau
Prioniturus montanus	periquito-raquete-montês
Prioniturus platenae	periquito-raquete-de-palawan
Prioniturus mindorensis	periquito-raquete-de-mindoro
Prioniturus verticalis	periquito-raquete-das-sulu
Prioniturus flavicans	periquito-raquete-de-peito-amarelo
Prioniturus luconensis	periquito-raquete-de-lução
Prioniturus discurus	periquito-raquete-de-coroa-azul
Eclectus roratus	papagaio-ecléctico- das-molucas

Eclectus cornelia	papagaio-ecléctico-de-sumba
Eclectus riedeli	papagaio-ecléctico-das-tanimbar
Eclectus polychloros	papagaio-ecléctico-da-papua
Eclectus infectus	papagaio-ecléctico-oceânico
Geoffroyus geoffroyi	papagaio-de-faces-vermelhas
Geoffroyus simplex	papagaio-de-colar-azul
Geoffroyus heteroclitus	papagaio-cantor
Psittinus cyanurus	papagaio-d'uropígio-azul
Psittinus abbotti	papagaio-de-simeulue
Tanygnathus megalorynchos	papagaio-de-bico-grande
Tanygnathus lucionensis	papagaio-de-nuca-azul
Tanygnathus everetti	papagaio-de-everett
Tanygnathus sumatranus	papagaio-de-dorso-azul
Tanygnathus gramineus	papagaio-de-buru
Psittacula finschii	periquito-de-cabeça-cinzenta
Psittacula himalayana	periquito-dos-himalaias
Psittacula roseata	periquito-de-cabeça-rosa
Psittacula cyanocephala	periquito-cabeça-de-ameixa



Figura 196 - periquito-cabeça-de-ameixa *Psittacula cyanocephala*

(Foto: Luís Custódia – Índia)

Psittacula alexandri	periquito-de-bigode
Psittacula derbiana	periquito-de-derby
Psittacula longicauda	periquito-rabilongo
Psittacula columboides	periquito-malabar
Psittacula calthrapae	periquito-do-ceilão

Psittacula eupatria	periquito-alexandrino
Psittacula wardi	periquito-das-seicheles
Psittacula krameri	periquito-de-colar
Psittacula eques	periquito-das-maurícias
Psittacula exsul	periquito-de-rodrigues
Psittacula caniceps	periquito-de-nicobar
Psittacula bensoni	periquito-das-mascarenhas
Psittacella brehmii	papagaio-tigre-de-brehm
Psittacella picta	papagaio-tigre-pintado
Psittacella modesta	papagaio-tigre-modesto
Psittacella madaraszi	papagaio-tigre-de-madarasz
Psephotus haematonotus	periquito-d'uropígio-vermelho
Northiella haematogaster	periquito-de-máscara-azul
Northiella narethae	periquito-de-naretha
Psephotellus varius	periquito-das-acácias
Psephotellus dissimilis	periquito-encapuzado
Psephotellus chrysopterygius	periquito-d'ombros-dourados
Psephotellus pulcherrimus	periquito-do-paraíso
Purpureicephalus spurius	periquito-de-barrete-vermelho
Platycercus caledonicus	rosela-verde



Figura 197 - rosela-elegante *Platycercus elegans*

(Foto: Morton Spoon - Austrália)

Platycercus elegans	rosela-elegante
Platycercus venustus	rosela-do-norte
Platycercus adscitus	rosela-de-cabeça-pálida

Platycercus eximius	rosela-oriental
Platycercus icterotis	rosela-ocidental
Barnardius zonarius	periquito-de-barnard
Lathamus discolor	periquito-migrador
Prosopeia splendens	papagaio-escarlate
Prosopeia personata	papagaio-mascarado
Prosopeia tabuensis	papagaio-granate
Eunymphicus cornutus	periquito-cornudo
Eunymphicus uvaeensis	periquito-de-ouvea
Cyanoramphus saisseti	periquito-da-nova-caledónia
Cyanoramphus cookii	periquito-de-norfolk
Cyanoramphus subflavescens	periquito-de-lord-howe
Cyanoramphus forbesi	periquito-das-chatham
Cyanoramphus unicolor	periquito-das-antípodas
Cyanoramphus malherbi	kakariki-de-testa-laranja
Cyanoramphus hochstetteri	periquito-de-reischek
Cyanoramphus auriceps	kakariki-de-testa-amarela
Cyanoramphus novaezelandiae	kakariki-de-testa-vermelha
Cyanoramphus zealandicus	periquito-de-testa-preta
Cyanoramphus ulietanus	periquito-de-raiatea
Pezoporus wallicus	periquito-terrestre
Pezoporus occidentalis	periquito-nocturno
Neopsephotus bourkii	periquito-rosado
Neophema chrysostoma	periquito-crisóstomo



Figura 198 - periquito-turquesa *Neophema pulchella*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Neophema elegans	periquito-elegante
Neophema petrophila	periquito-das-rochas
Neophema chrysogaster	periquito-de-barriga-laranja
Neophema pulchella	periquito-turquesa
Neophema splendida	periquito-esplêndido
Oreopsittacus arfaki	loriquito-de-faces-floridas
Charminetta wilhelminae	loriquito-pigmeu
Hypocharmosyna rubronotata	loriquito-de-testa-vermelha
Hypocharmosyna placentis	loriquito-de-flancos-vermelhos
Charmosynopsis toxopei	loriquito-de-buru
Charmosynopsis pulchella	loriquito-fada
Synorhacma multistriata	loriquito-estriado
Charmosyna josefinae	loriquito-de-josefina
Charmosyna papou	loriquito-da-papua
Charmosyna stellae	loriquito-de-stella
Charmosynoides margarethae	loriquito-de-margarita
Vini meeki	loriquito-de-meek
Vini rubrigularis	loriquito-de-queixo-vermelho
Vini palmarum	loriquito-das-palmeiras
Vini amabilis	loriquito-de-garganta-vermelha
Vini diadema	loriquito-da-nova-caledónia
Vini solitaria	lóris-das-fiji
Vini australis	loriquito-de-samoa
Vini ultramarina	loriquito-ultramarino
Vini stepheni	loriquito-de-henderson
Vini kuhlii	loriquito-de-rimatara
Vini peruviana	loriquito-azul
Neopsittacus musschenbroekii	loriquito-de-bico-amarelo
Neopsittacus pullicauda	loriquito-de-bico-laranja
Lorius albidinucha	lóris-de-nuca-branca
Lorius chlorocercus	lóris-de-colar-amarelo
Lorius domicella	lóris-de-nuca-púrpura
Lorius garrulus	lóris-tagarela
Lorius hypoinochrous	lóris-de-barriga-púrpura
Lorius lory	lóris-tricolor
Psitteuteles versicolor	loriquito-versicolor
Parvipsitta porphyrocephala	loriquito-de-coroa-púrpura
Parvipsitta pusilla	loriquito-pequeno
Pseudeos fuscata	lóris-sombrio
Pseudeos cardinalis	lóris-cardeal
Chalcopsitta duivenbodei	lóris-castanho
Chalcopsitta atra	lóris-preto
Chalcopsitta scintillata	lóris-listado-amarelo
Glossoptilus goldiei	loriquito-de-goldie
Glossopsitta concinna	loriquito-almiscarado
Saudareos johnstoniae	loriquito-de-mindanau
Saudareos iris	loriquito-íris
Saudareos flavoviridis	loriquito-das-sula

Saudareos meyeri	loriquito-de-celebes
Saudareos ornata	loriquito-ornado



Figura 199 - loriquito-arco-íris *Trichoglossus moluccanus*

(Foto: Alan Stringer - Austrália)

Eos reticulata	lóris-listado-azul
Eos semilarvata	lóris-de-ceram
Eos bornea	lóris-vermelho
Eos cyanogenia	lóris-d'asa-preta
Eos histrio	lóris-vermelho-e-azul
Eos squamata	lóris-de-colar-violeta
Trichoglossus rubiginosus	loriquito-de-ponapé
Trichoglossus chlorolepidotus	loriquito-de-peito-escamoso
Trichoglossus haematodus	loriquito-das-molucas
Trichoglossus rosenbergii	loriquito-de-biak
Trichoglossus moluccanus	loriquito-arco-íris
Trichoglossus rubritorquis	loriquito-de-colar-vermelho
Trichoglossus euteles	loriquito-de-cabeça-olivácea
Trichoglossus capistratus	loriquito-timorense
Trichoglossus weberi	loriquito-das-flores
Trichoglossus forsteni	loriquito-de-forsten
Melopsittacus undulatus	periquito-australiano
Nannopsittacus gulielmitertii	papagaio-dos-figos-de-testa-azul
Nannopsittacus nigrifrons	papagaio-dos-figos-de-testa-preta

Nannopsittacus melanogenia	papagaio-dos-figos-de-faces-escuras
Cyclopsitta diophthalma	papagaio-dos-figos-maquilhado
Cyclopsitta desmarestii	papagaio-dos-figos-grande
Cyclopsitta edwardsii	papagaio-dos-figos-de-edwards
Cyclopsitta salvadorii	papagaio-dos-figos-de-salvadori
Bolbopsittacus lunulatus	papagaio-goiabeiro
Loriculus vernalis	papagaio-morcego-vernal
Loriculus beryllinus	papagaio-morcego-do-ceilão
Loriculus philippensis	papagaio-morcego-filipino
Loriculus bonapartei	papagaio-morcego-de-bico-preto
Loriculus camiguinensis	papagaio-morcego-de-camiguin
Loriculus galgulus	papagaio-morcego-de-coroa-azul
Loriculus stigmatus	papagaio-morcego-de-celebes
Loriculus amabilis	papagaio-morcego-das-molucas
Loriculus sclateri	papagaio-morcego-das-sula
Loriculus catamene	papagaio-morcego-de-sangihe
Loriculus aurantiifrons	papagaio-morcego-da-papua
Loriculus tener	papagaio-morcego-das-bismarck
Loriculus exilis	papagaio-morcego-pigmeu
Loriculus pusillus	papagaio-morcego-javanês
Loriculus flosculus	papagaio-morcego-das-flores
Agapornis canus	inseparável-malgaxe
Agapornis pullarius	inseparável-de-cabeça-vermelha
Agapornis taranta	inseparável-abissínio
Agapornis swindernianus	inseparável-de-colar



Figura 200 - inseparável-abissínio *Agapornis taranta*

(Foto: Adam Riley / rockjumperbirding.com - Etiópia)

Agapornis roseicollis	inseparável-de-faces-rosadas
Agapornis fischeri	inseparável-de-fischer
Agapornis personatus	inseparável-de-cabeça-preta
Agapornis lilianae	inseparável-do-niassa
Agapornis nigrigenis	inseparável-de-faces-pretas
Lophopsittacus mauritianus	papagaio-de-bico-largo
Necropsittacus rodricanus	papagaio-de-rodrigues